



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** FOCUS ULTRA

**Número de autorización:** 18939

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 17/01/1992

**Fecha de Caducidad:** 31/05/2022

Titular

**BASF ESPAÑOLA S.L.U.**

Can Rabia, 3-5  
08017 Barcelona  
(Barcelona)  
ESPAÑA

Fabricante

**BASF SE**

Carl-Bosch Str. 38  
D-67056 Ludwigshafen  
(Rhein)  
ALEMANIA

**Composición:** CICLOXIDIM 10% [EC] P/V

### Envases:

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
COEX PA/PE de 0,15, 0,25, 0,5, 1, 3, 5, 10 l

### Usos y dosis autorizados:



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajo	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Albaricoquero	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Apio	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
Arroz	GRAMINEAS VIVACES	4	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Aplicar en presiembrado del cultivo y post-emergencia de las malas hierbas.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Uso contra Oryza sp. Aplicar en presiembra del cultivo y en post-emergencia de las malas hierbas.
Berenjena	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
Berza , col	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Cebolla	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Cebolleta	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Chalote	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Col de Bruselas	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Col de China	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35).
Coliflor	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Colza	GRAMINEAS ANUALES	2	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35)



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS VIVACES	5				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35)
Escarola	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
Espinaca	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19)



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Garbanzo	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
Girasol	GRAMINEAS ANUALES	2	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18)
	GRAMINEAS VIVACES	5				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18)
Guisante para grano	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Guisante verde	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso en guisantes verdes con o sin vaina contra <i>Agropyrum</i> sp, <i>Sorghum</i> sp. y <i>Cynodon</i> sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Uso en guisantes verdes con o sin vaina. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Haba para grano	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra <i>Agropyrum</i> sp, <i>Sorghum</i> sp. y <i>Cynodon</i> sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBHC 13-35)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBHC 13-35)





USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Haba verde	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso en habas verdes con y sin vaina contra <i>Agropyrum</i> sp, <i>Sorghum</i> sp. y <i>Cynodon</i> sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Uso en habas verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
Judía para grano	GRAMINEAS ANUALES	2	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	GRAMINEAS VIVACES	5				Uso contra <i>Agropyrum</i> sp, <i>Sorghum</i> sp. y <i>Cynodon</i> sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Judía verde	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso en judías verdes con y sin vaina contra <i>Agropyrum</i> sp, <i>Sorghum</i> sp. y <i>Cynodon</i> sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Uso en judías verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
Lechuga	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
Manzano	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Melocotonero	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Membrillero	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Patata	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19)
Peral	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Pimiento	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23).



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23).
Puerro	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Remolacha azucarera	GRAMINEAS ANUALES	2	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
	GRAMINEAS VIVACES	5				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
Remolacha forrajera	GRAMINEAS ANUALES	2	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	GRAMINEAS VIVACES	5				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
Repollo	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Salsifí	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Soja	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19)
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19)
Tomate	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
Verdolaga	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19).



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Vid	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79).
Zanahoria	GRAMINEAS VIVACES	5	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	GRAMINEAS ANUALES	2				Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Escarola, Lechuga, Pimiento	21
Albaricoquero, Apio, Cebolla, Coliflor, Espinaca, Haba verde, Judía verde, Manzano, Melocotonero, Membrillero, Peral, Repollo, Verdolaga	28
Guisante verde, Salsifí, Zanahoria	35
Ajo, Berenjena, Berza, col, Cebolleta, Chalote, Col de Bruselas, Col de China, Puerro, Tomate, Vid	42
Garbanzo, Guisante para grano, Haba para grano, Judía para grano, Patata, Soja	56
Arroz, Colza, Girasol, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera	NP

**Condiciones generales de uso:**



Herbicida de acción sistémica para el control de gramíneas anuales y vivaces.

Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Tratar al atardecer ya que la luz descompone el producto así como, en terreno en tempero, siendo la temperatura óptima de 15-25 ° C para una mayor eficacia.

Existe riesgo de desarrollo de resistencias. Para reducir el riesgo de aparición de resistencias, se recomienda:

- Aplicación del producto siguiendo las indicaciones que figuran en la etiqueta.
- Mezclar o secuenciar herbicidas con diferentes modos de acción.
- Realizar métodos culturales, siempre que sea posible, para el manejo de malas hierbas.

**Excepciones:** --

**Clase de usuario:**

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

No se debe autorizar para los uso en jardinería exterior doméstica, ni para uso profesional en lugares destinados al público en general.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

- MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones manuales con mochila o lanza/pistola y pulverizaciones con tractor:

- o ropa de trabajo
- o guantes de protección química

- APLICACIÓN:

Mediante tractor: ropa de trabajo.

Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- o Ropa de trabajo: soja, patata, judías para grano, habas para grano, guisantes para grano, colza, girasol, remolacha azucarera, remolacha forrajera





o Ropa de trabajo y guantes de protección química: vid, cebolleta, puerro, tomate, coles de bruselas, col china, berza, berenjena, garbanzo, apio, zanahoria, guisante verde, lechuga, escarola, pimiento, espinacas, verdolaga, cebolla, chalota, salsifí, ajo, judías verdes, habas verdes, repollo, coliflor, manzano, peral, membrillo, melocotonero, nectarino, albaricoque (Los guantes de protección química están destinados a labores de reentrada relacionadas con el uso del herbicida para las malas hierbas tratadas)

#### FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO



Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química

#### Clasificaciones y Etiquetado:

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categoría 2
<b>Pictograma</b>	GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud) 
<b>Palabra Advertencia</b>	Peligro
<b>Indicaciones de peligro</b>	H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 - Provoca irritación cutánea. H319 - Provoca irritación ocular grave. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H361d - Se sospecha que daña al feto.



<b>Consejos de Prudencia</b>	<p>P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.</p> <p>P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.</p> <p>P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.</p> <p>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua</p> <p>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.</p>
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	Acuático crónico 1
<b>Pictograma</b>	GHS09 (medio ambiente)
<b>Palabra Advertencia</b>	Atención
<b>Indicaciones de peligro</b>	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
<b>Consejos Prudencia</b>	<p>P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P391 - Recoger el vertido.</p> <p>P501 - Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.</p>

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Spe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

**Eliminación Producto y/o caldo: --**

**Gestión de envases:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Nº REGISTRO: 18939

FOCUS ULTRA

**Otras indicaciones reglamentarias:**

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

En la etiqueta deberá indicarse que contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5). La Nafta disolvente del petróleo con nºCAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No autorizado para jardinería exterior doméstica, ni en lugares destinados al público en general (aplicaciones profesionales).

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**