



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: BERMECTINE

Número de autorización: 21381

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 20/06/1997

Fecha de Caducidad: 30/04/2020

Titular

PROBELTE S.A.U.

C/ Antonio Belmonte Abellán 3-5

30100 Espinardo

(Murcia)

ESPAÑA

Fabricante

PROBELTE S.A.U.

C/ Antonio Belmonte Abellán 3-5

30100 Espinardo

(Murcia)

ESPAÑA

Composición: ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Botellas de plástico (COEX) de 250 ml y 1 l de capacidad.

Garrafas de plástico (COEX) de 5 l de capacidad.

**Usos y dosis autorizados:**

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|---------------|----------------|-----------|------------|----------------|--|
| Berenjena | ACAROS | 0,3 - 0,8 l/ha | Máx. 2 | 20 | 600-1.000 l/ha | Aire libre e invernadero. Aplicar durante la plaga. |
| Cítricos | ARAÑA ROJA | 0,04 % | Máx. 3 | 7 | 2.000 l/ha | Aplicar desde que empieza a crecer el brote y se hace visible su tallo (BBCH 31) hasta que los brotes alcanzan alrededor del 20% de su tamaño final (BBCH 32) y desde cuajado (BBCH 71) hasta que el fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final y adquieren un color verde oscuro y finaliza la caída fisiológica de los frutos (BBCH 74). Aplicar al inicio del ataque. |
| | PHYLLOCNISTIS | 0,03 - 0,04 % | | | | Es conveniente añadir un aceite de verano a dosis 0,2-0,5%. Aplicar desde que empieza a crecer el brote y se hace visible su tallo (BBCH 31) hasta que los brotes alcanzan alrededor del 20% de su tamaño final (BBCH 32) y desde cuajado (BBCH 71) hasta que el fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final y adquieren un color verde oscuro y finaliza la caída fisiológica de los frutos (BBCH 74). Aplicar al inicio del ataque. |
| | ACAROS | | Máx. 2 | 7 | | |



| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|----------------|--|
| Cucurbitáceas de piel comestible | LIRYOMIZA | 0,15 - 1 l/ha | | | 300-1.000 l/ha | Solo en invernadero. Aplicar durante la plaga. |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ACAROS | 0,15 - 1 l/ha | Máx. 2 | 7 | 300-1.000 l/ha | Aire libre e invernadero. Aplicar durante la plaga. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Fresal | ACAROS | 0,15 - 1 l/ha | 2 | 7 | 300-1000 l/ha | Solo en invernadero. Aplicar en presencia de la plaga. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Lechuga | ACAROS | 0,15 - 1 l/ha | Máx. 3 | 7 | 300-1.000 l/ha | Solo al aire libre. Aplicar en semilleros y hasta 20 días después del trasplante. Aplicar durante la plaga. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Limonero | ÁCARO DE LAS MARAVILLAS | 0,04 % | Máx. 3 | 7 | 2.000 l/ha | Aplicar desde que empieza a crecer el brote y se hace visible su tallo (BBCH 31) hasta que los brotes alcanzan alrededor del 20% de su tamaño final (BBCH 32) y desde cuajado (BBCH 71) hasta que el fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final y adquieren un color verde oscuro y finaliza la caída fisiológica de los frutos (BBCH 74). Aplicar al inicio del ataque. |



| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|------------------------|----------|------------------|-----------|------------|------------------|--|
| Manzano | ACAROS | 0,08 % | Máx. 2 | 15 | 1.000-1.200 l/ha | Aplicar desde la caída de los pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Aplicar justo después de la caída de los pétalos. Repetir en caso necesario pasados 2 meses. Para mejorar la eficacia puede mezclarse con aceite de verano parafínico al 0,25% salvo en condiciones extremas de escasa humedad o muy altas temperaturas. |
| Melocotonero | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 1 | | 1.000-1.200 l/ha | Aplicar desde la caída de los pétalos hasta 14 días antes de la cosecha. |
| Palmáceas ornamentales | TALADRO | 20 - 80 ml/árbol | Máx. 2 | 15-45 | | Solo al aire libre en lugares no destinados al público en general. Dosis en función de la altura de la palmera. Aplicar mediante inyección al tronco en periodo de movimiento de la savia. La aplicación se realizará por empresas especializadas. |
| Peral | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | Máx. 2 | 15 | 750-1.200 l/ha | Aplicar desde la caída de los pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. |
| | PSILA | | | | | |
| | ERINOSIS | | | | | |
| Tomate | ACAROS | 0,15 - 1 l/ha | Máx. 3 | 7 | 300-1.000 l/ha | Aire libre (contra Tetranychus urticae) e invernadero (contra Polyphagotarsonemus latus, Aculops lycopersici y Tutta absoluta). Aplicar durante la plaga. |



Nº REGISTRO: 21381

BERMECTINE

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|--|
| | LIRYOMIZA | | | | | Aire libre e invernadero. Aplicar durante la plaga. |
| Vid de mesa | ACAROS | 0,05 - 0,075 % | 1 | - | 500-800 l/ha | Aplicar durante la plaga, excluyendo el periodo de floración (BBCH 60-69). |
| Vid de vinificación | ACAROS | 0,05 - 0,075 % | 1 | - | 500-800 l/ha | Aplicar durante la plaga, excluyendo el periodo de floración (BBCH 60-69). |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|---|----------------------------|
| Palmáceas ornamentales | |
| Cítricos, Limonero, Vid de mesa, Vid de vinificación | 10 |
| Melocotonero | 14 |
| Berenjena, Cucurbitáceas de piel comestible, Fresal, Manzano, Peral | 3 |
| Tomate | 3 AIRE LIBRE 7 INVERNADERO |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | 5 AIRE LIBRE 3 INVERNADERO |
| Lechuga | 7 |

Condiciones generales de uso:

Acaricida insecticida para uso profesional.

Aplicar en pulverización normal con tractor al aire libre y manual con lanza/pistola y mochila en invernadero. En palmáceas ornamentales se aplica mediante inyección al tronco.

Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de 3 veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción para evitar la aparición de las mismas.

SPa 1: A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga abamectina más de 3 aplicaciones al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).



Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

- MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para aplicaciones mediante tractor e inyección al tronco:

- o Ropa de trabajo,
- o Guantes de protección química.

- APLICACIÓN:

Mediante tractor:

- o Ropa de trabajo.

Mediante inyección al tronco:

- o Ropa de trabajo,
- o Guantes de protección química.

INVERNADERO

- MEZCLA, CARGA:

Pulverizaciones manuales con mochila y lanza/pistola:

- o Ropa de trabajo,
- o Guantes de protección química.

- APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Pulverizaciones manuales con mochila y lanza/pistola:

- o Ropa de protección química tipo 3 o 4 (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009),
- o Calzado resistente a productos químicos,
- o Guantes de protección química,
- o Capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

En el caso de berenjena se podrá prescindir de la capucha y pantalla facial.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o En peral, manzano, cítricos y tomate en invernadero: ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada).

o En melocotonero, vid de vinificación, vid de mesa, berenjena, lechuga, tomate al aire libre, cucurbitáceas de piel no comestible, cucurbitáceas de piel comestible, fresal y berenjena: ropa de trabajo.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

10 días en vid.

1 día en fresal.



FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO





Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Clasificaciones y Etiquetado:

| | |
|--|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Lesiones oculares graves. Categoría 1. Líquidos inflamables. Categoría 3. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad aguda (oral). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Tóxicos específicos en determinados órganos tras exposiciones repetidas. Categoría 2. |
| Pictograma | GHS02 (llama)  GHS05 (corrosión)  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)  |
| Palabra Advertencia | Peligro |
| Indicaciones de peligro | H226 - Líquidos y vapores inflamables. H302 - Nocivo en caso de ingestión. H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H318 - Provoca lesiones oculares graves. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. H373 - Puede provocar daños en el tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas. EUH 066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. |



| | |
|---|--|
| Consejos de Prudencia | <p>P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.</p> <p>P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol.</p> <p>P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.</p> <p>P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.</p> <p>P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante)</p> |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | Acuático agudo 1 Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra Advertencia | Atención |
| Indicaciones de peligro | H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos Prudencia | <p>P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P391 - Recoger el vertido.</p> <p>P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.</p> |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de:

- 5 m en lechuga y en los usos al aire libre en tomate, berenjena y cucurbitáceas de piel no comestible,
 - 10 m en vid,
 - 15 m en cítricos,
 - 20 m en manzano y peral,
- hasta las masas de agua superficial.

SPe3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de:

- 5 m para lechuga y los usos al aire libre en tomate y cucurbitáceas de piel no comestible,
 - 10 m para vid,
 - 15 m para cítricos, manzano y peral,
- hasta la zona no cultivada.



Spe8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración. Elimínense las malas hierbas antes de su floración.

Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y

- 41 h después del mismo en berenjena,
- 53 h después del mismo en lechuga, tomate, y cucurbitáceas de piel no comestible,
- 4 días en los usos en invernadero.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Contiene Alquil bencen sulfonato cálcico con isobutanol y Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5). La Nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No autorizado para jardinería exterior doméstica.

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --