



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** ECLIPSE 70 WG

**Número de autorización:** 22065

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 18/10/1999

**Fecha de Caducidad:** 31/07/2019

Titular

**ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A.**

C/ Méndez Álvaro nº 20, 5ª planta.

28045 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

Fabricante

**ADAMA DEUTSCHLAND GMBH**

Edmund-Rumpler-Str. 6

51149 KÖLN

(Colonia)

ALEMANIA

**Composición:** METRIBUZINA 70% [WG] P/P

### Envases:

#### **Presentación/Capacidad/Material**

Uso profesional:

Bolsas de aluminio con rango de capacidad entre 1 y 10 kg.

Bolsas de aluminio con rango de capacidad de < 1 kg.

Uso no profesional:

Bolsas de aluminio con rango de capacidad de < 1 kg.

**Usos y dosis autorizados:**

USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Alfalfa	MALAS HIERBAS ANUALES	0,75	Uso no profesional: 2,5-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años. Para uso no profesional emplear una dosis de 0,075 g/m2.
Algodonero	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso menor; incluye algodón para producción de semillas para aceite y algodón bruto para uso textil; uso profesional y no profesional): Aplicar en pre-emergencia del cultivo.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m2. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Apionabo	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso menor, uso profesional y no profesional): Aplicar en post-emergencia del cultivo.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m2. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	MALAS HIERBAS ANUALES	0,5 - 0,75	Uso no profesional: 2,5-5 l/100 m2.	(Uso menor; uso profesional y no profesional): Aplicar en preplantación o en post-emergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en pre-emergencia, inmediatamente después de la siembra. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cebada ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES	0,1	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas. Para uso no profesional emplear una dosis de 0,01 g/m2.
Chirivía	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso menor, uso profesional y no profesional): Aplicar en post-emergencia del cultivo.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m2. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Chufa	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m <sup>2</sup> .	<p>(Uso menor, uso profesional y no profesional): Aplicar en post-emergencia del cultivo.</p> <p>Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m<sup>2</sup>. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).</p>
Oleaginosas	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m <sup>2</sup> .	<p>(Uso menor; incluye lino, amapola (adormidera), sésamo, girasol, colza, mostaza, calabaza, cártamo, borraja, camelina, cáñamo y ricino, exclusivamente para producción de semillas para aceite; uso profesional y no profesional): Aplicar en pre-emergencia del cultivo.</p> <p>Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m<sup>2</sup>. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).</p>



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Otros tubérculos hortícolas	MALAS HIERBAS ANUALES	0,75	Uso no profesional: 2,5-5 l/100 m2.	(Incluye mandioca, boniato, ñame, arrurruz; uso menor; uso profesional y no profesional): Aplicar en pre-emergencia del cultivo a la dosis indicada para uso profesional (0,075 g/m2 para uso no profesional) o en post-emergencia a dosis de 0,3 Kg/ha para uso profesional (0,03 g/m2 para uso no profesional). Ver en el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Patata	MALAS HIERBAS ANUALES	0,75	Uso no profesional: 2,5-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar en pre-emergencia del cultivo a la dosis indicada para uso profesional (o 0,075 g/m2 para uso no profesional) o en post-emergencia a dosis de 0,3 Kg/ha para uso profesional (0,03 g/m2 para uso no profesional).
Raíz de perejil	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso menor, uso profesional y no profesional): Aplicar en post-emergencia del cultivo.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m2. Ver el apartado "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).



Nº REGISTRO: 22065

ECLIPSE 70 WG

USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Soja	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar en pre-emergencia del cultivo.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m2.
Tomate	MALAS HIERBAS ANUALES	0,5 - 0,75	Uso no profesional: 2,5-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar en preplantación o en post-emergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en pre-emergencia, inmediatamente después de la siembra.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,05-0,075 g/m2.
Trigo ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES	0,1	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas. Para uso no profesional emplear una dosis de 0,01 g/m2.
Zanahoria	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,35	Uso no profesional: 2-5 l/100 m2.	(Uso profesional y no profesional): Aplicar en post-emergencia del cultivo.  Para uso no profesional emplear una dosis de 0,025-0,035 g/m2.

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**



Uso	P.S. (días)
Apionabo, Chirivía, Chufa, Raíz de perejil, Zanahoria	60
Alfalfa, Algodonero, Berenjena, Cebada ciclo largo, Oleaginosas, Otros tubérculos hortícolas, Patata, Soja, Tomate, Trigo ciclo largo	NP

**Condiciones generales de uso:**

Controla malas hierbas en pre-emergencia o post-emergencia temprana.

Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-500 l de caldo/ha en una aplicación por campaña. No utilizar en terrenos muy arenosos. Para uso no profesional la aplicación se realizará mediante pulverización manual (mochila de 5 l).

En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa o en las condiciones concurrentes, como bajas temperaturas, estados de depresión del cultivo, tipo de suelo.

**Excepciones:** --**Clase de usuario:**

Uso profesional y no profesional. Autorizado para jardinería exterior doméstica

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

Seguridad del aplicador:

Uso profesional:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo, en las aplicaciones en alfalfa, patata, mandioca, boniato, ñame, arrurruz, tomate, berenjena, zanahoria, apionabo, chirivía, perejil (raíz) y chufa, soja, algodón, lino, adormidera, sésamo, girasol, colza, mostaza, calabaza, cártamo, borraja, camelina, cáñamo y ricino se utilizará mascarilla FFP2SL o P2 en la mezcla/carga y además en alfalfa, patata, mandioca, boniato, ñame, arrurruz, tomate y berenjena se utilizará ropa de protección tipo 3 o 4 durante la aplicación y limpieza del equipo.

Uso no profesional:

Se recomienda el uso de guantes durante el manejo del producto y limpieza del equipo.

Seguridad del trabajador:

Ropa de trabajo.

Frases asociadas a la reducción del riesgo:

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.



SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

### **Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	--
<b>Indicaciones de peligro</b>	EUH 210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
<b>Consejos de Prudencia</b>	P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica). P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
<b>Pictograma</b>	GHS09 (medio ambiente)
<b>Palabra Advertencia</b>	--
<b>Indicaciones de peligro</b>	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
<b>Consejos Prudencia</b>	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

### **Mitigación de riesgos ambientales:**

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 5 m en cereales, 10 m en zanahoria, apionabo, chirivía, perejil (raíz), chufa, soja, oleaginosas y 20 m en patata, mandioca, boniato, ñame, arrurruz, tomate, berenjena y alfalfa, hasta las masas de agua superficial.

SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cereales, 10 m en zanahoria, apionabo, chirivía, perejil (raíz), chufa, soja y oleaginosas y 15 m en patata, mandioca, boniato, ñame, arrurruz, tomate, berenjena y alfalfa, hasta la zona no cultivada.

**Eliminación Producto y/o caldo:** --





**Gestión de envases:**

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Autorizado para jardinería exterior doméstica, uso doméstico y huertos familiares.

En cumplimiento del artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, los envases unitarios destinados a uso en jardinería exterior doméstica, uso doméstico y huertos familiares por venderse el preparado al público en general, no excederá la capacidad de 500 g.

(\*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización; mandioca, boniato, ñame, arrurruz, apionabo, chirivía, perejil (raíz), chufa, berenjena, algodón y exclusivamente para producción de semillas para aceite: lino, amapola (adormidera), sésamo, girasol, colza, mostaza, calabaza, cártamo, borraja, camelina, cáñamo y ricino; tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**