



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: TELXIOPE 100

Número de autorización: 22118

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 23/07/1999

Fecha de Caducidad: 31/10/2019

Titular

ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.

Rue de Renory, 26/1

B-4102 OUGRÉE

(Liege)

BELGICA

Fabricante

CAF KARYON S.L.

C/ Ezequiel Solana, 6

28017 MADRID

(Madrid)

Composición: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Botella de HDPE/PET/COEX de 1 l (boca 50 mm).

Garrafas HDPE/PET/COEX de 1 ml a 20 l (boca 50 mm).

Usos y dosis autorizados:

| USO | AGENTE | Dosis l/ha | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|--------|---------------|--|
| Alcachofa | ORUGAS | 0,25 - 0,5 | |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|------------|----------------|------------|---|
| | PULGONES | | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| Alfalfa | CUCA | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo entre 150-1000 l/ha. |
| | GUSANOS VERDES | | |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Algodonero | ORUGAS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| Apionabo | TRIPS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| | ORUGAS | | |
| | MOSCA BLANCA | | |
| | ESCARABAJO | | |
| Avena | PULGONES | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Berenjena | MOSCA BLANCA | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Brécol | PULGUILLAS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Calabaza | ORUGAS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| Cebada | PULGONES | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Centeno | PULGONES | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Chirivia | TRIPS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| | ORUGAS | | |
| | MOSCA BLANCA | | |
| | ESCARABAJO | | |
| Coliflor | PULGONES | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| | PULGUILLAS | | |
| | ORUGAS | | |
| Colinabo | ESCARABAJO | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un |
| | MOSCA BLANCA | | |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|------------------------|---|------------|---|
| | ORUGAS PULGONES TRIPS | | intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| Colza | GORGOJOS MELIGUETES | 0,25 | Efectuar 2 aplicaciones como máximo con un intervalo de 14 días entre ellas, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Escorzonera | TRIPS PULGONES ORUGAS MOSCA BLANCA ESCARABAJO | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| Espelta | PULGONES | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Guisantes verdes | ORUGAS PULGONES | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| Judías verdes | PULGONES ORUGAS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| Maíz | TALADRO DIABROTICA ORUGAS | 0,75 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo de 150-1.000 l/ha. |
| Melón | ORUGAS PULGONES | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| Mostaza | GORGOJOS MELIGUETES | 0,25 | Efectuar 2 aplicaciones como máximo con un intervalo de 14 días entre ellas, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Nabo | ESCARABAJO MOSCA BLANCA ORUGAS PULGONES TRIPS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| Olivo | PRAYS | 0,3 | Efectuar 1 aplicación por campaña, no más tarde del fin de la floración, en un volumen de caldo de 1000 l/ha. |
| Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA PULGONES | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | 0,25 - 0,5 | |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|---------------------|--------------|------------|---|
| | PULGONES | | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| Patata | ESCARABAJO | 0,4 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| Rábano | TRIPS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| | ORUGAS | | |
| | MOSCA BLANCA | | |
| | ESCARABAJO | | |
| Remolacha azucarera | CASIDA | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| | NOCTUIDOS | | |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Remolacha de mesa | CASIDA | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| | NOCTUIDOS | | |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Remolacha forrajera | CASIDA | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. |
| | NOCTUIDOS | | |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Repollo | ORUGAS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| | PULGUILLAS | | |
| Sandía | ORUGAS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. |
| | PULGONES | | |
| Tomate | MOSCA BLANCA | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | ORUGAS | | |
| | PULGONES | | |
| Trigo | PULGONES | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Triticale | PULGONES | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/ha. |
| Vid | EMPOASCA | 0,25 - 0,3 | Efectuar 1 única aplicación, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 200-1500 l/ha. |
| | PIRAL | | |
| | POLILLAS | | |
| Zanahoria | TRIPS | 0,25 - 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un |
| | ORUGAS | | |



Nº REGISTRO: 22118

TELXIOPE 100

| USO | AGENTE | Dosis l/ha | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----|--------------|------------|--|
| | PULGONES | | intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. |
| | MOSCA BLANCA | | |
| | ESCARABAJO | | |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Remolacha azucarera | 14 |
| Algodonero, Colza, Mostaza, Vid | 21 |
| Avena, Cebada, Centeno, Espelta, Trigo, Triticale | 28 |
| Alcachofa, Apionabo, Berenjena, Brécol, Calabaza, Chirivia, Coliflor, Colinabo, Escorzonera, Guisantes verdes, Judías verdes, Melón, Nabo, Patata, Rábano, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera, Repollo, Sandía, Tomate, Zanahoria | 3 |
| Alfalfa | 7 |
| Maíz, Olivo, Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas | NP |

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal con tractor y al aire libre.

En la etiqueta se indicará que este producto puede inducir a la proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos o plantaciones en que sean frecuente los ataques de los mismos por si fuera necesario aplicar un acaricida específico.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

El operario deberá utilizar guantes de protección química en las operaciones de mezcla y carga, aplicación, limpieza y manejo del equipo.

Al estar clasificado como P 280 se aconseja llevar prendas/gafas/máscara de protección en mezcla/carga y aplicación.

Durante la aplicación con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

Seguridad del trabajador:

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Evítese el contacto con el follaje húmedo.

En caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores






al tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

SPo 5: Ventilar las zonas tratadas hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar

Clasificaciones y Etiquetado:

| | |
|---|--|
| <i>Clase y categoría de peligro (Humana)</i> | Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Líquidos inflamables. Categoría 3. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad aguda (oral). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. |
| <i>Pictograma</i> | GHS02 (llama)  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)  |
| <i>Palabra Advertencia</i> | -- |
| <i>Indicaciones de peligro</i> | H226 - Líquidos y vapores inflamables. H302 - Nocivo en caso de ingestión. H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 - Provoca irritación cutánea. H319 - Provoca irritación ocular grave. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. |



| | |
|---|--|
| Consejos de Prudencia | <p>P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.</p> <p>P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.</p> <p>P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.</p> <p>P331 - NO provocar el vómito.</p> <p>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.</p> <p>P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante)</p> |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | Acuático agudo 1 Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra Advertencia | -- |
| Indicaciones de peligro | H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos Prudencia | <p>P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P391 - Recoger el vertido.</p> <p>P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.</p> |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficiales de:

- 50 m o 20 m con boquillas de reducción de la deriva del 90 % para olivo,
- 40 m para árboles ornamentales.
- 30 m o 10 m con boquillas de reducción de la deriva del 90 % para vid,
- 25 m o 10 m con boquilla de reducción de deriva del 90 % para maíz.
- 20 m o 10 m con boquillas de reducción de la deriva del 90 % para patatas.
- 20 m o 5 m con boquillas de reducción de deriva del 90 % para alfalfa, algodón, legumbres, remolacha azucarera, remolacha forrajera, remolacha de mesa, nabo sueco, nabo, melón, calabaza, sandía y otras cucurbitáceas de invierno, hojas de mostaza, coliflor, repollo, brécol, zanahoria, escorzonera, chirivía, apio, nabo y rábano.
- 20 m para ornamentales herbáceas y alcachofas.
- 10 m en cereales de invierno y de verano, colza y mostaza.

SPE 8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Utilizar a primera hora de la mañana o al atardecer.

Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas.



Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-95-6" y "contiene solución de sulfonato orgánico, n-butil alcohol hidrocarburo aromático y otros ingredientes".

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

La nafta de disolvente del petróleo nº CAS 64742-95-6 debe tener un contenido en benceno menor de 0,1%.

No autorizado para jardinería exterior doméstica ni para uso profesional en lugares destinados al público en general (parques y jardines), en cumplimiento con los artículos 48.1 a) y 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

Condiciones de almacenamiento: --

P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --