



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** COMMAND CS

**Número de autorización:** 22646

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 25/02/2002

**Fecha de Caducidad:** 31/10/2022

Titular

**FMC Agricultural Solutions, S.A.U.**

Pº Castellana, 257. 5º.

28046 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

Fabricante

**FMC CORPORATION**

2929 Walnut Street

19104 Philadelphia

(pennsylvania )

USA

**Composición:** CLOMAZONA 36% [CS] P/V

### Envases:

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
Botellas de HDPE de 0,5 a 5 l.

### Usos y dosis autorizados:



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Adormidera	MALAS HIERBAS ANUALES	0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo.
Arroz	ECHINOCLOA	(ver nota)	1	-	300 l/ha	<p>Aplicar mediante pulverización normal con tractor:</p> <p>- En pre-siembra empleando una dosis 0,7-1 l/ha (arroz en parcela inundada y en parcela no inundada):</p> <p>Parcela no inundada: Efectuar el tratamiento con el terreno correctamente nivelado. Después del tratamiento introducir agua de forma lenta y gradual y mantener el agua estancada durante algunos días. Sembrar después de 4-5 días.</p> <p>Parcela inundada: Efectuar el tratamiento y no mover el agua durante varios días. Sembrar después de 4-5 días del tratamiento herbicida.</p> <p>- En pre-emergencia del cultivo y de las malas hierbas (siembra en seco):</p> <p>Aplicar el producto a una dosis de 0,7 l/ha hasta BBCH 09 (Una hoja imperfecta, enrollada, emerge en la punta del coleóptilo).</p> <p>- En post-emergencia precoz de los cultivos (solo arroz en parcela inundada), BBCH 11-12 (1-2 hojas desplegadas) y en post-emergencia de la mala hierba Echinochloa BBCH 11-12 (1-2 hojas desplegadas) a una dosis de 0,5-0,7 l/ha.</p>



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Calabacín	MALAS HIERBAS ANUALES	0,3 - 0,5 l/ha	ver cond. esp.	-	300 l/ha	(Incluye Calabacín siembra y calabacín trasplante): - Calabacín (siembra): Aplicar inmediatamente después de la siembra a dosis de 0,3-0,5 l/ha en una sola aplicación, o realizar dos aplicaciones espaciadas 20-30 días con una dosis total anual que no supere los 0,65 l/ha. - Calabacín (trasplante): Aplicar antes del trasplante a dosis de 0,4-0,5 l/ha en una sola aplicación, o realizar dos aplicaciones espaciadas 20-30 días con una dosis total anual que no supere los 0,65 l/ha.
Guisante para grano	MALAS HIERBAS ANUALES	0,2 - 0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes de BBCH 09 (emergencia: los cotiledones rompen la superficie del suelo). Reducir la dosis a 0,2 l/ha en terrenos ligeros y pobres de materia orgánica.
Guisante proteaginoso /forrajero	MALAS HIERBAS ANUALES	0,2 - 0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes de BBCH 09 (emergencia: los cotiledones rompen la superficie del suelo). Reducir la dosis a 0,2 l/ha en terrenos ligeros y pobres de materia orgánica.
Guisante verde	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 l/ha	1	-	200-500 l/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Haba forrajera	MALAS HIERBAS ANUALES	0,2 - 0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes de BBCH 09 (emergencia: los cotiledones rompen la superficie del suelo). Reducir la dosis a 0,2 l/ha en terrenos ligeros y pobres de materia orgánica.
Haba para grano	MALAS HIERBAS ANUALES	0,2 - 0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes de BBCH 09 (emergencia: los cotiledones rompen la superficie del suelo). Reducir la dosis a 0,2 l/ha en terrenos ligeros y pobres de materia orgánica.
Haba verde	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 l/ha	1	-	200-500 l/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo.
Hinojo	MALAS HIERBAS ANUALES	0,3 - 0,35 l/ha	ver cond. esp.	-	300 l/ha	(Incluye Hinojo de siembra directa e hinojo trasplantado): - Hinojo (siembra directa): Aplicar inmediatamente después de la siembra a dosis de 0,3 l/ha en una sola aplicación. - Hinojo (trasplante): Aplicar en pre-trasplante, con malas hierbas sin nacer en terreno plano, a dosis de 0,3-0,35 l/ha en una sola aplicación.
Judía para grano	MALAS HIERBAS ANUALES	0,2 - 0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes de BBCH 09 (emergencia: los cotiledones rompen la superficie del suelo). Reducir la dosis a 0,2 l/ha en terrenos ligeros y pobres de materia orgánica.
Judía verde	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 l/ha	1	-	200-500 l/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Maíz	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,3 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,25-0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes de BBCH 09 (emergencia). No emplear en terrenos arenosos y con guijarros ya que el producto puede manifestar efectos fitotóxicos).
Patata	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 - 0,3 l/ha	1	-	300 l/ha	Aplicar a la dosis de 0,25-0,3 l/ha mediante pulverización normal con tractor antes del BBCH 09 (después del aporcado y antes de emergencia). Reducir la dosis a 0,2 l/ha en el caso de terrenos ligeros y sin materia orgánica y en las variedades precoces Agata y Seglind.
Pimiento	MALAS HIERBAS ANUALES	0,75 - 1 l/ha	1	-	300 l/ha	Aplicar en siembra directa del cultivo pulverizando sobre una banda de 60 cm a una dosis de 0,5-1 l/ha y en cultivo con trasplante la aplicación será localizada en surco a la dosis indicada.
Soja	MALAS HIERBAS ANUALES	0,3 - 0,4 l/ha	1	-	300 l/ha	Aplicar mediante pulverización normal con tractor antes del BBCH 09 (antes de emergencia).
Tabaco	MALAS HIERBAS ANUALES	1 l/ha	1	-	400 l/ha	Aplicar en post-trasplante del cultivo.
Zanahoria	MALAS HIERBAS ANUALES	0,25 l/ha	1	-	300-500 l/ha	Aplicar en pre-emergencia del cultivo.

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Calabacín	40
Patata	60



Uso	P.S. (días)
Adormidera, Arroz, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Haba verde, Hinojo, Judía para grano, Judía verde, Maíz, Pimiento, Soja, Tabaco, Zanahoria	NP

**Condiciones generales de uso:**

Aplicar solo en cultivos al aire libre mediante pulverización normal.

**Excepciones:** --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

Seguridad del aplicador:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante las operaciones de mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo en todos los cultivos salvo en arroz, judías para grano, guisantes para grano, guisantes proteaginosos, habas, patata, calabacín, hinojo, soja y maíz.

En arroz, judías para grano, guisantes para grano, guisantes proteaginosos, habas, patata, calabacín, hinojo, soja y maíz en las operaciones de mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá emplear además de los guantes de protección química y ropa de trabajo, en aplicación sólo será necesario emplear ropa de trabajo.

El aplicador deberá utilizar ropa de protección química tipo 3 ó 4 y calzado adecuado durante la aplicación (si el tractor carece de cabina cerrada), limpieza y mantenimiento del equipo en tabaco y pimiento.

Seguridad del trabajador:

El trabajador deberá emplear ropa de trabajo.

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	
<b>Pictograma</b>	



<b>Palabra Advertencia</b>	--
<b>Indicaciones de peligro</b>	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	Acuático crónico 1
<b>Pictograma</b>	GHS09 (medio ambiente)
<b>Palabra Advertencia</b>	Atención
<b>Indicaciones de peligro</b>	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
<b>Consejos Prudencia</b>	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial (excepto en arroz inundado).

Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de:

- 10 m en pimiento, tabaco y arroz seco e inundado o bien 5 m con boquillas del 50 % de reducción de deriva o reducción superior
- 5 m para judías para grano, guisantes para grano, guisantes proteaginosos, habas, patata, hinojo, soja, maíz y adormidera, o boquillas del 75 % de reducción de deriva hasta la zona no cultivada.

**Eliminación Producto y/o caldo: --**

**Gestión de envases:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

En la etiqueta se hará constar que "contiene isocianatos". Puede provocar una reacción alérgica.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar



**Nº REGISTRO: 22646**

**COMMAND CS**

el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

**Condiciones de almacenamiento: --**