



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: VITRA 40 WG

Número de autorización: 23186

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 13/06/2005

Fecha de Caducidad: 30/11/2022

Titular

IQV AGRO ESPAÑA, S.L.

Avd. Rafael Casanova, 81
08100 MOLLET DEL VALLES
(Barcelona)
ESPAÑA

Fabricante

**INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES,
S.A.**

Avda. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallès
(Barcelona)
ESPAÑA

Composición: HIDROXIDO CUPRICO 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Uso profesional:

Bolsas de plástico 0,1-0,2-0,25-0,5-1-2 kg.

Bolsas de plástico con interior metalizado 0,1-0,2-0,25-0,5-1-2 kg.

Saco de papel 4-5-10-20-25 kg.

Uso no profesional:

Bolsas de plástico 0,1-0,2-0,25-0,5 kg.

Bolsas de plástico con interior metalizado 0,1-0,2-0,25-0,5 kg.



Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	MILDIU	2 - 2,5 Kg/ha	1-5	7-14	Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 4-10 l/100 m ²	(Aire libre e invernadero): Realizar la aplicación desde BBCH 15 (la 5ª hoja del tallo principal está desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Dosis máxima aire libre: 10 kg/ha y año. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con lanza): 2,1 kg/ha. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con mochila o carretilla): 2,5 kg/ha. Intervalo entre aplicaciones uso no profesional: 13-14 días. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m ² .
	ALTERNARIA					
	ANTRACNOSIS					
	BACTERIOSIS					
Frutales de hueso	ABOLLADURA	2 - 2,5 Kg/ha	1-4	7	Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 4-10 l/100 m ²	(Solo albaricoquero, cerezo, melocotoenero, nectarino y ciruelo): Realizar 1-2 aplicaciones a la caída de las hojas (50-100 %) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m ² .
	MONILIA					
	CRIBADO					
	BACTERIOSIS					
Frutales de pepita	BACTERIOSIS	2 - 2,5 Kg/ha	1-4	7	Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 5-10 l/100 m ²	(Solo manzano, peral, membrillero y níspero): Realizar 1-2 aplicaciones a la caída de las hojas (50-100 %) y 1-2 aplicaciones en prefloración. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m ² .
	MONILIA					
	MOTEADO					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Olivo	REPILO	2 - 2,5 Kg/ha	1-5	7	Uso profesional: 600-1.000 l/ha Uso no profesional: 6-10 l/100 m2	Realizar 1-3 aplicaciones en primavera y 1-3 aplicaciones en otoño, desde BBCH 10 (comienzo del desarrollo de las hojas) hasta BBCH 85 (aumenta la coloración específica de los frutos). Dosis máxima: 10 kg/ha y año. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m2.
	TUBERCULOSIS					
Ornamentales leñosas	SEPTORIA	2 - 2,5 Kg/ha	1-3	7-14	Uso profesional: 400-1.000 l/ha Uso no profesional: 4-10 l/100 m2	(Aire libre e invernadero): Aplicar el producto en cualquier estadio de desarrollo de la planta. Dosis máxima aire libre: 10 kg/ha y año. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con lanza): 2,1 kg/ha. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con mochila o carretilla): 2,5 kg/ha. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m2.
	ROYA					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Pimiento	MILDIU	2 - 2,5 Kg/ha	1-5	7-14	<p>Uso profesional: 400-1.000 l/ha</p> <p>Uso no profesional: 4-10 l/100 m²</p>	<p>(Aire libre e invernadero): Realizar la aplicación desde BBCH 15 (la 5ª hoja del tallo principal está desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa).</p> <p>Dosis máxima aire libre: 10 kg/ha y año. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con lanza): 2,1 kg/ha. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con mochila o carretilla): 2,5 kg/ha.</p> <p>Intervalo entre aplicaciones uso no profesional: 13-14 días. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m².</p>
Tomate	MILDIU	2 - 2,5 Kg/ha	1-5	7-14	<p>Uso profesional: 400-1.000 l/ha</p> <p>Uso no profesional: 4-10 l/100 m²</p>	<p>(Aire libre e invernadero): Realizar la aplicación desde BBCH 15 (la 5ª hoja del tallo principal está desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa).</p> <p>Dosis máxima aire libre: 10 kg/ha y año. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con lanza): 2,1 kg/ha. Dosis máxima invernadero (solo uso profesional, aplicación con mochila o carretilla): 2,5 kg/ha.</p> <p>Intervalo entre aplicaciones uso no profesional: 13-14 días. Dosis uso no profesional: 0,2-0,25 g/m².</p>
	ALTERNARIA					
	ANTRACNOSIS					
	BACTERIOSIS					



Nº REGISTRO: 23186

VITRA 40 WG

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Vid	MILDIU	0,2 - 0,25 g/m ²	1	-	4-10 l/100 m ²	(Solo uso no profesional): Aplicar desde BBCH 15 (5 hojas, desplegadas) hasta BBCH 81 (comienzo de la maduración; las bayas comienzan a brillar) y BBCH 91 (después de la vendimia) mediante pulverización manual.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10 (AIRE LIBRE) 3 (INVERNADERO)
Olivo, Pimiento	14
Vid	21
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Ornamentales leñosas	NP

Condiciones generales de uso:

Fungicida autorizado para cultivos al aire libre (uso profesional y no profesional) e invernadero (solo uso profesional). En cultivos al aire libre y uso profesional, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor y en cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual con mochila o lanza/pistola o carretilla de pulverización. Para uso no profesional, en jardinería exterior doméstica, aplicar el producto mediante pulverización manual.

Aplicar preventivamente adaptándolo a la evolución de la enfermedad y las condiciones climáticas, siguiendo las recomendaciones de los boletines regionales de sanidad vegetal.

Para todos los usos autorizados no superar la dosis máxima de 4 kg Cu (cobre inorgánico)/ha y año.

Uso autorizado para agricultores y aplicadores profesionales (cultivos y plantaciones agrícolas) y no profesionales (Ámbitos distintos de la producción primaria agraria profesional: jardinería exterior doméstica). (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso profesional y no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación:



SEGURIDAD DEL APLICADOR PROFESIONAL AIRE LIBRE

- Mezcla /carga y limpieza y mantenimiento del equipo:
 - o Mediante pulverizaciones con tractor
 - Ropa de trabajo
 - Guantes de protección química
- Aplicación
 - o Mediante pulverizaciones con tractor
 - Ropa de trabajo

INVERNADERO

- Mezcla /carga :
 - o Mediante pulverizaciones manual con lanza o pistola
 - Ropa de trabajo,
 - guantes de protección química
 - Capucha y pantalla facial (UNE-EN 166:2002)
- o Mediante pulverizaciones con carretilla
 - Ropa de trabajo
 - Guantes de protección química
- Aplicación y limpieza y mantenimiento del equipo:
 - o Mediante pulverizaciones manual con lanza o pistola
 - Ropa de protección química tipo 3 o 4 (UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009) y calzado adecuado
 - Guantes de protección química
 - Capucha y pantalla facial UNE-EN 166:2002
- o Mediante pulverizaciones con carretilla
 - Ropa de trabajo,
 - Guantes de protección química

SEGURIDAD DEL APLICADOR NO PROFESIONAL AIRE LIBRE

Para aplicaciones con mochila, se recomienda el uso de guantes durante el manejo del producto

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR PROFESIONAL

Ropa de trabajo y guantes de protección química excepto para los frutales de hueso y pepita y tareas de inspección y riego que se pondrá prescindir de los guantes de protección química

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

- Frutales de hueso y pepita 27días (aire libre)
- Olivo (contra Spilosea oleagina) 11 días (aire libre)
- Ornamentales leñosas 5 días (pulverización en invernadero con carretilla)

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR NO PROFESIONAL

Ropa de trabajo

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.



No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 4.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
Consejos de Prudencia	P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica). P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos Prudencia	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Spe2: Para proteger las aguas subterráneas no aplicar en suelos pedregosos, arenosos o con drenaje artificial.

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 10 m con cubierta vegetal en olivo.



- 20 m con cubierta vegetal en frutales de hueso, de pepita y árboles ornamentales (aire libre),
- 5 m en pimiento, tomate y berenjena (aire libre).

Se debe realizar un control de los datos de monitoreo de los niveles de Cu en las aguas subterráneas para todos los usos.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Por estar clasificado por su toxicidad aguda (ingestión e inhalación), categoría 4, los envases destinados a usos no profesionales deberán ir provistos de una advertencia detectable al tacto.

En cumplimiento del artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, los envases unitarios destinados al uso en jardinería exterior doméstica, por venderse el preparado al público en general, no excederán la capacidad de 500 g.

En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda "autorizado para jardinería doméstica" en caracteres preferentemente visibles.

En la etiqueta deberá indicarse que contiene "Diisopropilnaftalensulfonato sódico (CAS 1322-93-6)".

La autorización del producto queda supeditada a posibles modificaciones tras la renovación de la autorización europea de la sustancia activa cobre.

Condiciones de almacenamiento: --