



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: ALIGN
Número de autorización: 23291
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 18/11/2004
Fecha de Caducidad: 31/05/2025

Titular
SIPCAM INAGRA, S.A.
c/ Prof. Beltrán Báguena, 5 - Edificio Nuevo Centro
46009 VALENCIA

Fabricante
SIPCAM INAGRA, S.A.
c/ Prof. Beltrán Báguena, 5 - Edificio
Nuevo Centro
46009 VALENCIA

Composición: Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botella COEX de 15 ml (\varnothing boca: 22 +/- 0.3 mm), Botella COEX de 60 ml (\varnothing boca: 40 mm), Botella COEX de 150 ml (\varnothing boca : 41.7+/-0.5 mm), Botella COEX de 250 mL (\varnothing boca : 62.5 mm), Botella COEX de 500ml (49.6+/-0.3 mm) y Botella COEX de 1 l (55.3 mm). Garrafas COEX de 2 l, 3l, 5l y 10 litros (\varnothing bocas :55,3mm) así como garrafas COEX 20l (\varnothing boca : 68 mm).

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Algodonero	MOSCA BLANCA	0,1 - 0,15 %	Máx. 3	7-10	1000 l/ha	Uso al aire libre para algodón
	PULGON					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ORTOPTEROS					destinado a fibra, no autorizado el uso en algodón para subproductos de consumo humano. Aplicar el producto a la aparición de la infestación. Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha.
Bulbos hortícolas	TRIPS	0,1 - 0,11 %	Máx. 3	7-10	1000 l/ha	Exclusivamente ajo y cebolla. Uso al aire libre. Aplicar el producto a la aparición de la infestación. Dosis por aplicación: 1-1,1 l/ha.
	ORTOPTEROS					
Caqui	ORTOPTEROS	0,075 %	1	-	1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar el producto a la aparición de la infestación.
	MOSCA BLANCA					
	CICADELIDOS					
Cítricos	PHYLLOCNISTIS	0,075 %	1	-	1000 l/ha	Exclusivamente naranjas, limones, pomelos y mandarinas. Uso al aire libre. Aplicar el producto a la aparición de la infestación. En plántones de cítricos de hasta 3 años, máximo 2 aplicaciones, se podrá aplicar el producto también por pincelado del tronco, por encima del injerto en una longitud de 15 cm, en mezcla a partes iguales con un preparado de aminoácidos (1 ml/plánton), repitiendo el tratamiento a los 15-30 días.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES					Exclusivamente naranjas, limones, pomelos y mandarinas. Uso al aire libre. Aplicar el producto a la aparición de la infestación.
	COCHINILLAS					
	MOSCA BLANCA					
	CICADELIDOS					
	TRIPS					
	MINADORES DE HOJAS					
	CERATITIS					
	ORTOPTEROS					
Cucurbitáceas de piel comestible	PULGONES	0,1 %	Máx. 4	10	1000 l/ha	Exclusivamente pepino y calabacín. Uso al aire libre y en invernadero. Para uso al aire libre en pulverización máximo 4 aplicaciones y dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación. Para uso en invernadero en pulverización máximo 3 aplicaciones con intervalo de 7-10 días a dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.
	NOCTUIDOS					
	ESCARABAJOS					
	MINADORES DE HOJAS					
	TRIPS					
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente pepino y calabacín. Uso al aire libre y en invernadero en aleyrodes. Para uso al aire libre en pulverización máximo 4 aplicaciones y dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación. Para uso en invernadero en pulverización máximo 3 aplicaciones con intervalo de 7-10 días a dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ORTOPTEROS					Exclusivamente pepino y calabacín. Uso al aire libre y en invernadero. Para uso al aire libre en pulverización máximo 4 aplicaciones y dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación. Para uso en invernadero en pulverización máximo 3 aplicaciones con intervalo de 7-10 días a dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.
Cucurbitáceas de piel no comestible	ORTOPTEROS	0,1 %	Máx. 4	10	1000 l/ha	Exclusivamente melón, sandía y calabaza. Uso al aire libre y en invernadero. Para uso al aire libre en pulverización máximo 4 aplicaciones y dosis 1 l/ha. Para uso en invernadero en pulverización máximo 3 aplicaciones con intervalo de 7-10 días a dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.
	PULGONES					
	MINADORES DE HOJAS					
	NOCTUIDOS					
	TRIPS					
	ESCARABAJO					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA					Exclusivamente melón, sandía y calabaza. Uso al aire libre y en invernadero en aleyrodes. Para uso al aire libre en pulverización máximo 4 aplicaciones y dosis 1 l/ha. Para uso en invernadero en pulverización máximo 3 aplicaciones con intervalo de 7-10 días a dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.
Especies vegetales	PULGONES	0,075 %	1	-	1000 l/ha	Exclusivamente plantas madres para producción de semilla u otros vegetales para propagación. Uso aire libre e invernadero. Aplicar el producto a la aparición de la infestación.
	NOCTUIDOS					
	POLLILLAS					
	MOSCA BLANCA					
	DIPTEROS					
	CICADELIDOS					
	MINADORES DE HOJAS					
ORTOPTEROS						
Espinacas y similares	PULGONES	0,125 - 0,15 %	Máx. 3	10	600 – 800 l/ha	Exclusivamente espinaca, acelga y verdolaga. Uso al aire libre y en invernadero. Dosis por aplicación: 1-1,2 l/ha a la aparición de la infestación.
	MOSCA BLANCA					
	MINADOR					
	NOCTUIDOS					
	ORTOPTEROS					
Frutales de hueso	CICADELIDOS	0,075 %	Máx. 2	10	1000 l/ha	Exclusivamente melocotonero, nectarino, ciruelo y cerezo. Uso al aire libre. Aplicar después de la floración.
	TRIPS					
	ORTOPTEROS					
	ORUGAS					
	PULGONES					
	MINADORES DE HOJAS					
	COCHINILLAS					
Haba para grano	MOSCA BLANCA	0,125 - 0,15 %	Máx. 2	7-10	600 – 800 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar el
	ORTOPTEROS					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MINADOR					producto hasta la caída de los pétalos (BBCH 00-69). Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	ORTOPTEROS	0,125 - 0,15 %	Máx. 3	10	600 – 800 l/ha	Exclusivamente albahaca y perejil. Aire libre e invernadero. Dosis por aplicación: 1-1,2 l/ha a la aparición de la infestación.
	NOCTUIDOS					
	MINADOR					
	MOSCA BLANCA					
	PULGONES					
Hortalizas del género Brassica	NOCTUIDOS	0,1 - 0,14 %	Máx. 3	7-10	800 – 1000 l/ha	Exclusivamente coliflor, brécol y repollo. Aire libre. Aplicar el producto a la aparición de la infestación. Dosis por aplicación: 1-1,1 l/ha.
	POLLAS					
	PULGONES					
	ORTOPTEROS					
Judía para grano	MOSCA BLANCA	0,125 - 0,15 %	Máx. 2	7-10	600 – 800 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar el producto hasta la caída de los pétalos (BBCH 00-69). Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha.
	ORTOPTEROS					
	MINADOR					
Lechuga y similares	PULGONES	0,125 - 0,15 %	Máx. 3	10	600 – 800 l/ha	Exclusivamente lechuga, hierba de los canónigos, escarola, berro, barbarea, rúcula, mostaza china, hojas y brotes de Brassica spp. Uso al aire libre y en invernadero. Para uso al aire libre y en invernadero dosis 1-1,2 l/ha a la aparición de la infestación.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	NEMATODOS	1,5 l/ha	Máx. 5	10-15	Riego por goteo invernadero: 10.000 l/ha	Exclusivamente lechuga, hierba de los canónigos, escarola, berro, barbarea, rúcula, mostaza china, hojas y brotes de Brassica spp. contra las especies de Meloidogyne spp. Solo invernadero. Aplicar mediante riego por goteo desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89).
	MOSCA BLANCA MINADOR NOCTUIDOS	0,125 - 0,15 %	Máx. 3	10	600 – 800 l/ha	Exclusivamente lechuga, hierba de los canónigos, escarola, berro, barbarea, rúcula, mostaza china, hojas y brotes de Brassica spp. Uso al aire libre y en invernadero. Para uso al aire libre y en invernadero dosis 1-1,2 l/ha a la aparición de la infestación.
	ORTOPTEROS					
Leñosas	PULGONES MOSCA BLANCA MINADORES DE HOJAS LARVAS DE LEPIDOPTEROS	0,075 %	Máx. 2	7-10	1000 l/ha	Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	ORTOPTEROS					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	LAGARTA					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero en Lymantria dispar. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	TORTRIX					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero en Tortrix viridana. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	PROCESIONARIA					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero en Thaumetopoea pityocampa. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	TRIPS					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
Ornamentales herbáceas	PULGONES	0,075 %	Máx. 2	7-10	1000 l/ha	Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto
	MOSCA BLANCA					
	MINADORES DE HOJAS					
	LARVAS DE LEPIDOPTEROS					



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ORTOPTEROS					mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	LAGARTA					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero en <i>Lymantria dispar</i> . Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	TORTRIX					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero en <i>Tortrix viridana</i> . Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	PROCESIONARIA					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero en <i>Thaumetopoea pityocampa</i> . Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
	TRIPS					Uso exclusivo en viveros al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto mediante pulverización normal a la aparición de la infestación.
Patata	PULGONES		Máx. 3	7-10		



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ESCARABAJOS DE LA PATATA	0,1 - 0,15 %			800 – 1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar el producto a la aparición de la infestación. Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha.
	POLILLAS					
	ORTOPTEROS					
Solanáceas (excepto patata)	NEMATODOS	1,5 l/ha	Máx. 5	10-15	Riego por goteo invernadero: 10.000 l/ha	Exclusivamente tomate, berenjena y pimiento. Uso solo en invernadero para <i>Meloidogyne</i> spp. Aplicar mediante riego por goteo desde la 2ª hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89).
	MOSCA BLANCA	0,1 %	Máx. 4	10	1000 l/ha	Exclusivamente tomate, berenjena y pimiento. Uso al aire libre. Para uso al aire libre en pulverización emplear dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.
	ESCARABAJOS					
	MINADORES DE HOJAS					
	NOCTUIDOS					
	TRIPS					
ORTOPTEROS						



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TUTA ABSOLUTA	l/ha	Máx. 5		-	Exclusivamente tomate, berenjena y pimiento. Uso al aire libre y en invernadero. Aire libre: Realizar un máximo de 4 aplicaciones mediante pulverización normal con tractor cada 10 días a dosis de 0,1 % empleando un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Invernadero: Realizar un máximo de 5 aplicaciones cada 10 días mediante fertirrigación a dosis de 1,5 l/ha desde la 2º hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89).
	PULGONES	0,1 %	Máx. 4		1000 l/ha	Exclusivamente tomate, berenjena y pimiento. Uso al aire libre. Para uso al aire libre en pulverización emplear dosis 1 l/ha a la aparición de la infestación.
Tabaco	ORTOPTEROS	0,1 - 0,14 %	Máx. 3	7-10	800-1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar mediante pulverización a dosis 1-1,1 l/ha a la aparición de la infestación.
	PULGONES					
	MOSCA BLANCA					
	NEMATODOS	0,5 - 1,5 l/ha	Máx. 5	10-15	Riego por goteo aire libre: 10.000 l/ha	Uso al aire libre en Meloidogyne spp. Aplicar mediante riego por goteo a la aparición de la infestación.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Zanahoria	PULGONES	0,1 - 0,14 %	Máx. 3	7-10	800 – 1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar el producto mediante pulverización a la aparición de la infestación. Dosis por aplicación: 1-1,1 l/ha
	DIPTEROS					
	LARVAS DE LEPIDOPTEROS					
	ORTOPTEROS					

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Algodonero, Bulbos hortícolas, Caqui, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Hortalizas del género Brassica, Patata, Solanáceas (excepto patata), Zanahoria	3
Cítricos, Espinacas y similares, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Lechuga y similares	7
Especies vegetales, Frutales de hueso, Haba para grano, Judía para grano, Leñosas, Ornamentales herbáceas, Tabaco	NA

Condiciones generales de uso:

Uso insecticida.

Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor, riego por goteo (exclusivamente tabaco), brocha/rodillo (exclusivamente cítricos con menos de 3 años). En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización (inferior a 1 m de altura) manual con mochila o con lanza/pistola (lechuga y similares, espinaca y similares, hierbas aromáticas: perejil y albahaca, cucurbitáceas, plantas madre para la producción de semillas y plantas de vivero), riego por goteo (exclusivamente solanáceas contra nematodos y tuta absoluta y lechuga y similares contra nematodos) o instalaciones fijas (cucurbitáceas).

Aplicar en pulverización normal según cultivos y plagas, debiendo especificar en la etiqueta la dosificación correspondiente a cada caso, así como las indicaciones relativas a la adición de coadyuvantes o de correctores de PH. En aquellos casos en que se pueda aplicar a bajo volumen dosificar entre 0,75-1,5 l/ha. Efectuar las aplicaciones a primera hora de la mañana o a la caída de la tarde, desde los primeros estadios de desarrollo de la plaga, repitiendo en caso de necesidad a intervalos de 7 días.

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

AIRE LIBRE:

- MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones con tractor y riego por goteo:

- o Guantes de protección química,
- o Ropa de trabajo.

- APLICACIÓN:

Para pulverizaciones con tractor:

- o Ropa de trabajo.

- APLICACIÓN y LIMPIEZA:

Para aplicaciones mediante pintado de tronco (brocha/rodillo):

- o Guantes de protección química,
- o Ropa de trabajo.

INVERNADERO

- Pulverizaciones manuales con mochila y lanza/pistola (pulverizaciones inferiores a 1 metro de altura):

- MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

- o Ropa de trabajo
- o Guantes de protección química

- Instalaciones fijas y riego por goteo

- MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

- o Ropa de trabajo
- o Guantes de protección química

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- o Ropa de trabajo y guantes de protección química en todos los usos aplicados en



pulverización foliar excepto en patata, algodón y judía y haba para grano durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada. Se respetará además el plazo de reentrada fijado.

- o Ropa de trabajo en patata, algodón y judía y haba para grano.
- o Ropa de trabajo y calzado adecuado en sistema de riego por goteo (tabaco, tomate, pimiento, berenjena, lechuga y similares).

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

2 días en cítricos, caqui, plantas madres para producción de semilla u otros vegetales para propagación, tomate, berenjena, pimiento, cucurbitáceas, lechuga y similares, espinaca y similares, perejil y albahaca en pulverizaciones foliares al aire libre.

30 días frutales de hueso.

4 días lechuga y similares, espinaca y similares, perejil y albahaca en invernadero.

3 días plantas madres para producción de semilla u otros vegetales para propagación en invernadero.

8 días plantas de vivero al aire libre.

9 días plantas de vivero invernadero.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.


No entrar en el invernadero hasta finalizada la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de pulverización automático antes del comienzo de la aplicación del producto.

El operador no manipulará la instalación del sistema de riego durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riego antes del comienzo de la aplicación del producto.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación ocular. Categoría 2. Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 - Provoca irritación ocular grave. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.



Consejos de Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 - Llevar guantes y prendas de protección. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente) 
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos Prudencia	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPE3:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 5m en algodón.
- 10 m con cubierta vegetal en patata, tomate, pimiento, berenjena, pepino, calabacín, calabaza, melón y sandía.
- 20m en plantas de vivero y cítricos.
- 20m con cubierta vegetal en bulbos, plantas para semillas, zanahoria, tabaco, lechuga y similares, espinaca y similares, perejil y albahaca, judía y haba para grano y hortalizas del género Brassica.
- 30m en caqui y frutales de hueso.

SPE3:

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10m en caqui, cítricos y frutales de hueso, hasta la zona no cultivada.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases



Nº REGISTRO: 23291

ALIGN

de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --