



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** CIRRUS 80 DF

**Número de autorización:** 23657

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 20/04/2005

**Fecha de Caducidad:** 31/12/2021

Titular

**UPL IBERIA, S.A.**

Carrer de Josep Pla, 2. Edificio B-2

08019 Barcelona

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

**CEREXAGRI S.A.S. (Mourenx)**

Plateforme SOBEGI

64150 MOURENX

(Mourenx)

FRANCIA

**Composición:** AZUFRE 80% [WG] P/P

### Envases:

#### Presentación/Capacidad/Material

Bolsas de polipropileno (BOPP) de 50 g y 1 kg.

Sacos de papel multicapas de 5 kg, 10 kg y 25 kg.

### Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	OIDIO	0,25 - 0,75	



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	ARAÑA ROJA		De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde el desarrollo de la sexta hoja hasta el fin de la aparición del órgano floral (BBCH 16-59). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
Bulbos hortícolas	ARAÑA ROJA	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde que la sexta hoja es claramente visible (>3 cm) hasta la inclinación del follaje (BBCH 16-47). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	OIDIO		
	ERIOFIDOS		
Cereales de invierno / primavera	OIDIO	0,25 - 0,6	De 1 a 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Aplicar el producto desde que el primer nudo está 1 cm por encima del nudo de macollaje hasta el fin del espigado (BBCH 31-59). Dosis máxima por aplicación: 5 kg/ha. Volumen de caldo: 600-833 l/ha.
Cucurbitáceas	ARAÑA ROJA	0,25 - 0,75	(De piel comestible y no comestible, aire libre e invernadero). De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que el 50% de los frutos muestran el color típico de la madurez completa (BBCH 13-87). Dosis máxima por aplicación (aire libre e invernadero): 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	OIDIO		
	ERIOFIDOS		
Fresal	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 10 días. Aplicar el producto desde que las primeras yemas florales salidas (cerradas todavía) hasta la cosecha principal (BBCH 57-87). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	0,25 - 0,7	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de
	ERIOFIDOS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	OIDIO		7 días. Aplicar el producto desde sépalos abiertos, ápices de los pétalos visibles, flores simples con pétalos blancos o rosados hasta letargo invernal (BBCH 57-97). Dosis máxima por aplicación: 8 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1200 l/ha.
Frutales de pepita	OIDIO	0,25 - 0,7	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde el estadio de yema roja hasta madurez avanzada (BBCH 57-85). Dosis máxima por aplicación: 8 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1200 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Guisante para grano	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde que 9 ó más entrenudos alargados visiblemente hasta que el 50% de las vainas están maduras, las semillas de color final, secas y duras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Guisante proteaginoso /forrajero	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde que 9 ó más entrenudos alargados visiblemente hasta que el 50% de las vainas están maduras, las semillas de color final, secas y duras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Guisante verde	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde que 9 ó más entrenudos alargados visiblemente hasta que el 50% de las vainas están maduras, las semillas de color final, secas y duras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Haba forrajera	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Haba para grano	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de
	ERIOFIDOS		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ARAÑA ROJA		7 días. Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
Haba verde	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Hortalizas de hoja	OIDIO	0,25 - 0,6	Exclusivamente lechuga y espinaca. De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde BBCH 13-85. Cuando la pulverización sea manual con mochila y lanza/pistola, la dosis: 0,25-0,4%. Dosis máxima por aplicación: 4 kg/ha. Volumen de caldo: 500-666 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Hortalizas del género Brassica	OIDIO	0,25 - 0,6	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde BBCH 13-85. Cuando la pulverización sea manual con mochila y lanza/pistola, la dosis será: 0,25-0,4%. Dosis máxima por aplicación: 4 kg/ha. Volumen de caldo: Pulverización normal con tractor: 500-666 l/ha. Pulverización manual con mochila y lanza/pistola: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Judía forrajera	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Judía para grano	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de
	ARAÑA ROJA		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ERIOFIDOS		7 días. Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
Judía verde	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas están maduras (BBCH 39-85). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Lúpulo	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde tercer par de hojas desplegadas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 13-49). Dosis máxima por aplicación: 12 kg/ha. Volumen de caldo: 1000-1600 l/ha.
	ARAÑA ROJA		
Olivo	NEGRILLA	0,25 - 0,75	De 1 a 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde BBCH 71 (tamaño de los frutos alrededor del 10% de su tamaño final) hasta BBCH 92 (los frutos pierden su turgencia y empiezan a caer). Dosis máxima por aplicación: 10 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1333 l/ha.
Plantaciones tropicales y subtropicales	OIDIO	0,25 - 0,7	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde que los primeros pétalos son visibles hasta el fin de la caída de las hojas o el reposo invernal o vegetativo (BBCH 57-97). Dosis máxima por aplicación: 7,8 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1143 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		
Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)	OIDIO	0,25 - 0,75	Excepto remolacha de mesa y forrajera. De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar el producto desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta que el 50% de los frutos están maduros (BBCH 13-87). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
	ARAÑA ROJA		



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Remolacha azucarera	OIDIO	0,25 - 1,25	De 1 a 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Aplicar el producto desde que se finaliza la cobertura del cultivo hasta que la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha (BBCH 39-49). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha.
Remolacha de mesa	OIDIO	0,25 - 1,25	De 1 a 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Aplicar el producto desde que se finaliza la cobertura del cultivo hasta que la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha (BBCH 39-49). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha.
Remolacha forrajera	OIDIO	0,25 - 1,25	De 1 a 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 14 días. Aplicar el producto desde que se finaliza la cobertura del cultivo hasta que la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha (BBCH 39-49). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha.
Tomate	OIDIO	0,25 - 0,75	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días. Aplicar desde la tercera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta que el 70% de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH 13-87). Dosis máxima por aplicación: 7,5 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha.
	ERIOFIDOS		
Vid	ARAÑA ROJA	0,25 - 0,8	De 1 a 8 aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 10 días. Aplicar el producto desde 3 hojas desplegadas hasta el comienzo de la maduración del fruto (BBCH 13-81). Dosis máxima por aplicación: 12 kg/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha.
	OIDIO		
	ERIOFIDOS		

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

<b>Uso</b>	<b>P.S. (días)</b>
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Bulbos hortícolas, Cereales de invierno / primavera, Cucurbitáceas, Fresal, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Haba verde, Hortalizas de hoja, Hortalizas del género Brassica, Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Lúpulo, Olivo, Plantaciones tropicales y subtropicales, Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera, Tomate, Vid	NP

**Condiciones generales de uso:**

Fungicida preventivo autorizado al aire libre y en invernadero (uso profesional).

Aplicar en pulverización normal variando la dosis según temperatura ambiental, época de tratamiento, cultivo, etc. En cultivos al aire libre, aplicar el producto con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. En cultivos en invernadero, aplicar con mochila o lanza/pistola.

No efectuar el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas.

No deberán efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al del azufre. No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, así como formulaciones EC.

Se indicarán los riesgos de aparición de efectos no deseables en algunas variedades sensibles de frutales, fresa y vid. En algunas variedades de frutales sensibles, hacer primero una prueba aparte.

No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.

**Excepciones: --****Clase de usuario:**

Uso profesional. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

SEGURIDAD DEL APLICADOR:

AIRE LIBRE:

. MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones con tractor y manuales con mochila y lanza/pistola: ropa de trabajo y guantes de protección química.

**. APLICACIÓN:**

Mediante tractor: ropa de trabajo.

Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:**

Ropa de trabajo.

**FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO**

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

En el cultivo de remolacha, en caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	EUH 210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

Para proteger a los mamíferos rumiantes, no aplicar en suelos cercanos a zonas donde pasten rumiantes.

SPE3:

- Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.
- Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de:
- Frutales de hueso y de pepita: 20 m o sin banda con boquillas del 90% de reducción de





deriva

- Vid, plantaciones tropicales y subtropicales, olivo y lúpulo: 10 m (Vid y olivo: o sin banda con boquillas del 75% de reducción de deriva; plantaciones tropicales y subtropicales: o sin banda con boquillas del 50% de reducción de deriva; lúpulo: o sin banda con boquillas del 90% de reducción de deriva)
- Arbustos y pequeños árboles ornamentales y tomates (>50 cm): 5 m o sin banda con boquillas del 50% de reducción de deriva hasta la zona no cultivada.

**Eliminación Producto y/o caldo: --**

**Gestión de envases:**

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**