



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: NIMROD EC N

Número de autorización: 23775

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 17/04/2006

Fecha de Caducidad: 31/05/2024

Titular

ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A.
C/ Príncipe de Vergara 110 - 5ª Planta.
28002 Madrid
(Madrid)
ESPAÑA

Fabricante

ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A.
C/ Príncipe de Vergara 110 - 5ª Planta.
28002 Madrid
(Madrid)
ESPAÑA

Composición: Bupirinato 25% [EW] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Envases de plástico COEX de 10 cc, 30 cc, 120 cc, 250 cc y 300 cc.
Envases de plástico COEX y HDPE de 1 l, 5 l, 10 l, 20 l y 200 l.



Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Albaricoquero	OIDIO	0,06 - 0,1 %	Máx. 3	10	750-1.000 l/ha	Aplicar desde BBCH 69 (fin de la floración: todos los pétalos, caídos) hasta BBCH 87 (madurez de recolección). Dosis por aplicación: 0,45-1 l/ha.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	OIDIO	0,2 - 0,3 %	ver nota	-	Aire libre: 500-700 l/ha Invernadero: 500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 97 (fin de la caída de las hojas. Las plantas o las partes que sobresalen de la tierra han muerto o se encuentran en el estadio de reposo). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación pulverización manual lanza/pistola y mochila (<1m): 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días. Dosis por aplicación carretilla: 1 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	OIDIOPSIS	0,2 - 0,3 %	ver nota	10-12	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez). Aire libre: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días ó 1,5 l/ha en una única aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación: 1-2 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días.
Calabacín	OIDIO	0,15 %	ver nota	-	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,75 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 10-12 días o 1,5 l/ha en una sola aplicación. Riego por goteo (aire libre e invernadero): Dosis: 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 15 días. Invernadero: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Calabaza	OIDIO	0,15 %	ver nota	-	500-1.500 l/ha	<p>Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez).</p> <p>Aire libre: Dosis por aplicación: 0,75 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 10-12 días o una aplicación de 1,5 l/ha.</p> <p>Riego por goteo (aire libre e invernadero): Dosis: 1-2 l/ha en una sólo aplicación.</p> <p>Invernadero: Dosis por aplicación: 0,75-1,5 l/ha en un máximo de 3 aplicaciones cada 10-12 días.</p>



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Coníferas	OIDIO	0,2 - 0,3 %	ver nota	-	Aire libre: 500-700 l/ha Invernadero: 500-1.000 l/ha	Exclusivamente para usos ornamentales. Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 97 (fin de la caída de las hojas. Las plantas o las partes que sobresalen de la tierra han muerto o se encuentran en el estadio de reposo). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación pulverización manual lanza/pistola y mochila (<1m): 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días. Dosis por aplicación carretilla: 1 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días.
Frambueso	OIDIO	1 l/ha	ver nota		500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 59 (estadio de globo: la mayoría de las flores, con pétalos formando una bola hueca) hasta BBCH 79 (90% de los frutos, formados). Aire libre: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 12-14 días.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Fresal	OIDIO	1 l/ha	ver nota	-	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero (solo carretilla). Aplicar desde BBCH 13 (3 hojas, desplegadas) hasta BBCH 87 (cosecha principal: La mayoría de los frutos, coloreados). Aire libre: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación mediante pulverización con carretilla: 1 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días.
Fronzosas	OIDIO	0,2 - 0,3 %	ver nota	-	Aire libre: 500-700 l/ha Invernadero: 500-1.000 l/ha	Exclusivamente para usos ornamentales. Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 97 (fin de la caída de las hojas. Las plantas o las partes que sobresalen de la tierra han muerto o se encuentran en el estadio de reposo). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación pulverización manual lanza/pistola y mochila (<1m): 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días. Dosis por aplicación carretilla: 1 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Grosellero	OIDIO	1 l/ha	ver nota		500-1.000 l/ha	Rojo y negro. Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 59 (estadio de globo: la mayoría de las flores, con pétalos formando una bola hueca) hasta BBCH 79 (90% de los frutos, formados). Aire libre: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 12-14 días.
Manzano	OIDIO	0,03 - 0,06 %	Máx. 4	10	750-1.500 l/ha	Aplicar desde BBCH 51 (las yemas se hinchan: escamas alargadas, con manchas ligeramente coloreadas) a BBCH 87 (madurez de recolección: frutos aptos para ser recolectados con buenas condiciones de almacenaje) Dosis máxima/aplicación: 0,9 l/ha. Se puede producir una ligera defoliación en variedades "Cox", "Jonathan", "Imperatore" y "Reineta". Dosis por aplicación: 0,2-0,9 l/ha
Melocotonero	OIDIO	0,06 - 0,1 %	Máx. 3	10	750-1.000 l/ha	Melocotonero y nectarino. Aplicar desde BBCH 69 (fin de la floración: todos los pétalos, caídos) hasta BBCH 87 (madurez de recolección). Dosis por aplicación: 0,45-1 l/ha.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Melón	OIDIO	0,15 %	ver nota	-	500-1.500 l/ha	<p>Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez).</p> <p>Aire libre: Dosis por aplicación: 0,75 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 10-12 días o una aplicación de 1,5 l/ha.</p> <p>Riego por goteo (aire libre e invernadero): Dosis: 1-2 l/ha en una sólo aplicación.</p> <p>Invernadero: Dosis por aplicación: 0,75-1,5 l/ha en un máximo de 3 aplicaciones cada 10-12 días.</p>



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Palmáceas	OIDIO	0,2 - 0,3 %	ver nota	-	Aire libre: 500-700 l/ha Invernadero: 500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 97 (fin de la caída de las hojas. Las plantas o las partes que sobresalen de la tierra han muerto o se encuentran en el estadio de reposo). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación pulverización manual lanza/pistola y mochila (<1m): 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días. Dosis por aplicación carretilla: 1 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Palmera datilera	OIDIO	0,2 - 0,3 %	ver nota	-	Aire libre: 500-700 l/ha Invernadero: 500-1.000 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 97 (fin de la caída de las hojas. Las plantas o las partes que sobresalen de la tierra han muerto o se encuentran en el estadio de reposo). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación pulverización manual lanza/pistola y mochila (<1m): 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días. Dosis por aplicación carretilla: 1 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Pepino	OIDIO	0,15 %	ver nota	-	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,75 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 10-12 días o 1,5 l/ha en una sola aplicación. Riego por goteo (aire libre e invernadero): Dosis: 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 15 días. Invernadero: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días.
Pimiento	OIDIOPSIS	0,2 - 0,3 %	ver nota	10-12	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días. Invernadero: Dosis por aplicación: 1-2 l/ha en 4 aplicaciones cada 10-12 días.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Rosales	OIDIO	0,2 - 0,3 %	ver nota	-	Aire libre: 500-700 l/ha Invernadero: 500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 97 (fin de la caída de las hojas. Las plantas o las partes que sobresalen de la tierra han muerto o se encuentran en el estadio de reposo). Aire libre: Dosis por aplicación: 1-1,5 l/ha en un máximo de 1 aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación pulverización manual lanza/pistola y mochila (<1m): 1-1,5 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días. Dosis por aplicación carretilla: 1 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 7-10 días.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Sandía	OIDIO	0,15 %	ver nota	-	500-1.500 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez). Aire libre: Dosis por aplicación: 0,75 l/ha en un máximo de 2 aplicaciones cada 10-12 días o una aplicación de 1,5 l/ha. Riego por goteo (aire libre e invernadero): Dosis: 1-2 l/ha en una sola aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación: 0,75-1,5 l/ha en un máximo de 3 aplicaciones cada 10-12 días.
Tomate	OIDIOPSIS	0,2 - 0,3 %	ver nota	10-12	500-1.000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 13 (la 3a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 87 (El 70% de los frutos muestra el color típico de madurez). Aire libre: Dosis por aplicación: 1 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días ó 1,5 l/ha en una única aplicación. Invernadero: Dosis por aplicación: 1-2 l/ha en un máximo de 4 aplicaciones cada 10-12 días.



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Vid de mesa	OIDIO	0,06 - 0,1 %	Máx. 3	10	500-1.300 l/ha	Aplicar desde BBCH 15 (5 hojas, desplegadas) hasta BBCH 87 (el color de las bayas muestra el color típico de la madurez). Dosis por aplicación: 0,3-1,3 l/ha
Vid de vinificación	OIDIO	0,06 - 0,1 %	Máx. 3	10	200-800 l/ha	Aplicar desde BBCH 15 (5 hojas, desplegadas) hasta BBCH 87 (el color de las bayas muestra el color típico de la madurez). Dosis por aplicación: 0,1-0,8 l/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Calabacín, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	1
Manzano	14
Vid de mesa, Vid de vinificación	15
Berenjena, Fresal, Pimiento, Tomate	3
Albaricoquero, Frambueso, Grosellero, Melocotonero	7
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Palmáceas, Palmera datilera, Rosales	NP

Condiciones generales de uso:

Para todos los usos autorizados al aire libre aplicar mediante pulverización normal con tractor.

Para todos los usos autorizados en invernadero, aplicar mediante pulverizaciones manuales con lanza/pistola y con mochila a alturas inferiores a 1 m o, con carretilla.

La aplicación mediante riego por goteo queda únicamente autorizada para las cucurbitáceas de piel comestible y cucurbitáceas de piel no comestible al aire libre e invernadero.

Aplicar tan pronto se manifiesten los primeros ataques.

En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para el correcto uso del producto y las indicaciones sobre los riesgos que puedan derivarse de aplicaciones incorrectas, así como la



información relativa a variedades sobre las que no exista suficiente garantía de tolerancia.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

• **MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:**

o Para todos los usos y métodos de aplicación ropa de trabajo y guantes de protección química.

• **APLICACIÓN MEDIANTE TRACTOR:**

o Ropa de trabajo

o Para el uso en vid de vinificación se deben usar boquillas de reducción de deriva del 50%.

INVERNADERO

• **MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:**

o Para todos los usos y métodos de aplicación ropa de trabajo y guantes de protección química.

• **APLICACIONES MANUALES (menos de 1 m de altura):**

o Ropa de trabajo

o Guantes de protección química

• **APLICACIÓN CON CARRETILLA:**

o Ropa de trabajo

o Guantes de protección química

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Pulverización al aire libre:

o Ropa de trabajo

o Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera, rosales, berenjena, pimiento y cucurbitáceas: se emplearán, además, guantes de protección química (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada).

Pulverización en invernadero:

o Ropa de trabajo y guantes de protección química

En usos con riego por goteo al aire libre o en invernadero:



- o Calzado adecuado según la Norma UNE-EN ISO 20347:2013

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

En usos con pulverización al aire libre:

2 días en vid de mesa, fresal y tomate

1 día en vid de vinificación

4 días en albaricoquero, melocotonero y nectarino

3 días en manzano

7 días en frambueso y grosellero

5 días en arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera y rosales

En usos con pulverización en invernadero:

3 días en berenjena y pimiento.

7 días en frambueso, grosellero, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera y rosales.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química

El operador no manipulará la instalación del sistema de riego durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riego antes del comienzo de la aplicación del producto.




Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Carretilla de pulverización de productos fitosanitarios, con avance en sentido contrario a la nube de pulverización, provista de dos barras pulverizadoras verticales, cada una de ellas dotada de 4 boquillas de abanico plano con porta-boquillas con función antigoteo. También debe disponer de un manómetro para controlar la presión de trabajo que se recomienda situar entre los 10-15 bares. La distancia entre las barras y el asa debe ser de al menos 1.5 m. Los equipos de pulverización deberán cumplir la legislación que le sea de aplicación en lo relativo a su diseño, comercialización y puesta en servicio, así como encontrarse en correctas condiciones de uso de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

Clasificaciones y Etiquetado:

<i>Clase y categoría de peligro (Humana)</i>	Carcinogenicidad. Categoría 2 Sensibilización cutánea. Categoría 1 B.
---	--



Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud) 
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 - Llevar guantes y prendas de protección. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente) 
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos Prudencia	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Spe3:

- Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial en los usos al aire libre de:

10 m con cubierta vegetal para tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino, manzano, albaricoque, melocotón, nectarino, frambueso y grosellero.

5 m para melón, sandía, calabaza, ornamentales leñosas, rosales, vid de mesa, vid de vinificación y frenal.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases



Nº REGISTRO: 23775

NIMROD EC N

de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

Otros componentes además del ingrediente activo técnico: 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --