



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: SAFRAN

Número de autorización: 24343

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 14/07/2006

Fecha de Caducidad: 30/04/2020

Titular

ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED

Hamilton House, Mabledon Place.

WC1H9BB

(London)

REINO UNIDO

Fabricante

ROTAM AGROCHEMICAL CO. LTD.

26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung

Street

Chai Wan

(Hong kong)

CHINA

Composición: ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Botellas de plástico de HDPE de 250 y 500 ml (\varnothing boca: 32 mm).

Botellas de plástico de HDPE de 1 litro (\varnothing boca: 50 mm).

Garrafas de plástico de HDPE de 5, 10 y 20 litros (\varnothing boca: 63 mm).



Usos y dosis autorizados:

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---|
| Berenjena | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Calabacín | LIRYOMIZA | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | ACAROS | | | | | |
| Canónigos | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 3 | 14 días | 500-1500 l/ha | |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Cítricos | ACARO ROJO | 0,04 % | 1 | - | 500-2000 l/ha | |
| | ARAÑA ROJA | | | | | |
| | PHYLLOCNISTIS | 0,03 - 0,04 % | | | | |
| Escarola | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 3 | 14 días | 500-1000 l/ha | |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Fresales | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 2 | 14 días | 500-1200 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Lechuga | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 3 | 14 días | 500-1000 l/ha | |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Limonero | ACARO DE LAS MARAVILLAS | 0,04 % | 1 | - | 500-2000 l/ha | |
| Maíz | ARAÑA ROJA | 1,5 l/ha | 1 | - | 500-800 l/ha | Aplicar al inicio de la infestación del BBCH 30 al 85. Para control de Tetranychus urticae. |
| Manzano | ACAROS | 0,075 % | 2 | 38-60 días | 500-1500 l/ha | |
| Melón | LIRYOMIZA | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | ACAROS | | | | | |
| Ornamentales herbáceas | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 1 | - | 500-2500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Pepino | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Peral | ACAROS | 0,075 % | 2 | 38-60 días | 500-1500 l/ha | |
| | ERINOSIS | | | | | |
| | PSILA | | | | | |
| Pimiento | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Sandía | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |
| Tomate | ACAROS | 0,05 - 0,1 % | 2 | 20 días | 600-1500 l/ha | Aplicación tanto al aire libre como en invernadero. |
| | LIRYOMIZA | | | | | |



Nº REGISTRO: 24343

SAFRAN

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----|----------------|-----------|-----------|------------|---------------|--|
| Vid | ARAÑA AMARILLA | 0,75 l/ha | 2 | 7 días | 400–1000 l/ha | Incluye uva de mesa y de vinificación. Aplicar tanto en aplicaciones tempranas como tardías del BBCH 13 al 85. Para el control de <i>Eotetranychus carpini</i> . |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|--|-------------|
| Cítricos, Limonero | 10 |
| Canónigos, Escarola, Lechuga | 14 |
| Maíz, Manzano, Peral, Vid | 28 |
| Calabacín, Fresales, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía | 3 |
| Berenjena, Tomate | 7 |
| Ornamentales herbáceas | NP |

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal mediante tractor o mochila al aire libre y pistola pulverizadora, cañón exterior o mediante sistemas automáticos en invernadero sin sobrepasar en ningún caso la dosis de 1,2 l/ha, excepto en maíz que se limita a 1,5 l/ha, frutales de pepita que se limita a 0,75 l/ha y lechugas y similares a 1 l/ha.

Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de tres veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción.

Se recomienda no utilizar abamectina en los cultivos de invernadero de noviembre a febrero.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador utilizará guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos químicos, y calzado resistente durante la mezcla/carga y aplicación. El trabajador utilizará ropa de trabajo adecuada: mono o chaqueta de manga larga y pantalón hechos de algodón (>300 g/m²) o de algodón y poliéster (>200 g/m²) y calzado resistente en la reentrada para los usos en vid, maíz, fresa, aplicación a cultivos arbóreos, hortícolas de fruto y ornamentales con cañón exterior y fresa manual con pistola en



invernadero. En el caso de la fresa el trabajador también usará guantes de protección.

En la aplicación con mochila a cítricos, hortícolas, ornamentales y fresa al aire libre y hortícolas en invernadero utilizar mono tipo 4 (ropa hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009). En cítricos y ornamentales sólo se podrá efectuar una aplicación. En caso de ser necesario un mayor nº de aplicaciones, éstas deberán realizarse con productos de distinta familia química.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- En viña, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada de 6 días tras la primera aplicación y de 8 días tras la segunda, para tareas de duración superior a 2 horas.
- En tomate, sandía, pimiento, pepino, melón, berenjena y calabacín, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada de 3 días tras la última aplicación, para tareas superiores a 2 horas, tanto al aire libre como en invernadero.
- En canónigos, escarola y lechuga, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada de 13 días tras la última aplicación, para tareas superiores a 2 horas, solo en cultivos al aire libre.
- En cítricos y limonero, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada de 6 días tras la aplicación, para tareas superiores a 2 horas.
- En ornamentales herbáceas, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada tras la aplicación, para tareas superiores a 2 horas, de 10 días en cultivos al aire libre y de 11 días en cultivos en invernadero.

El tractor irá equipado de cabina cerrada, y si no fuera así el operario deberá hacer uso de ropa de protección química.



SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Nota: En la evaluación del riesgo no se han tenido en cuenta las posibles mezclas del producto para aumentar su eficacia.

Clasificaciones y Etiquetado:

| | |
|--|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Irritación ocular. Categoría 2. Toxicidad aguda. Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Tóxicos específicos en determinados órganos tras exposiciones repetidas. Categoría 2. |
| Pictograma | GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)  |
| Palabra Advertencia | Atención |



| | |
|---|--|
| Indicaciones de peligro | H319 - Provoca irritación ocular grave. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H373 - Puede provocar daños en el tiroides y sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas. H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación. |
| Consejos de Prudencia | P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | Acuático agudo 1 Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra Advertencia | Atención |
| Indicaciones de peligro | H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos Prudencia | P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de

- 5 metros en maíz y en aplicaciones tempranas en viña (de marzo a mayo),
- 10 metros en hortalizas de fruto (tomate pimiento, berenjena, pepino, calabacín, melón y sandía), fresa, hortalizas de hoja (lechugas y similares) y en aplicaciones tardías en viña (de junio a septiembre),
- 15 metros en frutales de pepita (o 10 metros y boquillas de reducción de deriva del 50%)
- 20 metros en cítricos (o 15 metros y boquillas de reducción de deriva del 50% o 10 metros y boquillas e reducción de deriva del 75%)

SPE 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de:

- 10 metros y boquillas de reducción de la deriva del 95% en maíz y aplicaciones tempranas en viña.
- 15 metros y boquillas de reducción de la deriva del 95% en aplicaciones tardías en viña.
- 30 metros y boquillas de reducción de la deriva del 95% en hortalizas de fruto (tomate pimiento, berenjena, pepino, calabacín, melón y sandía), fresa, hortalizas de hoja (lechugas y similares), frutales de pepita y cítricos.



SPE 8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación Producto y/o caldo:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

- Otros componentes además del ingrediente activo técnico.

Ciclohexanol

Hidoxitolueno butilado (CAS 128-37-0)

- Otras leyendas e indicaciones.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

No autorizado para jardinería exterior doméstica.

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --