



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: TRINEO 25 EW

Número de autorización: 24409

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 06/07/2006

Fecha de Caducidad: 31/08/2020

Titular

**ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA
S.A.U.**

C/ Botiguers, nº 3, Planta 4ª L. Parque Empresarial
Táctica.
46980 Paterna
(Valencia)
ESPAÑA

Fabricante

**ASCENZA PRODUCTOS PARA
AGRICULTURA S.A.U.**

C/ Botiguers, nº 3, Planta 4ª L. Parque
Empresarial Táctica.
46980 Paterna
(Valencia)
ESPAÑA

Composición: TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Botellas de plástico HDPE/COEX de 40 ml (boca 26 mm).
Botellas de plástico HDPE/COEX de 1 l (boca 63, 54,7 y 54,4 mm).
Garrafas de plástico COEX de 5 l (boca 54,7 y 54,4 mm).
Garrafas de HDPE de 20 l (boca 63 mm).
Bidón de PE APM de 200 l (boca 52,5 mm). Los envases se utilizarán en condiciones de trasvase cerrado, mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón al sistema de aplicación



Usos y dosis autorizados:

| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|---|
| Ajos | STEMFILIUM | 1 | 2 | 21 | 400 l/ha | Realizar 2 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor, con un intervalo mínimo de 21 días entre ellas, la primera en la etapa del cultivo de desarrollo de las hojas y la siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando la base de la hoja empieza a engrosar). No aplicar el producto en otoño/invierno. No se podrán realizar estas dos aplicaciones si se ha llevado a cabo una aplicación previa del producto con el agua de riego (tras la siembra). |
| | BOTRITIS | | | | | Aplicación en pulverización foliar: máximo 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 21 días. Riego por goteo: dosis máxima: 1,6 l/ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. PS: NP. |
| | CLADOSPORIOSIS | | | | | |
| | ESCLEROTINIA | | | | | |
| | ROYA | | | | | |
| Cebada | SEPTORIA | 1 | 2 | 14-21 | 200-400 l/ha | |
| | ROYA | | | | | |
| | OIDIO | | | | | |
| | PYRENOPHORA TERES | | | | | |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|---------|----------------|------------|-----------|------------|------------|---|
| | RINCOSPORIUM | | | 14 | | Aplicar desde BBCH 30 (comienzo del encañado) hasta plazo de seguridad. |
| Cebolla | BOTRITIS | 1 | 2 | 21 | 400 l/ha | Aplicación en pulverización foliar. En riego por goteo: dosis máxima: 1,6 l/ha; una única aplicación por campaña después de la siembra. PS: NP. |
| | CLADOSPORIOSIS | | | | | |
| | ESCLEROTINIA | | | | | |
| | ROYA | | | | | |
| | STEMFILIUM | | | | | Realizar 2 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor, con un intervalo mínimo de 21 días entre ellas, la primera en la etapa del cultivo de desarrollo de las hojas y la siguiente a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando la base de la hoja empieza a engrosar). No aplicar el producto en otoño/invierno. No se podrán realizar estas dos aplicaciones si se ha llevado a cabo una aplicación previa del producto con el agua de riego (tras la siembra). |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|--|
| Olivo | REPILO | 0,6 | 1 | | 1.000 l/ha | Incluye aceituna de mesa y aceituna para producción de aceite. Aplicar desde las yemas florales, situadas normalmente en las axilas de las hojas, están completamente cerradas y son puntiagudas, sin pedúnculo y con brácteas de color ocre hasta que la corola cambia del color verde al blanco. (BBCH 50-59). |
| Trigo | SEPTORIA | 1 | 2 | 14-21 | 200-400 l/ha | |
| | ROYA | | | | | |
| | OIDIO | | | | | |
| | PYRENOPHORA TERES | | | | | |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|---------------|-------------|
| Ajos, Cebolla | 21 |
| Cebada, Trigo | 35 |
| Olivo | NP |

Condiciones generales de uso:

Tratamiento fungicida al aire libre.

Métodos de pulverización: aplicación normal con tractor (cebada, trigo, ajo, cebolla y olivo) y riego por goteo (ajo y cebolla).

Spa1: A efectos de prevenir la aparición de resistencias se realizarán un máximo de 2 aplicaciones por campaña en trigo, cebada, ajo y cebolla (estas últimas cuando la aplicación es foliar). Cuando el tratamiento va dirigido al suelo para ajo y cebolla, se realizará una única aplicación.

En la etiqueta se indicarán las instrucciones necesarias para la correcta aplicación del producto, asimismo se informará de la probabilidad de aparición de resistencias y se pondrán las estrategias de prevención y manejo de las mismas.

Excepciones: --

**Clase de usuario:**

Uso profesional.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del operador:

En todos los usos autorizados y cuando la pulverización sea normal con tractor, será necesario el uso de guantes en mezcla-carga; mientras tanto, en aplicación, será necesario el uso de guantes y ropa de trabajo tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034: 2005+A1:2009. En riego por goteo (ajo y cebolla), únicamente será necesario el uso de guantes en mezcla-carga.

Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

El tractor irá equipado con cabina cerrada y se utilizarán boquillas de baja deriva durante el tratamiento. En el caso de que el tractor no esté dotado de cabina cerrada, el operario deberá de hacer uso de ropa de protección química.

Durante la limpieza del equipo de aplicación, se utilizarán los mismos equipos de protección que durante la aplicación de producto.

Seguridad del trabajador:

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.



Plazo de reentrada en ajo y cebolla cuando la pulverización sea normal con tractor: 26 días.

Plazo de reentrada en olivo: 8 días para tareas que impliquen una duración superior a 2 h.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

Clasificaciones y Etiquetado:

| | |
|---|--|
| <i>Clase y categoría de peligro (Humana)</i> | Irritación ocular. Categoría 2. Sensibilización cutánea. Categoría 1 B. Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categoría 2 |
| <i>Pictograma</i> | GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)  |
| <i>Palabra Advertencia</i> | Atención |
| <i>Indicaciones de peligro</i> | H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 - Provoca irritación ocular grave. H332 - Nocivo en caso de inhalación. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H361d - Se sospecha que daña al feto. |



| | |
|---|---|
| Consejos de Prudencia | <p>P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.</p> <p>P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.</p> <p>P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.</p> <p>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.</p> <p>P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.</p> |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | <p>Acuático agudo 1</p> <p>Acuático crónico 1</p> |
| Pictograma | <p>GHS09 (medio ambiente) </p> |
| Palabra Advertencia | <p>Atención</p> |
| Indicaciones de peligro | <p>H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.</p> |
| Consejos Prudencia | <p>P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P391 - Recoger el vertido.</p> <p>P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.</p> |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Debido al riesgo en organismos acuáticos, en ajos y cebollas no se debe aplicar el producto en otoño/invierno.

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal para cereales, ajos y cebollas (aplicación en pulverización) y de 5 m para ajos y cebollas en aplicación mediante riego (goteo) hasta las masas de agua superficial.

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta las masas de agua superficial para olivo.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los



Nº REGISTRO: 24409

TRINEO 25 EW

sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

Otros componentes además del ingrediente activo técnico: N,N-dimetildecán-1-amida (CAS 14433-76-2)

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

El titular de producto basado en azol debe llevar a cabo un monitoreo del agua subterránea para el metabolito (1,2,4-triazol), con posterioridad al registro.

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --