



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** MOVENTO 150 O-TEQ

**Número de autorización:** 25298

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 27/07/2012

**Fecha de Caducidad:** 30/04/2025

**Titular**

**BAYER CROPSCIENCE, S.L.**

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 Sant Joan Despi

(Barcelona)

España

**Fabricante**

**BAYER AG (LEVERKUSEN)**

Kaiser Wilhelm Allee 1

51373

(Leverkusen)

ALEMANIA

**Composición:** SPIROTETRAMAT 15% [OD] P/V

**Envases:**

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
Botella de plástico de 0,25 l. (aplicaciones manuales), 0,5 y 1 l. Garrafa de plástico de 5 l. (boca de 60 mm.)

**Usos y dosis autorizados:**



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	TRIPS	0,05 - 0,065 %	4	14	500-1500 l/ha	Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.
	MOSCA BLANCA	0,04 - 0,065 %		7	500-770 l/ha	Aire libre: No sobrepasar la dosis



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES	0,04 - 0,05 %			500-1000 l/ha	máxima de 0,5 l/ha. Mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH 15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (Madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen 500 – 1500 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.
Cítricos	PIOJO ROJO	0,03 - 0,04 %	2	21	1000-3000 l/ha	No sobrepasar la dosis de 1,5 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar a partir del cuajado del fruto (BBCH 71) hasta frutos 80% de su tamaño final (BBCH 78), con tractor o manual con mochila, lanza o pistola.
	PIOJO GRIS	0,04 -				
	PIOJO BLANCO	0,05 %				
	COTONET	0,03 - 0,05 %				
	MOSCA BLANCA					
PULGONES	0,03 - 0,04 %					
Cucurbitáceas	MOSCA BLANCA	0,1 - 0,5 l/ha	4	7	300-1000 l/ha	Incluye melón, calabacín, sandía y



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES					calabaza. Aire libre: Aplicar mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH15 (5ª hoja del tallo principal desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Invernadero: Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del tallo principal desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Haba verde	MOSCA BLANCA	0,04 - 0,065 %	2	7	500-770 l/ha	Aire libre: no sobrepasar la dosis máxima de 0,5 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH69 (final de la floración) hasta BBCH79 (las vainas han alcanzado su longitud típica). Invernadero: no sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (quinta hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena). Cuatro aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES	0,04 - 0,05 %			500-1000 l/ha	<p>Aire libre: no sobrepasar la dosis máxima de 0,5 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH69 (final de la floración) hasta BBCH79 (las vainas han alcanzado su longitud típica).</p> <p>Invernadero: no sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (quinta hoja verdadera desplegada) hasta BBCH79 (las vainas han alcanzado su longitud típica). Cuatro aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.</p>
Hortalizas del género Brassica	MOSCA BLANCA	0,1 - 0,5 l/ha	2	14	300-1000 l/ha	<p>Incluye brécol, coliflor, repollo, coles de China y berzas, excepto col de Bruselas. Aire libre: Aplicar mediante pulverización foliar con tractor, o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH15 (5ª hoja desplegada) hasta BBCH49 (alcanzados tamaño, forma y firmeza del cogollo típicos).</p>
	PULGÓN					



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Judía verde	MOSCA BLANCA	0,04 - 0,065 %	2	7	500-770 l/ha	Aire libre: no sobrepasar la dosis máxima de 0,5 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH69 (final de la floración) hasta BBCH79 (las vainas han alcanzado su longitud típica). Invernadero: no sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (quinta hoja verdadera desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena). Cuatro aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES	0,04 - 0,05 %			500-1000 l/ha	<p>Aire libre: no sobrepasar la dosis máxima de 0,5 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH69 (final de la floración) hasta BBCH79 (las vainas han alcanzado su longitud típica).</p> <p>Invernadero: no sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (quinta hoja verdadera desplegada) hasta BBCH79 (las vainas han alcanzado su longitud típica). Cuatro aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.</p>
Lechuga y similares	PULGONES	0,1 - 0,4 l/ha	2	14	300-800 l/ha	<p>Incluye lechuga, canónigos, escarolas, mastuerzo, barbareas, rúcula y mostaza china). Aire libre: Aplicar mediante pulverización foliar con tractor, o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH15 (5ª hoja desplegada) hasta BBCH49 (alcanzados tamaño, forma y firmeza del cogollo típicos).</p>
Pepino	MOSCA BLANCA	0,04 - 0,065 %	4	7	500-770 l/ha	Aire libre: No sobrepasar la dosis





Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES	0,04 - 0,05 %			500-1000 l/ha	máxima de 0,5 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH15 (5ª hoja del tallo principal desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del tallo principal desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS	0,05 - 0,065 %				Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del tallo principal desplegada) hasta BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.
Pimiento	MOSCA BLANCA	0,04 - 0,065 %	4	7	500-770 l/ha	Aire libre: No sobrepasar la dosis



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	PULGONES	0,04 - 0,05 %			500-1000 l/ha	máxima de 0,5 l/ha. Mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH 15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (Madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen 500 – 1500 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.
	TRIPS	0,05 - 0,065 %		14	500-1500 l/ha	Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	COCHINILLA HARINOSA	0,04 - 0,05 %		7	500-1000 l/ha	<p>Aire libre: No sobrepasar la dosis máxima de 0,5 l/ha. Mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH 15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (Madurez plena: los frutos tienen un color maduro).</p> <p>Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen 500 – 1500 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.</p>
Tomate	PULGONES	0,04 - 0,05 %	4	7	500-1000 l/ha	Aire libre: No sobrepasar la dosis



Nº REGISTRO: 25298

MOVENTO 150 O-TEQ

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOSCA BLANCA	0,04 - 0,065 %			500-770 l/ha	máxima de 0,5 l/ha. Mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH 15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (Madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen 500 – 1500 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.
	TRIPS	0,05 - 0,065 %		14	500-1500 l/ha	Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ACARO DEL BRONCEADO	0,04 - 0,065 %		7	500-770 l/ha	<p>Aire libre: No sobrepasar la dosis máxima de 0,5 l/ha. Mediante pulverización foliar con tractor o manual con mochila, lanza o pistola. Desde BBCH 15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (Madurez plena: los frutos tienen un color maduro).</p> <p>Invernadero: No sobrepasar la dosis máxima de 0,975 l/ha. Volumen 500 – 1500 l/ha. Mediante pulverización foliar manual con mochila, lanza o pistola, o con cañón atomizador desde el exterior, o mediante instalaciones fijas automatizadas o manual con carretilla. Desde BBCH15 (5ª hoja del brote principal desplegada) a BBCH89 (madurez plena: los frutos tienen un color maduro). Con 2 bloques de 2 aplicaciones, con un intervalo de mínimo de 14 días entre aplicaciones y de 8 semanas entre bloques.</p>
Vid de mesa	MELAZO	0,04 - 0,06 %	2	14	400-1000 l/ha	<p>No sobrepasar la dosis máxima de 0,6 l/ha. Aplicar mediante pulverización foliar a partir del fin de la floración (BBCH 69) hasta el ablandamiento de las bayas (BBCH 85), con tractor o manual con mochila, lanza o pistola.</p>

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Cítricos, Haba verde, Judía verde	14
Vid de mesa	21



Uso	P.S. (días)
Berenjena, Cucurbitáceas, Pepino, Pimiento, Tomate	3
Hortalizas del género Brassica, Lechuga y similares	7

### **Condiciones generales de uso:**

Tratamiento insecticida sistémico.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas)

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Movemento 150 O-Teq actúa sobre la plaga objetivo principalmente vía ingestión. Por tanto, la eficacia biológica depende de la penetración de la sustancia activa en los tejidos de las hojas y de la translocación dentro de la planta. La penetración y la sistemia, y en consecuencia la eficacia, pueden verse reducidas si las aplicaciones se realizan durante periodos de estrés fisiológico del cultivo (por ejemplo, por bajas temperaturas o sequía) o cuando las plantas no están en crecimiento activo. Es por ello que Movemento 150 O-Teq actúa mejor si se aplica al follaje verde en crecimiento y a las ramas jóvenes. Asegurar una buena distribución del producto mediante una aplicación de calidad.

Se recomienda aplicar el producto solo, evitando mezclas en tanque con otros productos

Gracias a su modo de acción diferenciado, el uso de spirotetramat no presenta resistencia cruzada con insecticidas convencionales (neonicotinoides, organofosforados, carbamatos y piretroides), por lo que está especialmente indicado contra plagas resistentes a este tipo de insecticidas y es recomendable su inclusión en programas de prevención de resistencias a los mismos.

Estrategia para el manejo de resistencias:

- Emplear el producto tal y como se indica en la etiqueta (respetando dosis máximas y momento de aplicación).
- Asegurar una cobertura de pulverización completa y uniforme.
- Spirotetramat se debe utilizar de tal forma que efectos perjudiciales insectos/ácaros sobre los beneficios se reduzcan al mínimo.
- Alternar con insecticidas de diferentes modos de acción.
- Para el control de la mosca blanca, se recomienda realizar un total de 4 aplicaciones con spirotetramat en cultivos de ciclo largo, alternando con insecticidas de diferentes modos de acción.
- En cultivos perennes se recomienda realizar de 1 a 2 aplicaciones de spirotetramat según la especie y nivel de infestación.
- Si se evidencian síntomas de resistencia, no emplear productos cuyos ingredientes activos sean de la familia química de los ketoenoles (o derivados del ácido tetrónico).

**Excepciones:** --

**Clase de usuario:**

Uso profesional

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**



## SEGURIDAD DEL APLICADOR

### AIRE LIBRE:

- MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para todos los métodos de aplicación:

- o Ropa de trabajo
- o Guantes de protección química

- APLICACIÓN:

- o Mediante tractor: ropa de trabajo.
- o Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

### INVERNADERO

- MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

Para todos los métodos de aplicación:

- o Ropa de trabajo
- o Guantes de protección química

- APLICACIÓN:

Pulverizaciones manuales con mochila, lanza/pistola y carretilla:

- o Ropa de trabajo
- o Guantes de protección química

Pulverizaciones con cañón atomizador desde el exterior:

- o Ropa de trabajo

### SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- o Ropa de trabajo

### FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Carretilla de pulverización de productos fitosanitarios, con avance en sentido contrario a la nube de pulverización, provista de dos barras pulverizadoras verticales, cada una de ellas dotada de 4 boquillas de abanico plano con porta-boquillas con función antigoteo. También debe disponer de un manómetro para controlar la presión de trabajo que se recomienda situar entre los 10-15 bares. La distancia entre las barras y el asa debe ser de, al menos, 1,5 m. Los equipos de pulverización deberán cumplir la legislación que le sea de aplicación en lo relativo a su diseño, comercialización y puesta en servicio, así como encontrarse en correctas condiciones de uso de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo




No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No entrar en el invernadero hasta finalizada la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de pulverización automático antes del comienzo de la aplicación del producto.

### **Clasificaciones y Etiquetado:**





<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Irritación ocular. Categoría 2. Sensibilización cutánea. Categoría 1 A. Toxicidad para la reproducción, categoría 2 (fertilidad y desarrollo)
<b>Pictograma</b>	GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud) 
<b>Palabra Advertencia</b>	Atención
<b>Indicaciones de peligro</b>	H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 - Provoca irritación ocular grave. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H361fd - Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 - Llevar guantes y prendas de protección. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	Acuático crónico 2
<b>Pictograma</b>	GHS09 (medio ambiente) 
<b>Palabra Advertencia</b>	--
<b>Indicaciones de peligro</b>	H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
<b>Consejos Prudencia</b>	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

Spe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cítricos hasta la zona no cultivada.

SPe8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración



de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

**Eliminación Producto y/o caldo: --**

**Gestión de envases:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase:

“Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno”.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

**Condiciones de almacenamiento: --**