



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** HELICOVEX  
**Número de autorización:** ES-00181  
**Estado:** Vigente  
**Fecha de inscripción:** 04/02/2016  
**Fecha de Caducidad:** 31/05/2023

**Titular**

**AGRICHEM, S.A.**  
Plaza de Castilla, 3- 14 A  
28046 Madrid  
(Madrid)  
ESPAÑA

**Fabricante**

**ANDERMATT BIOCONTROL AG**  
Stahlermatten 6  
CH-6146 Grossdietwil  
SUIZA

**Composición:** VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA (7,5 x 10E12  
OB/L) 50% [SC] P/V. Cepa DSMZ: BV-0003

**Envases:**

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
Envases de PE COEX de 100 ml, 200 ml y 500 ml.

**Usos y dosis autorizados:**

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Acelga	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Acerolo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Achicoria	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Aguaturma	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Alcachofa	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Alforfón	HELIOTIS	0,2	4	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Altramuz	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Apio	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Tallo y Hojas. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Apionabo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Árândano	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Árbol de la pasión	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Arboles y arbustos no frutales	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Berro de agua	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Berza	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Borraja	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Brécol	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Calabacín	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Calabaza	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Caña de azúcar	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Cáñamo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Cardos comestibles	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Cebolla	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Cebolleta	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Cebollino	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Chalote	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Chirivía	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Col de Bruselas	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Coles	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.





USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Coles de china	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Colinabo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Endibia	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Espárrago	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Espinaca	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Frambueso	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Fresaes	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Garbanzo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Girasol	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Grosellero	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (incluye grosellero espinoso, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Guanábano	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Guisantes (con vaina)	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Guisantes (sin vaina)	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo en invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Habas	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Habas de soja	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Habas para grano	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Hierbas aromáticas y flores comestibles	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Hinojo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Judías (sin vaina)	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2- generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias referente a usos menores (*).



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Judías para grano	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Judías verdes	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Con vaina. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Lechugas y similares	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Leguminosas de grano	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Leguminosas verdes (frescas)	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Lentejas	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Lichi	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.



Nº REGISTRO: ES-00181

HELICOVEX

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Maíz	HELIOTIS	0,2	4	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha.
Maíz dulce	HELIOTIS	0,2	4	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha.
Mastuerzo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Melón	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Mijo	HELIOTIS	0,2	4	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Mirtilo gigante	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Moral	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Moras árticas	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Nabo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Okra o quimbombo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ornamentales	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Otras herbáceas extensivas	HELIOTIS	0,2	4	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (solo otros pseudo-cereales, uso menor): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Otras semillas oleaginosas	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Otros tallos jóvenes	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (solo brotes de bambú y palmito, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)





USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Otros tubérculos hortícolas	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (solo mandioca, batata, boniato, ñame y arruruces, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Pepinillo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Pepino	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Pimiento	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Piña Tropical	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Platanera	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Puerro	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Rábano	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Rábanos rusticanos	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Raíz de perejil	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Remolacha de mesa	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Repollo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Rosa spp.	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (sólo Rosal silvestre, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ruibarbo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Salsifí	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Sáuco	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Sorgo	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Tabaco	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.



USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Tomate	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año.
Verdolaga	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)
Zarzamoras	HELIOTIS	0,2	12	8 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*)

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**



Uso	P.S. (días)
Acelga, Acerolo, Achicoria, Aguaturma, Ajos, Alcachofa, Alforfón, Altramuz, Apio, Apionabo, Arándano, Árbol de la pasión, Arboles y arbustos no frutales, Berenjena, Berro de agua, Berza, Borraja, Brécol, Calabacín, Calabaza, Caña de azúcar, Cáñamo, Cardos comestibles, Cebolla, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Chirivía, Col de Bruselas, Coles, Coles de china, Colinabo, Endibia, Espárrago, Espinaca, Frambueso, Fresales, Garbanzo, Girasol, Grosellero, Guanábano, Guisantes (con vaina), Guisantes (sin vaina), Habas, Habas de soja, Habas para grano, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hinojo, Judías (sin vaina), Judías para grano, Judías verdes, Lechugas y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Lentejas, Lichi, Maíz, Maíz dulce, Mastuerzo, Melón, Mijo, Mirtilo gigante, Moral, Moras árticas, Nabo, Okra o quimbombo, Ornamentales, Otras herbáceas extensivas, Otras semillas oleaginosas, Otros tallos jóvenes, Otros tubérculos hortícolas, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Piña Tropical, Platanera, Puerro, Rábano, Rábanos rusticanos, Raíz de perejil, Remolacha de mesa, Repollo, Rosa spp., Ruibarbo, Salsifí, Saúco, Sorgo, Tabaco, Tomate, Verdolaga, Zorzamoras	NP

**Fecha de Liberación (Protección de Datos):**



Uso - Agente	Fecha de Liberación
Acelga, Acerolo, Achicoria, Aguaturma, Ajos, Alcachofa, Alforfón, Altramuz, Apio, Apionabo, Arándano, Árbol de la pasión, Árboles y arbustos no frutales, Berenjena, Berro de agua, Berza, Borraja, Brécol, Calabacín, Calabaza, Caña de azúcar, Cáñamo, Cardos comestibles, Cebolla, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Chirivía, Col de Bruselas, Coles, Coles de china, Colinabo, Endibia, Espárrago, Espinaca, Frambueso, Fresales, Garbanzo, Girasol, Grosellero, Guánabano, Guisantes (con vaina), Guisantes (sin vaina), Habas, Habas de soja, Habas para grano, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hinojo, Judías (sin vaina), Judías para grano, Judías verdes, Lechugas y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Lentejas, Lichi, Maíz, Maíz dulce, Mastuerzo, Melón, Mijo, Mirtilo gigante, Moral, Moras árticas, Nabo, Okra o quimbombo, Ornamentales, Otras herbáceas extensivas, Otras semillas oleaginosas, Otros tallos jóvenes, Otros tubérculos hortícolas, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Piña Tropical, Platanera, Puerro, Rábano, Rábanos rusticanos, Raíz de perejil, Remolacha de mesa, Repollo, Rosa spp., Ruibarbo, Salsifí, Saúco, Sorgo, Tabaco, Tomate, Verdolaga, Zorzamoras - HELIOTIS	04/02/2026

**Condiciones generales de uso:**

Tratamientos insecticidas. Aplicar mediante pulverización normal en aplicaciones con tractor y mochila al atardecer o temprano por la mañana. En el cultivo del maíz y maíz dulce la aplicación será con tractor.

Aplicar sobre larvas (preferiblemente en los estadíos tempranos L1 y L2). Primer tratamiento justo antes de la eclosión de las primeras larvas.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

**Excepciones:** --**Clase de usuario:**

Uso profesional.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

- Seguridad del APLICADOR:

Se recomienda utilizar durante la mezcla y carga guantes de protección química, ropa de protección, al menos de tipo 6 (protege frente a salpicaduras líquidas), protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2) y calzado resistente a productos químicos.



- Seguridad del TRABAJADOR:

Se recomienda utilizar durante la manipulación de la fruta tratada guantes de protección química y ropa de trabajo.

### **Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

### **Mitigación de riesgos ambientales:**

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Evitar el uso de polinizadores en invernadero tras el tratamiento.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

### **Eliminación Producto y/o caldo:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

### **Gestión de envases:**





Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

**EUH401: A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Contiene Virus de la poliedrosis nuclear de Helicoverpa armigera. Puede provocar reacciones de sensibilización.

(\*) Con respecto a los usos menores aprobados en esta propuesta de autorización (zarzamora, mora ártica, frambuesa, mirtilo gigante, arándano, grosella, grosella espinosa, escaramujo, mora, acerola, bayas de saúco, mandioca, batata, boniato, ñame, arrurruces, remolacha, apionabo, rábano rusticano, aguaturma, chirivía, raíz de perejil, rábano, salsifí, colinabo, nabo, ajo, chalota, cebolleta, cebollino, okra o quibombo, pepino, pepinillo, calabaza, brécol, coles de Bruselas, repollo, col china, berza, espinaca, verdolaga, acelga, berro de agua, endivia, judías sin vaina, guisantes con vaina, espárrago, cardo, tallos de borraja, apio, hinojo, alcachofa, ruibarbo, brotes de bambú, palmito, habas, lentejas, garbanzos, altramuces, alforfón y otros pseudo-cereales y mijo) tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta”.

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**