



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: HELICOVEX
Número de autorización: ES-00181
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 04/02/2016
Fecha de Caducidad: 31/05/2023

Titular

AGRICHEM, S.A.
Plaza de Castilla, 3- 14 A
28046 Madrid
(Madrid)
ESPAÑA

Fabricante

ANDERMATT BIOCONTROL AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SUIZA

Composición: VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA 50% [SC] P/V

Envases:

| Presentación/Capacidad/Material |
|--|
|--|

| |
|--|
| Envases de PE COEX de 100 ml, 200 ml y 500 ml. |
|--|

**Usos y dosis autorizados:**

| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Acelga | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Acerolo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Aguaturma | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Ajos | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Alcachofa | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Alforfón | HELIOTIS | 0,2 | 4 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Altramuz | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Apio | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Apionabo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|---------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Arándano | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Berenjena | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Berro de agua | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Berza | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Borraja | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|--------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Brécol | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Calabacín | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Calabaza | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Cardos comestibles | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Cebolleta | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Cebollino | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Chalote | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Chirivía | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Coles de bruselas | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Coles de china | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Colinabo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Endibia | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Espárrago | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Espinaca | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Frambueso | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|---|
| Garbanzo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Grosellero | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (incluye grosellero espinoso, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Guisantes (con vaina) | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Habas | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|----------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Habas para grano | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Hierbas aromáticas | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Hinojo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Judías (sin vaina) | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Judías para grano | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Judías verdes | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Lechugas y similares | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Lentejas | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Maíz | HELIOTIS | 0,2 | 4 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. |
| Maíz dulce | HELIOTIS | 0,2 | 4 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. |
| Melón | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Mijo | HELIOTIS | 0,2 | 4 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Mirtilo gigante | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Moral | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|----------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|---|
| Moras árticas | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Nabo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Okra o quimbombo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Ornamentales | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Otras herbáceas extensivas | HELIOTIS | 0,2 | 4 | 8 | 200-1000 l/ha | (solo otros pseudo-cereales, uso menor): Aplicar de 1 a 4 tratamientos hasta la cosecha. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|---|
| Otros tallos jóvenes | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (solo brotes de bambú y palmito, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Otros tubérculos hortícolas | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (solo mandioca, batata, boniato, ñame y arruques, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Pepinillo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Pepino | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Puerro | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|--------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Rábano | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Rábanos rusticanos | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Raíz de perejil | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Remolacha de mesa | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Repollo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|-----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Rosa spp. | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (sólo Rosal silvestre, uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Ruibarbo | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Salsifí | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Sáuco | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Tabaco | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |
| Tomate | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. |



| USO | AGENTE | Dosis l/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) |
|------------|----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| Verdolaga | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |
| Zarzamoras | HELIOTIS | 0,2 | 12 | 8 | 200-1000 l/ha | (Uso menor): Aplicar 2-3 tratamientos por generación. 2-4 generaciones por año. Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*) |

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

| Uso | P.S. (días) |
|--|-------------|
| Acelga, Acerolo, Aguaturma, Ajos, Alcachofa, Alforfón, Altramuz, Apio, Apionabo, Arándano, Berenjena, Berro de agua, Berza, Borraja, Brécol, Calabacín, Calabaza, Cardos comestibles, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Chirivía, Coles de bruselas, Coles de china, Colinabo, Endibia, Espárrago, Espinaca, Frambueso, Garbanzo, Grosellero, Guisantes (con vaina), Habas, Habas para grano, Hierbas aromáticas, Hinojo, Judías (sin vaina), Judías para grano, Judías verdes, Lechugas y similares, Lentejas, Maíz, Maíz dulce, Melón, Mijo, Mirtilo gigante, Moral, Moras árticas, Nabo, Okra o quimbombo, Ornamentales, Otras herbáceas extensivas, Otros tallos jóvenes, Otros tubérculos hortícolas, Pepinillo, Pepino, Puerro, Rábano, Rábanos rusticanos, Raíz de perejil, Remolacha de mesa, Repollo, Rosa spp., Ruibarbo, Salsifí, Saúco, Tabaco, Tomate, Verdolaga, Zorzamoras | NP |

Fecha de Liberación (Protección de Datos):



| Uso - Agente | Fecha de Liberación |
|---|---------------------|
| Acelga, Acerolo, Aguaturma, Ajos, Alcachofa, Altramuz, Apio, Apionabo, Arándano, Berenjena, Berro de agua, Berza, Borraja, Brécol, Calabacín, Calabaza, Cardos comestibles, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Chirivía, Coles de bruselas, Coles de china, Colinabo, Endibia, Espárrago, Espinaca, Frambueso, Garbanzo, Grosellero, Guisantes (con vaina), Habas, Habas para grano, Hierbas aromáticas, Hinojo, Judías (sin vaina), Judías para grano, Judías verdes, Lechugas y similares, Lentejas, Melón, Mirtilo gigante, Moral, Moras árticas, Nabo, Okra o quimbombo, Ornamentales, Otros tallos jóvenes, Otros tubérculos hortícolas, Pepinillo, Pepino, Puerro, Rábano, Rábanos rusticanos, Raíz de perejil, Remolacha de mesa, Repollo, Rosa spp., Ruibarbo, Salsifí, Saúco, Tabaco, Tomate, Verdolaga, Zarzamoras - HELIOTIS | 04/02/2026 |

Condiciones generales de uso:

Tratamientos insecticidas al aire libre y en invernadero en todos los cultivos autorizados a excepción de maíz y maíz dulce en los que la aplicación será al aire libre. Aplicar mediante pulverización normal en aplicaciones con tractor y mochila al atardecer o temprano por la mañana. En el cultivo del maíz y maíz dulce la aplicación será con tractor.

Aplicar sobre larvas (preferiblemente en los estadíos tempranos L1 y L2). Primer tratamiento justo antes de la eclosión de las primeras larvas.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes y ropa de protección adecuada tanto para la mezcla y carga como para la aplicación siguiendo los consejos de las buenas prácticas agrícolas, así como equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el concentrado o al aplicar el producto.

El uso de los envases de más de 20 L queda restringido al uso en condiciones de transvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.

Clasificaciones y Etiquetado:



| | |
|---|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | |
| Pictograma | |
| Palabra Advertencia | |
| Indicaciones de peligro | EUH 208 - Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede provocar una reacción alérgica EUH 210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. |
| Consejos de Prudencia | P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio ambiental) | |
| Pictograma | |
| Palabra Advertencia | |
| Indicaciones de peligro | |
| Consejos Prudencia | |

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Evitar el uso de polinizadores en invernadero tras el tratamiento.

Eliminación Producto y/o caldo:

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras indicaciones reglamentarias:

"A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO," en caracteres que resalten el texto.

Contiene virus de la poliedrosis nuclear de Helicoverpa armigera. Puede provocar reacciones de sensibilización.

(*) Con respecto a los usos menores aprobados en esta propuesta de autorización (zarzamora, mora ártica, frambuesa, mirtilo gigante, arándano, grosella, grosella espinosa, escaramujo, mora, acerola, bayas de saúco, mandioca, batata, boniato, ñame, arrurruces, remolacha, apionabo, rábano rústicano, aguaturma, chirivía, raíz de perejil, rábano, salsifí, colinabo, nabo, ajo, chalota, cebolleta, cebollino, okra o quibombo, pepino, pepinillo, calabaza, brécol, coles de Bruselas, repollo, col china, berza, espinaca, verdolaga, acelga, berro de agua, endivia, judías sin vaina, guisantes con vaina, espárrago, cardo, tallos de borraja, apio, hinojo, alcachofa, ruibarbo, brotes de bambú, palmito, habas, lentejas, garbanzos, altramuces, alforfón y otros pseudo-cereales y mijo) tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta".

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --