



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** TAEURO  
**Número de autorización:** ES-00878  
**Estado:** Vigente  
**Fecha de inscripción:** 05/02/2020  
**Fecha de Caducidad:** 01/06/2033

**Titular**

**NOVOZYMES FRANCE S.A.S.**  
Parch techno.des Grillons - 60 route de  
Sartrouville - Bâtiment 6  
78230 Le Pecq  
(Yvelines)  
FRANCIA

**Fabricante**

**NOVOZYMES FRANCE S.A.S.**  
Parch techno.des Grillons - 60 route de  
Sartrouville - Bâtiment 6  
78230 Le Pecq  
(Yvelines)  
FRANCIA

**Composición:** BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa FZB24) 13% [WP] P/P

**Envases:**

<b><u>Presentación/Capacidad/Material</u></b>
Bolsas de 370 g o 375 g.

**Usos y dosis autorizados:**



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	MILDIU	0,185 - 0,37	1-12 (ver cond)	ver cond	180-1000 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.  Aire libre: hasta 10 aplicaciones con un intervalo de 7 días. Invernadero: hasta 12 aplicaciones con un intervalo de 3 días.
	OIDIO		1-12	3 días		Uso solo en invernadero. Eficaz contra <i>Oidium neolycopersici</i> y <i>Leveillula taurica</i> . Aplicar entre BBCH 10-89.
	ALTERNARIA					Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.
Calabacín	OIDIO	0,185 - 0,37	1-12	3 días	180-1000 l/ha	Uso solo en invernadero. Eficaz contra <i>Podospaera xanthii</i> (= <i>Spaerotheca fuliginea</i> ) y <i>Erysiphe cichoracearum</i> (= <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ). Aplicar entre BBCH 10-89.
Fresal	BOTRITIS	0,185 - 0,37	1-12	3 días	180-1000 l/ha	Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 10-93.
Lechuga	MILDIU	0,185 - 0,37	1-12 (ver cond)	ver cond	180-1000 l/ha	Uso al aire libre e invernadero contra el mildiu de la lechuga. Aplicar entre BBCH 10-89.  Aire libre: hasta 10 aplicaciones con un intervalo de 7 días. Invernadero: hasta 12 aplicaciones con un intervalo de 3 días.
	ESCLEROTINIA		1-10	7 días		Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Melón	OIDIO	0,185 - 0,37	1-12	3 días	180-1000 l/ha	Uso solo en invernadero. Eficaz contra <i>Podsophaera xanthii</i> (=Spaerotheca fuliginea) y <i>Erysiphe cichoracaerum</i> (=Golovinomyces cichoracearum). Aplicar entre BBCH 10-89.
Pepino	OIDIO	0,185 - 0,37	1-12	3 días	180-1000 l/ha	Uso solo en invernadero. Eficaz contra <i>Podsophaera xanthii</i> (=Spaerotheca fuliginea) y <i>Erysiphe cichoracaerum</i> (=Golovinomyces cichoracearum). Aplicar entre BBCH 10-89.
Pimiento	MILDIU	0,185 - 0,37	1-12 (ver cond)	ver cond	180-1000 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Únicamente para chile y pimiento morrón. Aplicar entre BBCH 10-89.  Aire libre: hasta 10 aplicaciones con un intervalo de 7 días. Invernadero: hasta 12 aplicaciones con un intervalo de 3 días.
	ALTERNARIA					Uso solo en invernadero. Únicamente en chile y pimiento morrón. Aplicar entre BBCH 10-89.
	OIDIO		1-12	3 días		Uso solo en invernadero. Únicamente en chile y pimiento morrón. Eficaz contra <i>Oidium neolycopersici</i> y <i>Leveillula taurica</i> . Aplicar entre BBCH 10-89.
Sandía	OIDIO	0,185 - 0,37	1-12	3 días	180-1000 l/ha	Uso solo en invernadero. Eficaz contra <i>Podsophaera xanthii</i> (=Spaerotheca fuliginea) y <i>Erysiphe cichoracaerum</i> (=Golovinomyces cichoracearum). Aplicar entre BBCH 10-89.



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Tomate	MILDIU	0,185 - 0,37	1-12 (ver cond)	ver cond	180-1000 l/ha	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.  Aire libre: hasta 10 aplicaciones con un intervalo de 7 días. Invernadero: hasta 12 aplicaciones con un intervalo de 3 días.
	OIDIO		1-12	3 días		Uso solo en invernadero. Eficaz contra Oidium neolycopersici y Leveillula taurica. Aplicar entre BBCH 10-89.
	ALTERNARIA					Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.
Vid	PODREDUMBRE GRIS	0,185 - 0,37	1-10	7 días	180-1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 10-89.
	OIDIO					

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Fresal, Lechuga, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate, Vid	1

**Fecha de Liberación (Protección de Datos):**

Uso - Agente	Fecha de Liberación
Berenjena, Lechuga, Pimiento, Tomate, - MILDIU	05/11/2033
Berenjena, Calabacín, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate, Vid, - OIDIO	05/11/2033
Berenjena, Pimiento, Tomate, - ALTERNARIA	05/11/2033
Fresal, - BOTRITIS	05/11/2033
Lechuga, - ESCLEROTINIA	05/11/2033
Vid, - PODREDUMBRE GRIS	05/11/2033

**Condiciones generales de uso:**

Fungicida de aplicación por pulverización foliar.

Consultar a los procesadores antes de usar en cultivos que van a destinarse a ser procesados (casos del tomate, fresal y vid).

No utilizar el producto mezclado con otro producto fungicida.



Indicar las condiciones de uso óptimas del producto con respecto a las aplicaciones de productos fungicidas.

La eficacia del producto puede resultar variable y parcial, indicar las condiciones de uso óptimas.

**Excepciones:** --

**Clase de usuario:**

Uso profesional.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

Seguridad del OPERARIO:

Durante la mezcla, carga y aplicación se deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección de tipo 6B, protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2) y calzado resistente a productos químicos.

Seguridad del TRABAJADOR:

Se deberá utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b><i>Clase y categoría de peligro (Humana)</i></b>	
<b><i>Pictograma</i></b>	
<b><i>Palabra Advertencia</i></b>	
<b><i>Indicaciones de peligro</i></b>	PFBR - Conforme al artículo 47 del Reglamento 1107/2009 se autoriza como "Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo"
<b><i>Consejos de Prudencia</i></b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.



<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m para hortalizas de fruto hasta las masas de agua superficial.

Para el uso en invernadero, evitar la expulsión directa de residuos en el entorno.

**Eliminación Producto y/o caldo:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contiene Bacillus amyloliquefaciens (cepa FZB24). Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.



**Nº REGISTRO: ES-00878**

**TAEGRO**

**Condiciones de almacenamiento:**

P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 20°C.