



Descriptores de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (U.P.O.V.)

Variedad: Nectared 8

Lugar de estudio: Aragón

RAMO

| Nº UPOV | CARÁCTER | EXPRESIÓN | NIVEL |
|---------|----------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | TIPO DE ÁRBOL | <i>normal</i> | 1 |
| 4 | GROSOR DEL RAMO MIXTO | <i>grueso</i> | 7 |
| 5 | LONG. ENTRENUDOS DEL RAMO MIXTO | <i>medio</i> | 5 |
| 6 | PIGM. ANTOCIÁNICA DEL RAMO MIXTO | <i>presente</i> | 9 |
| 7 | INTENSIDAD PIGM. ANTOC. DEL RAMO | <i>fuerte</i> | 7 |
| 8 | DENSIDAD BOTONES EN RAMO MIXTO | <i>alta</i> | 7 |
| 9 | DISTRIBUCIÓN DE BOTONES EN RAMO | <i>de dos o más</i> | 2 |

FLOR

| Nº UPOV | CARÁCTER | EXPRESIÓN | NIVEL |
|---------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 10 | EPOCA COMIENZO DE FLORACIÓN | <i>tardía</i> | 7 |
| 11 | DURACIÓN DE LA FLORACIÓN | <i>larga-muy larga</i> | 3 |
| 12 | FORMA DE LA FLOR | <i>rosácea</i> | 2 |
| 13 | COLOR CÁLIZ (FLOR ABIERTA) | <i>naranja</i> | 2 |
| 14 | FORMA DE LOS PÉTALOS | <i>redondeados(<1,22)</i> | 2 |
| 15 | TAMAÑO DE LOS PÉTALOS | <i>medios</i> | 3 |
| 16 | COLOR DE PÉTALOS (PLENA FLORACIÓN) | <i>rosa muy pálido</i> | 9 |
| 17 | NÚMERO DE PÉTALOS | <i>cinco</i> | 1 |
| 18 | LONG. ESTABRES/ PÉTALOS | <i>más cortos</i> | 5 |
| 19 | NÚMERO DE PISTILOS | <i>siempre uno</i> | 1 |
| 20 | POSICIÓN ESTIGMA/ ANTERAS | <i>igual nivel</i> | 3 |
| 21 | POLEN EN LAS ANTERAS | <i>presente</i> | 9 |
| 22 | PILOSIDAD DEL OVARIO | <i>ausente</i> | 9 |



LIMBO

| Nº UPOV | CARÁCTER | EXPRESIÓN | NIVEL |
|---------|---------------------------|-------------------|-------|
| 24 | TAMAÑO | medio | 5 |
| 25 | RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA | media | 7 |
| 26 | PERFIL | plano | 1 |
| 27 | EXTREMIDAD | recurvado | 2 |
| 28 | ÁNGULO DE LA BASE | más o menos recto | 2 |
| 29 | ÁNGULO DEL EXTREMO APICAL | pequeño | 7 |
| 30 | PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA | ausente | 1 |

PECÍOLO

| Nº UPOV | CARÁCTER | EXPRESIÓN | NIVEL |
|---------|---------------------------|------------|-------|
| 31 | LONGITUD | medio | 5 |
| 32 | PRESENCIA DE NECTARINOS | presente | 9 |
| 33 | FORMA DE LOS NECTARINOS | reniformes | 1 |
| 34 | NÚMERO DE NECTARINOS | más de dos | 1 |
| 35 | LONGITUD DE LAS ESTÍPULAS | largas | 7 |

FRUTO

| Nº UPOV | CARÁCTER | EXPRESIÓN | NIVEL |
|---------|---------------------------------------|------------------|-------|
| 36 | TAMAÑO | medio | 5 |
| 37 | FORMA | redondeado | 3 |
| 38 | FORMA ZONA PISTILAR | en cubeta | 2 |
| 39 | SIMETRÍA | asimétrico | 1 |
| 40 | MARCADO SUTURA | medio | 7 |
| 41 | PROFOUNDIDAD CAVIDAD PEDUNCULAR | pequeña | 3 |
| 42 | ANCHURA CAVIDAD PEDUNCULAR | media | 3 |
| 43 | COLOR FONDO EPIDERMIS | amarillo claro | 5 |
| 44 | EXTENSIÓN PIG. ANTOCIÁNICA | fuerte | 7 |
| 45 | PUBESCENCIA | ausente | 9 |
| 47 | ESPESOR DE LA EPIDERMIS | gruesa | 5 |
| 48 | ADHERENCIA DE LA EPIDERMIS- CARNE | media | 5 |
| 49 | FIRMEZA DE LA CARNE | media | 7 |
| 50 | COLOR DE LA CARNE | amarillo-naranja | 2 |
| 51 | PIG. ANTOC. SUBEPIDERMIS | ausente | 1 |
| 52 | PIG. ANTOC. EN LA CARNE DEL FRUTO | ausente | 1 |
| 53 | PIG. ANTOC. ALREDEDOR DEL HUESO | presente | 9 |
| 54 | TEXTURA DE LA CARNE | no fibrosa | 1 |
| 55 | CONTENIDO DE AZÚCAR EN LA CARNE | medio | 5 |
| 56 | TAMAÑO HUESO EN RELACIÓN CON EL FRUTO | grande | 7 |
| 57 | FORMA FRONTAL DEL HUESO | alargado | 4 |
| 58 | COLOR DEL HUESO | oscuro | 2 |
| 59 | PORCENTAJE HUESOS ABIERTOS | muy bajo | 1 |
| 60 | ADHERENCIA DEL HUESO A LA CARNE | ausente | 1 |
| 62 | ÉPOCA DE MADURACIÓN | tardía | 7 |
| 63 | ESCALONAMIENTO EN LA MADURACIÓN | escalonada | 2 |
| 64 | TENDENCIA A LA CAÍDA DE FRUTOS | débil | 3 |
| 65 | ÉPOCA DE LA CAÍDA DE LAS HOJAS | media | 5 |

Fuente: Manual para la Identificación de Variedades de Melocotonero II. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1996.