




## ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID (6 de julio de 2026)

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado hoy dos nuevos focos de enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid: el primero en una granja de broilers en el municipio de Íscar (comarca de Olmedo), localizado muy próximo a los focos nº 2026/9, nº 2026/13 y nº 2026/16 detectados recientemente en el mismo municipio; y el segundo en una granja de gallinas de recría en el municipio de Megeces (comarca de Olmedo), localizado aproximadamente a 9 km de los focos de Íscar mencionados anteriormente.

El número total de focos de enfermedad de Newcastle notificados en la zona es de 13. Ver mapa.



Mapa: En rojo, localización de los nuevos focos de enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid.

En naranja, focos previamente confirmados.



La granja de broilers de Íscar, que no se encontraba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 38.000 broilers y la sospecha se comunicó el 3 de julio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 1.3 % del censo. La explotación pertenece a la misma integradora que los focos nº 2026/ 7, 8 y 16.

La granja de gallinas de recría de Megeces estaba vacunada frente a la enfermedad con una dosis, tiene un censo aproximado de 181.000 pollitas y la sospecha se comunicó el 3 de julio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 0.97 % del censo. La explotación pertenece a la misma integradora que la granja foco nº 2026/12.

En ambos casos, las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla y León se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Los SVO han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea:

- Inmovilización inmediata de las granjas afectadas desde la fecha de sospecha.
- Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.
- Se está procediendo a realizar el vacío sanitario de las granjas confirmadas y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.
- Establecimiento de una zona de restricción alrededor de los focos. En los radios de 3 km y 10 km hay 31 y 20 explotaciones comerciales con censo, de las que todas ya pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.

La secuenciación parcial del virus realizada por el LCV de Algete muestra que el virus circulante en la provincia de Valladolid pertenece al genotipo VII.2, tratándose de un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corroboraría el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes.

Desde el MAPA se recomienda reforzar la vigilancia pasiva, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas,



especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular la aplicación de adecuados programas de vacunación frente a la enfermedad. Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.

Información adicional relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace: [https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/newcastle/Enf\\_newcastle.aspx](https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/newcastle/Enf_newcastle.aspx)

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres, incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas, se recomienda consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la enfermedad de Newcastle: [https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre\\_tcm30-511596.PDF](https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF)