




ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

(7 de octubre de 2026)

Las autoridades veterinarias de la Comunidad Valenciana han notificado hoy un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una granja de broilers en la comarca de Utiel (provincia de Valencia), localizada a una distancia aproximada de 3 km del foco 2026/38 declarado el viernes pasado. Ver mapa.



Mapa: Localización de los 4 focos de enfermedad de Newcastle detectados en la comarca de Utiel, en la provincia de Valencia.

La granja de broilers tiene un censo de 6.072 animales de 8 semanas de edad, presentando una tasa de mortalidad de un 5,48% de las aves. Las aves se encontraban vacunadas frente al virus de la enfermedad de Newcastle con una sola dosis *in ovo*, según la información recibida, y podrían por tanto no estar convenientemente protegidas al no haber seguido el protocolo de vacunación recomendado.



Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Los SVO han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea:

- Inmovilización inmediata de la granja afectada desde la fecha de sospecha.
- Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.
- Se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.
- Establecimiento de una zona de restricción alrededor del foco. En los radios de 3 km y 10 km de los 4 focos comunicados se localiza un total de 32 y 14 granjas comerciales.

Desde el MAPA se recomienda reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas. Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.

Información adicional relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/newcastle/Enf_newcastle.aspx

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres, incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas, se recomienda consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la enfermedad de Newcastle: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF