




ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CASTILLA Y LEÓN (22 de julio de 2026)

Desde la última nota de actualización de situación de la enfermedad de Newcastle el 13 de julio, las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado seis nuevos focos de enfermedad de Newcastle, todos ellos en granjas de broilers: tres de ellos en la comarca de Cuéllar (provincia de Segovia), uno en la comarca de Medina del Campo (provincia de Valladolid), uno en la comarca de San Pedro del Arroyo (provincia de Ávila) y uno en la comarca de Peñaranda de Bracamonte (provincia de Salamanca).

El número total de focos de enfermedad de Newcastle notificados en la zona es de 23. Ver mapa.



Mapa: En rojo, localización de los seis nuevos focos de enfermedad de Newcastle.

En naranja, focos previamente confirmados.



El detalle de los seis nuevos focos se resume en la siguiente tabla:

Nº foco	Provincia	Municipio	Fecha notificación	Censo	Tipo producción	Vacunación	Observaciones
2026/24	SEGOVIA	Remondo	15/07/2026	42.400	Broilers	No	Próximo a focos nº 2026/9, 13, 16, 18 y 20. Comparte integradora con focos 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22 y 24
2026/25	SEGOVIA	Gomezserracín	16/07/2026	41.991	Broilers	Parcial	
2026/26	SEGOVIA	Cuéllar	17/07/2026	23.800	Broilers	No	Comparte integradora con focos nº 2026/15, 17, 21, 23, 26 y 29
2026/27	VALLADOLID	San Vicente del Palacio	17/07/2026	70.000	Broilers	No	Muy próximo al foco nº 2026/14. Comparte integradora con focos 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22 y 24
2026/28	ÁVILA	Narros del Castillo	21/07/2026	23.000	Broilers	No	Comparte integradora con focos nº 2026/15, 17, 21, 23, 26 y 29
2026/29	SALAMANCA	Rágama	21/07/2026	29.000	Broilers	No	Comparte integradora con focos nº 2026/15, 17, 21, 23, 26 y 28

En todos los casos, las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla y León se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Los SVO han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea:

- Inmovilización inmediata de las granjas afectadas desde la fecha de sospecha.
- Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.
- Se está procediendo a realizar el vacío sanitario de las granjas confirmadas y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.



- Establecimiento de una zona de restricción alrededor de los focos. En los radios de 3 km y 10 km hay 10 y 46 explotaciones comerciales con censo, de las que 16 ya pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.

Se ha establecido también, mediante una Resolución del Director General de Producción Agrícola y Ganadera, la obligatoriedad de la vacunación en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo, debiendo aplicarse, como mínimo, dos dosis en la pauta vacunal y debiendo garantizarse un nivel adecuado de inmunización mediante las pautas vacunales autorizadas, en todas las manadas incluidas en los municipios de las zonas de restricción de los focos activos. Esta obligatoriedad, ya vigente en las zonas afectadas, se extenderá a las granjas avícolas de toda la comunidad autónoma de Castilla y León a partir del **1 de septiembre de 2026**.

La secuenciación parcial del virus realizada por el LCV de Algete muestra que el virus circulante en la provincia de Valladolid pertenece al genotipo VII.2, tratándose de un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corroboraría el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes.

Desde el MAPA se recomienda reforzar la vigilancia pasiva, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad entre explotaciones a través de vehículos y/o personal, sin olvidar las medidas para evitar el contacto con aves silvestres, e incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular la aplicación de adecuados programas de vacunación frente a la enfermedad. Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.

Información adicional relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/newcastle/Enf_newcastle.aspx

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres, incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas, se recomienda consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la enfermedad de Newcastle:



https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF