




ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VALENCIA (2 de octubre de 2026)

Las autoridades veterinarias de la Comunidad Valenciana han notificado hoy tres focos de enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas reproductoras pesadas y 2 granjas de broilers en la comarca de Utiel (provincia de Valencia), localizadas entre ellas a algo más de 10 km. No se había detectado circulación de enfermedad de Newcastle en la provincia de Valencia desde el pasado 8 de mayo de 2026, cuando se notificó el último foco en la comarca de Vall D'Albaida, a más de 60 km de distancia de los focos actuales.



Mapa: Localización de los 3 focos de enfermedad de Newcastle detectados en la comarca de Utiel, en la provincia de Valencia.

La granja de reproductoras pesadas tiene un censo de 30.776 gallinas de 56 semanas de edad y la sospecha de la enfermedad vino derivada de la comunicación el pasado 27 de septiembre de una bajada de puesta generalizada, así como síntomas respiratorios y digestivos y neurológicos en un 2% de las aves. Las reproductoras se encontraban



vacunadas (cuatro dosis) frente a la enfermedad de Newcastle, según la información recibida.

Las dos granjas de broilers tienen censos de 50.790 y 35.517 animales de 5 semanas de edad, presentando en ambos casos una tasa de mortalidad de un 1-1,5% de las aves, reportada los días 27 y 28 de septiembre. Las aves se encontraban vacunadas (dos dosis) frente a la enfermedad de Newcastle, según la información recibida.

Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Los SVO han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea:

- Inmovilización inmediata de las granjas afectadas desde la fecha de sospecha.
- Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.
- Se está procediendo a realizar el vacío sanitario de las granjas confirmadas (en las granjas de broilers se iniciaron las labores de sacrificio de forma preventiva antes de tener los resultados de patogenicidad) y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada. Además, se está procediendo a la destrucción de los huevos embrionados localizados en la incubadora relacionada con la granja de reproductoras pesadas, así como la investigación en las granjas de broilers que hubieran recibido pollitos de 1 día desde esta incubadora.
- Establecimiento de una zona de restricción alrededor de los focos. En los radios de 3 km y 10 km hay un total de 27 y 40 granjas comerciales.

Desde el MAPA se recomienda reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas. Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como



reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.

Información adicional relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace:https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/newcastle/Enf_newcastle.aspx

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres, incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas, se recomienda consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la enfermedad de Newcastle:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF