INFORME COPAC

2026

12 DE AGOSTO DE 2026 Nº32



Comisión Permanente para Adversidades Climáticas o Medioambientales (COPAC)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pº de la Infanta Isabel, 1 - 28071 Madrid – Tel: 91 347 54 01 – sgapc@mapa.es

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Título:
Informe COPAC

Edita:
© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones

Unidad proponente:
Subsecretaria de Agricultura. Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

NIPO: 003-24-002-3

Tienda online:
www.mapa.gob.es
https://servicio.mapa.gob.es/tienda/

e-mail:
centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
https://cpage.mpr.gob.es/

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

Seguimiento COPAC 2026 – Impacto en el sector agrario

Índice

04 Resumen Ejecutivo

05 Situación Meteorológica

09 Hidrología

13 Tendencia de Rendimientos de Cultivos

18 Información Adicional

1. RESUMEN EJECUTIVO

- **Año hidrológico 2025/2026.** El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 de octubre de 2025 al 11 de agosto de 2026) ha sido de 619,7 mm, un 7,2 % superior al valor normal. La precipitación media nacional normal para ese período es de 578,2 mm. Hace una semana fue un 7,3 % superior. Hace un año fue superior en un 11,7 % y hace dos años superior en un 3,7 %.

- **Las reservas disminuyen** con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 67,5 % de su capacidad (26.195 hm3), valor inferior a la semana anterior (69,1 %), valor superior al año pasado (58 %), superior a la media de los últimos 5 años (43 %) y superior a la media de los últimos 10 años (46 %). La reserva del Segura es superior en 23,8 puntos porcentuales respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 54,2 %, las del Guadiana se sitúan en un 75,7 %, en el Guadalquivir están al 75,8 % y en las cuencas Internas de Cataluña están al 81,1 %.

- Con datos a fecha de junio de 2026, en el Apartado 4: **ESYRCE** Tendencias de Rendimientos, se proporcionan las estimaciones de rendimiento disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España.

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA

2.1. PRECIPITACIONES Año hidrológico 2025/2026

Año hidrológico 2025/2026. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 de octubre de 2025 al 11 de agosto de 2026) ha sido de 619,7 mm, un 7,2 % superior al valor normal. La precipitación media nacional normal para ese período es de 578,2 mm. Hace una semana fue un 7,3 % superior. Hace un año fue superior en un 11,7 % y hace dos años superior en un 3,7 %.

Cierre año hidrológico 2024/2025. Con datos de la AEMET, el valor medio de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico 2024/2025 se situó en 683,7 mm en la Península, un 6,8 % superior al valor normal en el periodo de referencia 1991-2020, que son 640,1 mm.

Mapa. Semana actual



Mapa. Semana anterior



Mapa. Hace un año



Mapa: Hace 2 años



INDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI en sus siglas en inglés)

El SPI (Standardized Precipitation Index), es un índice que permite cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y, en base a ello, poder evaluar el impacto del déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos hídricos. La clasificación de los periodos de sequía en distintas categorías o intensidades fue señalada por McKee en 1993 y posteriormente refinada por Agnew* en el año 2000. La clasificación es de gran utilidad para determinar los espacios que están sufriendo más sequía y clasificar la intensidad de esta en diferentes grados. Por ejemplo, un valor de SPI, para un periodo determinado, de -2,3 indicaría que la cantidad de precipitación que se registrada en ese período se ha situado a 2,3 veces la desviación estándar por debajo del valor medio.

SPI	CATEGORÍA
≥ 1.65	Extremadamente húmedo
1.28 a 1.64	Severamente húmedo
0.84 a 1.27	Moderadamente húmedo
-0.83 a 0.83	Normal
-1.27 a -0.84	Moderadamente seco
-1.64 a -1.28	Severamente seco
≤ -1.65	Extremadamente seco

La teoría de Agnew refinó los valores de umbrales de sequía en 2020.



SPI en julio de 2026

	11 meses (acumulado año agrícola)		11 meses (acumulado año agrícola)
A CORUÑA	0.26	JAEN	0.62
ALBACETE	-0.39	LA RIOJA	0.10
ALICANTE	0.20	LAS PALMAS	1.34
ALMERIA	-0.35	LEON	-0.26
ARABA/ALAVA	-1.02	LLEIDA	-0.06
ASTURIAS	-1.55	LUGO	-0.20
AVILA	0.45	MADRID	-0.03
BADAJOZ	0.36	MALAGA	0.31
BALEARES	0.08	MELILLA	0.27
BARCELONA	0.31	MURCIA	0.40
BIZKAIA	-0.47	NAVARRA	-1.06
BURGOS	-0.88	OURENSE	0.30
CACERES	0.74	PALENCIA	-0.28
CADIZ	0.81	PONTEVEDRA	0.87
CANTABRIA	-0.95	SALAMANCA	0.62
CASTELLON	0.34	SANTA CRUZ	1.08
CEUTA	2.04	SEGOVIA	-0.17
CIUDAD REAL	0.42	SEVILLA	0.65
CORDOBA	0.68	SORIA	-0.21
CUENCA	-0.70	TARRAGONA	0.74
GIPUZKOA	-0.93	TERUEL	-0.69
GIRONA	0.72	TOLEDO	-0.66
GRANADA	0.52	VALENCIA	0.28
GUADALAJARA	-0.61	VALLADOLID	-0.17
HUELVA	0.37	ZAMORA	0.50
HUESCA	-0.99	ZARAGOZA	-0.46

NOTA: Los datos numéricos de SPI figuran en el ANEXO 1 del informe COPAC.





2.2. Evolución mensual de las precipitaciones Años hidrológicos 2022/2023 a 2025/26.

AÑO HIDROLÓGICO									
	VALOR NORMAL DE REFERENCIA (1991-2020)	2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
	Precipitación normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	%respecto al valor normal mensual
Año hidrológico	**640,1 mm**	**561 mm**	**-12%**	**671 mm**	**5%**	**684 mm**	**7%**	**620 mm**	
Octubre	77,8 mm	52 mm	-33%	105 mm	35%	147 mm	89%	48 mm	-38%
Noviembre	78,1 mm	64 mm	-20%	71 mm	-9%	38 mm	-52%	93 mm	19%
Diciembre	73,3 mm	118 mm	43%	33 mm	-54%	24 mm	-67%	80 mm	9%
Enero	64,5 mm	60 mm	-7%	68 mm	5%	88 mm	36%	119 mm	85%
Febrero	51,5 mm	17 mm	-67%	70 mm	35%	34 mm	-34%	124 mm	141%
Marzo	59,4 mm	21 mm	-64%	120 mm	102%	149 mm	151%	49 mm	-18%
Abril	63,5 mm	14 mm	-78%	32 mm	-50%	71 mm	11%	37 mm	-42%
Mayo	56,8 mm	60 mm	6%	38 mm	-34%	51 mm	-10%	48 mm	-15%
Junio	32,0 mm	67 mm	110%	48 mm	49%	22 mm	-32%	12 mm	-61%
Julio*	16,8 mm	10 mm	-41%	10 mm	-39%	21 mm	24%	4 mm	-76%
Agosto**	21,7 mm	10 mm	-53%	24 mm	12%	14 mm	-34%	5 mm	-76%
Septiembre	44,7 mm	67 mm	51%	52 mm	16%	25 mm	-42%		

* Dato provisional cierre julio

** Dato a 11 de agosto

NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17)



** Dato provisional a 11 de agosto de 2026*

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.3. Distribución territorial (principales observatorios de AEMET).

Figura 5. ***Precipitaciones del 1 de octubre de 2025 al 11 de agosto de 2026***

ESTACIÓN (AEMET)	Período del 01/10/2025-11/08/26			
	Precipitación Acumulada desde 01/10/2025	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) (mm)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020)(%)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) de la semana anterior (%)
TOTAL GALICIA	1.307,1	139,7	12,0%	12,8%
TOTAL ASTURIAS	771,0	-150,2	-16,3%	-16,1%
TOTAL CANTABRIA	937,5	-39,2	-4,0%	-3,0%
TOTAL PAIS VASCO	1.141,5	-3,4	-0,3%	-0,6%
TOTAL CASTILLA Y LEON	471,0	46,9	11,0%	12,0%
TOTAL LA RIOJA	434,5	45,8	11,8%	12,4%
TOTAL NAVARRA	607,9	-25,8	-4,1%	-5,1%
TOTAL ARAGÓN	314,6	-23,9	-7,1%	-8,3%
TOTAL CATALUÑA	482,8	51,5	11,9%	12,6%
TOTAL MADRID	563,4	44,0	8,5%	9,0%
TOTAL CASTILLA LA MANCHA	368,0	9,2	2,6%	2,5%
TOTAL EXTREMADURA	592,2	147,8	33,2%	33,5%
TOTAL VALENCIA	402,2	99,8	33,0%	33,6%
TOTAL BALEARES	473,5	86,4	22,3%	23,2%
TOTAL ANDALUCÍA	577,8	137,8	31,3%	31,4%
TOTAL MURCIA	328,3	83,6	34,2%	34,9%
TOTAL CANARIAS	292,3	87,9	43,0%	43,2%
CEUTA	1.243,0	536,7	76,0%	76,0%
MELILLA	359,6	11,9	3,4%	3,6%
Media Nacional	619,7	41,5	7,2%	7,3%

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.4. Julio



Julio tuvo carácter extremadamente seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 4,3 mm, lo que supone el 26 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020). Julio de 2026 registró en la España peninsular una temperatura media de 25,7 °C; sobrepasando en 2,6 °C la temperatura media de un mes de julio promediada en el periodo de referencia (1990-2020). En cuanto a temperaturas, tuvo un carácter extremadamente cálido.

2.5. Predicción estacional de la AEMET.

La predicción de anomalías en el trimestre **agosto-septiembre-octubre** en la península y ambos archipiélagos es la siguiente:

- **Temperatura:** hay una probabilidad muy alta de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España.

- **Precipitación:** hay una probabilidad alta de que la precipitación se encuentre en el tercil húmedo (debido a episodios convectivos puntuales sobre todo en agosto y septiembre) en toda España excepto en el noroeste peninsular y Canarias donde la probabilidad de los terciles es la climatológica.

3. HIDROLOGÍA

3.1. RESERVAS USO CONSUNTIVO. AÑO HIDROLOGICO 2025/2026. Datos de la semana del 3 al 10 de agosto de 2026.

- **Las reservas disminuyen** con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 67,5 % de su capacidad (26.195 hm3), valor inferior a la semana anterior (69,1 %), valor superior al año pasado (58 %), superior a la media de los últimos 5 años (43 %) y superior a la media de los últimos 10 años (46 %). La reserva del Segura es superior en 23,8 puntos porcentuales respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 54,2 %, las del Guadiana se sitúan en un 75,7 %, en el Guadalquivir están al 75,8 % y en las cuencas Internas de Cataluña están al 81,1 %.

TRASVASE TAJO SEGURA

- Los embalses de la cabecera del Tajo**, Entrepeñas y Buendía:** capacidad conjunta de 1.393 hm^3. Autorizados 60 hm^3 para agosto.

Fuente: Dirección General del Agua MITERD

Evolución reservas de uso consuntivo (Año hidrológico 2025-2026):



% Capacidad de reservas de uso consuntivo por cuencas

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	51	69,9	75,3	77,8	78,3
Cantábrico Occidental	35	76,1	80,4	85,2	84,1
Miño - Sil	286	79,0	91,7	75,7	72,8
Galicia Costa	57	72,2	79,7	82,3	81,9
Cuencas Internas del País Vasco	17	81,0	85,7	81,9	79,5
Duero	1.662	57,1	63,2	56,7	58,3
Tajo	3.348	57,8	63,1	46,9	44,4
Guadiana	7.223	75,7	62,1	38,0	43,7
Tinto, Odiel y Piedras	172	75,1	78,6	73,0	73,9
Guadalete-Barbate	1.322	80,1	46,6	30,5	41,5
Guadalquivir	6.044	75,8	48,8	32,2	39,4
Vertiente Atlántica	20.217	70,5	58,5	40,7	44,9
Cuenca Mediterránea Andaluza	818	69,7	50,9	39,2	44,4
Segura	615	54,2	27,1	32,2	30,4
Júcar	1.510	56,0	53,3	51,4	42,7
Ebro	2.486	55,9	65,4	54,8	58,6
Cuencas Internas de Cataluña	549	81,1	75,9	51,7	64,3
Vertiente Mediterránea	5.978	59,0	56,9	49,3	49,4
TOTAL PENINSULAR	26.195	67,5	58,0	43,0	46,0

AGUA EMBALSADA: 67,5 %

% Capacidad de reservas (uso consuntivo) por cuencas con respecto a la media de los últimos 10 años



3.2. INDICADORES DE ESTADO DE SEQUÍA

El BOE de 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los Planes Especiales de Sequía. En este apartado se analiza la situación, indicadores y escenarios respecto a sequía y escasez con los nuevos planes de sequía de las demarcaciones intercomunitarias y las unidades territoriales en ellos establecidas.

A finales de junio de 2026, la situación de los **indicadores de sequía prolongada** es la que se muestra en el Mapa.



A continuación, se representan, por su posible incidencia en el sector agrario, **los mapas de escasez coyuntural de los meses de mayo y junio.**

A fecha 30 de junio de 2026



A fecha 31 de mayo de 2026



Situación de los indicadores de Escasez Coyuntural por cuencas a finales de junio de 2026.

El año hidrológico está siendo pluviométricamente favorable, gracias en gran medida a las precipitaciones muy abundantes de los primeros meses del año. Ello ha supuesto que la mayor parte de las cuencas se encuentren en una situación generalizada de normalidad, aunque el carácter seco de los tres últimos meses se traduce en un leve empeoramiento respecto a la situación del mes anterior.

Al final del mes de junio, las demarcaciones de Cantábrico Oriental (en el ámbito competencial estatal), Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate, Segura, Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya y Ceuta tienen todas sus UTE en escenario de Normalidad. Las demarcaciones de Miño-Sil, Galicia Costa, Cantábrico Occidental, Duero, Tajo, Ebro, Tinto-Odiel-Piedras y Melilla tienen todas sus UTE en Normalidad o Prealerta.

Solo hay tres UTE en la Península que se encuentran en escenario de Alerta: Oka, en el Cantábrico Oriental (ámbito de competencias del País Vasco); Marina Baja, en la demarcación del Júcar; y Guardal, en el Guadalquivir. Por su parte, la UTE de Mancha Occidental, en el alto Guadiana, es la única que se mantiene en escenario de Emergencia. Esto supone que el 0,2% de la superficie está en escenario de Alerta y el 1,6% en Emergencia.

HUMEDAD DEL SUELO

La semana anterior

Hace 1 año

4. TENDENCIAS DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS. JUNIO 2026

Se presenta, a 30 de junio de 2026, una estimación del rendimiento medio para cada cultivo en Kg/ha, en secano y regadío, tomando como base los aforos disponibles realizados en el marco de los trabajos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) para la campaña 2026. El periodo de aforo va desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.

CEREALES:

Cereales de secano: para todos los cultivos presentan rendimientos inferiores a los registrados en la campaña 2025, si bien en algunos casos los valores obtenidos se mantienen próximos a sus medias históricas recientes.
Por cultivos, la cebada de 2 carreras presenta un rendimiento medio estimado de 2.594 kg/ha, con una disminución del 25% respecto al rendimiento medio registrado en la campaña 2025. Este valor se sitúa muy próximo a la media de los últimos cinco años y ligeramente por debajo de la media de los últimos diez año. Los mayores descensos respecto a la campaña anterior se observan en la avena, la cebada de 6 carreras y el centeno, cuyos rendimientos medios alcanzan 1.609, 2.028 y 1.916 kg/ha, respectivamente, situándose entre un 26% y un 29% por debajo de los valores registrados en 2025. Por su parte, el trigo blando y semiduro registra un rendimiento medio estimado de 2.920 kg/ha, un 26% inferior al de la campaña precedente, aunque próximo a la media de los últimos cinco años. El trigo duro alcanza 2.481 kg/ha, mostrando un descenso más moderado, del 18% respecto a 2025, y situándose por encima de sus medias históricas de referencia. Finalmente, el triticale presenta un rendimiento medio de 2.096 kg/ha, un 19% inferior al registrado en la campaña anterior.

Gráfico: Serie histórica rendimientos cereales de secano (Kg/ha).



Cereales de regadío. En términos generales, los cultivos analizados presentan rendimientos inferiores a los registrados en la campaña 2025, aunque con descensos más moderados que los observados en cereales de secano y manteniendo, en varios casos, valores próximos o superiores a sus medias históricas recientes. La cebada de 2 carreras concentra el mayor número de aforos realizados, con un 43% del total, y presenta un rendimiento medio estimado de 5.386 kg/ha, lo que supone un descenso del 5% respecto al rendimiento medio registrado en 2025. No obstante, este valor se sitúa por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. El trigo blando y semiduro alcanza un rendimiento medio estimado de 5.458 kg/ha, un 9% inferior al registrado en la campaña anterior, manteniéndose en valores prácticamente similares a sus medias históricas de

referencia. Por su parte, el trigo duro presenta un rendimiento de 5.210 kg/ha, un 3% superior al de 2025, situándose por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. La cebada de 6 carreras alcanza un rendimiento medio estimado de 4.686 kg/ha, lo que supone un descenso del 3% respecto a la campaña anterior. No obstante, este valor se mantiene por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. Los mayores descensos respecto a la campaña anterior se observan en la avena y el centeno, con reducciones del 20% y 13%, respectivamente. Sus rendimientos medios estimados se sitúan en 2.961 kg/ha y 3.476 kg/ha, manteniéndose por debajo de sus medias históricas recientes. Finalmente, el triticale alcanza un rendimiento medio estimado de 4.533 kg/ha, con una disminución del 6% respecto a la campaña anterior.



- **LEGUMINOSAS DE GRANO:**

En el caso de leguminosas grano de secano, En términos generales, se observa un descenso de los rendimientos respecto a la campaña 2025 en todas las especies analizadas. Los guisantes secos concentran el mayor número de aforos realizados, con un 39% del total, y presentan un rendimiento medio estimado de 1.055 kg/ha, un 16% inferior al registrado en 2025. No obstante, este valor se sitúa por encima de la media de los últimos cinco años y próximo a la media de los últimos diez años. Los yeros alcanzan un rendimiento medio estimado 693 kg/ha, un 10% inferior al de la campaña precedente, aunque ligeramente superior a la media de los últimos cinco años y diez años. Las habas secas presentan un rendimiento medio de 933 kg/ha, un 6% inferior al registrado en 2025 y por debajo de sus medias históricas recientes. Por su parte, las lentejas alcanzan 722 kg/ha, mostrando un rendimiento prácticamente idéntico al de la campaña precedente y situándose por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. Los garbanzos registran un rendimiento medio estimado de 749 kg/ha, con una disminución del 15% respecto a 2025, situándose asimismo por debajo de sus medias históricas de referencia. En cuanto a la veza, presenta un rendimiento medio de 894 kg/ha, un 20% inferior al observado en la campaña anterior. Este cultivo no dispone de medias históricas de referencia al incorporarse a la investigación de rendimientos a partir de 2025.

En relación con las leguminosas grano de regadío, en conjunto, los rendimientos presentan valores superiores a los registrados en la campaña 2025. Los guisantes secos, , alcanzan un rendimiento medio estimado de 2.860 kg/ha, un 21% superior al registrado en la campaña precedente. Además, se sitúan por encima de la media de los últimos cinco años y de los últimos diez años, Por su parte, las habas secas presentan un rendimiento estimado de 2.794 kg/ha, un 21% superior al de 2025 y por encima de las medias de los últimos cinco y diez años.

- **HORTÍCOLAS:**

En el grupo de cultivos hortícolas de regadío, el ajo, que concentra el 58% de los aforos realizados, presenta un rendimiento medio estimado de 13.195 kg/ha, un 3% inferior al registrado en la campaña anterior, aunque se mantiene por encima de la media de los últimos cinco y diez años. Los guisantes verdes alcanzan un rendimiento medio de 5.439 kg/ha, ligeramente superior al registrado en 2025, aunque se sitúa ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años y por debajo de la media de los últimos diez años. Por su parte, las habas verdes presentan un rendimiento medio estimado de 3.354 kg/ha, un 10% inferior al registrado en la campaña anterior y muy por debajo de sus medias históricas de referencia. En cuanto al melón, con un rendimiento medio estimado de 35.477 kg/ha, registra un descenso del 9% respecto a 2025, situándose ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años y próximo a la media de los últimos diez años. Por otra parte, la sandía alcanza un rendimiento medio de 66.471 kg/ha, lo que supone un incremento del 12% respecto a la campaña anterior y valores superiores a las medias de los últimos cinco y diez años.

- **FRUTALES NO CÍTRICOS:**

En el grupo de frutales no cítricos en regadío, el albaricoquero alcanza un rendimiento medio estimado de 13.216 kg/ha, un 10% superior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El cerezo y guindo presentan un rendimiento medio de 7.209 kg/ha, un 6% superior al de la campaña anterior y por encima de las medias de los últimos cuatro y cinco años, manteniéndose en valores muy próximos a la media de los últimos diez años. El ciruelo alcanza un rendimiento de 16.027 kg/ha, similar al registrado en 2025, aunque inferior a las medias de los últimos cuatro y cinco años. En cuanto al melocotonero, el nectarino y el paraguayo, presentan descensos respecto a la campaña anterior, con rendimientos medios de 21.413, 21.280 y 23.187 kg/ha, respectivamente. Por el contrario, la platerina alcanza un rendimiento medio estimado de 26.031 kg/ha, un 71% superior al registrado en la campaña anterior. Por último, la platanera registra un rendimiento medio de 53.052 kg/ha, manteniéndose en niveles muy similares a los de la campaña 2025 y a sus medias históricas. .

- **CULTIVOS DE INVERNADERO:**

Dentro de los cultivos de invernadero, la fresa-fresón presenta un rendimiento medio estimado de 53.656 kg/ha, lo que representa un descenso del 13% respecto a 2025, aunque se mantiene en valores muy próximos a las medias de los últimos cuatro y cinco años. El melón alcanza un rendimiento estimado de 52.089 kg/ha, un 7% superior al de la campaña precedente y por encima de las medias históricas de referencia. El pimiento registra un rendimiento medio estimado de 80.505 kg/ha, un valor similar al registrado en 2025. Este rendimiento se encuentra ligeramente por debajo de las medias de los últimos cuatro y cinco años, aunque supera ligeramente la media de los últimos diez años. Finalmente, la platanera registra un rendimiento de 57.594 kg/ha, un 5% inferior al del año anterior y ligeramente por debajo de los valores medios de las series históricas consideradas.

- **TUBÉRCULOS:**

Dentro del grupo de los tubérculos, la patata de secano, presenta un rendimiento medio estimado de 34.651 kg/ha. Este valor supone un descenso del 9% respecto al registrado en la campaña 2025. Asimismo, el rendimiento estimado se sitúa un 20% por encima de la media de los últimos cinco años y un 30% por encima de la media de los últimos diez años.

- **CULTIVOS INDUSTRIALES:**

Debido al ciclo productivo de los cultivos industriales, en esta fase del informe el único cultivo con un número representativo de aforos es la colza. En secano, la colza, presenta un rendimiento medio estimado de 1.966 kg/ha, lo que supone un descenso del 25% respecto a la campaña anterior. No obstante, este valor se mantiene ligeramente por encima de la media de los últimos cinco y diez años.

5. INFORMACION ADICIONAL

5.1. SEGUROS AGRARIOS

Año 2026

Previsión de indemnizaciones (del 1 de enero al 31 de julio de 2026): 373,55 M€.
Fuente: AGROSEGURO (incluye la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones).

Superficie afectada (del 1 de enero al 31 de julio de 2026): 1.177.073 ha.
Fuente: AGROSEGURO

Cultivos más afectados: (del 1 de enero al 31 de julio de 2026): herbáceos, frutales, uva de vinificación, hortalizas, cítricos, fresón y frutos rojos y frutos secos.
Fuente: AGROSEGURO

5.2 SINIESTRALIDAD. EVENTOS SIGNIFICATIVOS 2026.

JULIO.

Durante el mes de julio predominaron las altas presiones y temperaturas superiores a los valores normales para la época en gran parte de la península. La persistencia de un ambiente cálido y seco favoreció la intensificación del estrés hídrico en numerosos cultivos de secano, especialmente en los cereales de ciclo tardío y el girasol, registrándose daños por sequía y asurado en amplias zonas de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña

A lo largo del mes también se produjeron diversos episodios tormentosos de carácter local acompañados de pedrisco y, de forma más puntual, de fuertes rachas de viento. Estos fenómenos afectaron principalmente a cultivos de uva de vino, hortalizas y cultivos herbáceos en zonas del valle del Ebro, la meseta norte, Castilla-La Mancha, La Rioja y Galicia. Asimismo, las elevadas temperaturas favorecieron la aparición de daños por podredumbre, golpe de calor y asurado en hortalizas de primavera-verano, principalmente tomate en Extremadura.

Fuente: *AGROSEGURO*

RESUMEN JRC

Boletín JRC MARS

European Commission

SEGUIMIENTO| SEQUÍA, CULTIVOS RENDIMIENTO.

ORGANISMO | ESCALA
JRC -EUROPA

FECHA DEL DOCUMENTO
Julio 2026

Informe Seguimiento de cultivos en Europa: Julio 2026

El Joint Research Center (JRC) ha publicado su "Informe de seguimiento de cultivos en Europa: JULIO 2026" en el que se analiza el panorama agrometeorológico de los países europeos con avances de seguimiento de cultivos y previsión de rendimientos. Esta edición incluye un análisis detallado de Turquía. El periodo que abarca este número del 1 de junio al 18 de julio de 2026. El informe completo se encuentra disponible en: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC146186

Se mantienen las perspectivas de una cosecha satisfactoria para los cultivos de invierno.



Las repetidas olas de calor acortaron la fase de llenado del grano de los cultivos de invierno y adelantaron la cosecha, que ya ha concluido en el sur y avanza en el resto del territorio. Las previsiones de rendimiento de la UE para los cultivos de invierno se han revisado a la baja entre un 1 % y un 4 %, lo que sitúa las perspectivas para el total de cereales un 1 % por debajo de la media de los últimos cinco años. En cuanto a los cultivos de verano, el calor excepcional y las escasas precipitaciones en Europa occidental y central agotaron la humedad del suelo, limitaron la acumulación de biomasa y afectaron a la floración. Se han reducido las previsiones de rendimiento para todos los cultivos de primavera y verano, sobre todo para el maíz en grano y el girasol (entre un 6 % y un 7 %). Se prevé que las condiciones de calor y sequía persistan en Europa occidental, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan nuevas reducciones del rendimiento.

El estrés térmico afectó negativamente a los cultivos de invierno y de verano en toda Europa occidental. En algunas zonas de Europa occidental y central, los déficits hídricos persistentes agravaron el estrés térmico, causando daños generalizados en los cultivos.



Las repetidas olas de calor registradas durante los últimos 10 días de junio y, de nuevo, a mediados de julio, provocaron temperaturas récord en la mayor parte del oeste y el sur de Europa. Si bien los cultivos de invierno se encontraban, en general, ya en fases avanzadas de desarrollo o cerca de la cosecha, el calor prolongado afectó cada vez más a los cultivos de verano, especialmente en aquellas zonas donde el riego era limitado o la humedad del suelo ya se había agotado.



España: Los cultivos de invierno en Castilla y León, que ya se habían visto afectados por condiciones subóptimas a principios de la temporada, sufrieron una fase de llenado del grano más corta debido a las altas temperaturas. En el resto del país, las temperaturas muy elevadas solo han tenido un impacto limitado en los cultivos que aún se encuentran en el campo.

Norte y centro de Italia: El crecimiento del maíz ha sido inferior al óptimo tras el estrés térmico sufrido durante la floración, y es posible que las variedades de floración temprana hayan experimentado una reducción de la fertilidad. Se prevén los mayores efectos en los campos no regados.

Irlanda: A pesar de que las altas temperaturas registradas han acelerado la senescencia de los cultivos de invierno, no se observan motivos de preocupación importantes.

FUENTES:

- **Situación meteorológica:**
  - AEMET: https://www.aemet.es/es/portada

- **Hidrología:**
  - Boletín hidrológico (MITERD): https://sede.miteco.gob.es/BoleHWeb/
  - Informe situación de sequía y escasez (MITERD): https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento.html

- **Avances de superficies y producciones de cultivos:**
  - SGACE (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce-tendencias-mensuales-rendimientos-cultivos

- **Seguro Agrario:**
  - ENESA (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/enesa/
  - AGROSEGURO: https://agroseguro.es/

- **Boletín JRC MARS:** https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins

ANEXO 1. TABLA VALORES SPI.

SPI en julio de 2026			
	11 meses (acumulado año agrícola)	6 meses	12 meses
A CORUÑA	0.26	-0.94	0.20
ALBACETE	-0.39	-0.09	-0.42
ALICANTE	0.20	0.08	0.14
ALMERIA	-0.35	-0.89	-0.43
ARABA/ALAVA	-1.02	-0.14	-1.18
ASTURIAS	-1.55	-1.00	-1.73
AVILA	0.45	0.45	0.40
BADAJOZ	0.36	0.16	0.33
BALEARES	0.08	-0.96	0.00
BARCELONA	0.31	-0.77	0.19
BIZKAIA	-0.47	0.11	-0.53
BURGOS	-0.88	-0.39	-1.00
CACERES	0.74	0.49	0.72
CADIZ	0.81	0.53	0.80
CANTABRIA	-0.95	-0.26	-1.06
CASTELLON	0.34	-0.41	0.22
CEUTA	2.04	1.72	2.01
CIUDAD REAL	0.42	0.49	0.39
CORDOBA	0.68	0.44	0.65
CUENCA	-0.70	-0.33	-0.76
GIPUZKOA	-0.93	-0.48	-0.95
GIRONA	0.72	-0.31	0.69
GRANADA	0.52	0.25	0.49
GUADALAJARA	-0.61	-0.02	-0.68
HUELVA	0.37	-0.35	0.35
HUESCA	-0.99	-1.06	-0.81
JAEN	0.62	0.50	0.60
LA RIOJA	0.10	0.49	0.02
LAS PALMAS	1.34	1.66	1.34
LEON	-0.26	-0.22	-0.36
LLEIDA	-0.06	-1.12	0.18
LUGO	-0.20	-0.54	-0.26
MADRID	-0.03	0.12	-0.10
MALAGA	0.31	0.25	0.29
MELILLA	0.27	-0.22	0.25
MURCIA	0.40	-0.13	0.32
NAVARRA	-1.06	-0.57	-1.11
OURENSE	0.30	-0.28	0.24
PALENCIA	-0.28	-0.20	-0.43
PONTEVEDRA	0.87	-0.06	0.85
SALAMANCA	0.62	0.44	0.58
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.08	1.87	1.09
SEGOVIA	-0.17	-0.30	-0.25
SEVILLA	0.65	0.04	0.62
SORIA	-0.21	0.02	-0.28
TARRAGONA	0.74	-0.79	0.53
TERUEL	-0.69	-0.68	-0.78
TOLEDO	-0.66	-1.21	-0.70
VALENCIA	0.28	-0.54	0.24
VALLADOLID	-0.17	0.07	-0.28
ZAMORA	0.50	0.88	0.44
ZARAGOZA	-0.46	-0.09	-0.46