INFORME COPAC
2026
14 DE OCTUBRE DE 2026 Nº41



Comisión Permanente para Adversidades Climáticas o Medioambientales (COPAC)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

Pº de la Infanta Isabel, 1 - 28071 Madrid – Tel: 91 347 54 01 – sgapc@mapa.es

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Título:
Informe COPAC

Edita:
© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones

Unidad proponente:
Subsecretaria de Agricultura. Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

NIPO: 003-24-002-3

Tienda online:
www.mapa.gob.es
https://servicio.mapa.gob.es/tienda/

e-mail:
centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
https://cpage.mpr.gob.es/

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

Índice

05 Resumen Ejecutivo

06 Situación Meteorológica

10 Hidrología

14 Tendencia de Rendimientos de Cultivos

20 Información Adicional

1. RESUMEN EJECUTIVO

- **Inicio año hidrológico 2026/2027.** El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 al 13 de octubre de 2026) ha sido de 32,6 mm, un 10,5 % superior al valor normal. La precipitación media nacional normal para ese período es de 29,5 mm. Hace un año fue inferior en un 68,1 % y hace dos años superior en un 110,5 %.

- **Las reservas disminuyen** con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 59 % de su capacidad (22.879 hm3), valor inferior a la semana anterior (59,1 %), valor superior al año pasado (49,3 %), superior a la media de los últimos 5 años (35,7 %) y superior a la media de los últimos 10 años (37,8 %). La reserva del Segura es superior en 24,1 puntos porcentuales respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 48,9 %, las del Guadiana se sitúan en un 72 %, en el Guadalquivir están al 68,9 % y en las cuencas Internas de Cataluña están al 73,4 %.

- Con datos a fecha de agosto de 2026, en el Apartado 4: **ESYRCE** Tendencias de Rendimientos, se proporcionan las estimaciones de rendimiento disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España.

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA

2.1. PRECIPITACIONES Inicio Año hidrológico 2026/2027

Inicio Año hidrológico 2026/2027. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 al 13 de octubre de 2026) ha sido de 32,6 mm, un 10,5 % superior al valor normal. La precipitación media nacional normal para ese período es de 29,5 mm. Hace un año fue inferior en un 68,1 % y hace dos años superior en un 110,5 %.

Cierre provisional del año hidrológico 2025/2026. Con datos provisionales de la AEMET, el valor medio de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico 2025/2026 se situó en 652,4 mm en la Península, un 2,2 % superior al valor normal en el periodo de referencia 1991-2020, que son 638,1 mm.

Mapa. Semana actual



Mapa semana anterior



Mapa. Hace un año



Mapa: Hace 2 años



INDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI en sus siglas en inglés)

El SPI (Standardized Precipitation Index), es un índice que permite cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y, en base a ello, poder evaluar el impacto del déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos hídricos. La clasificación de los periodos de sequía en distintas categorías o intensidades fue señalada por McKee en 1993 y posteriormente refinada por Agnew* en el año 2000. La clasificación es de gran utilidad para determinar los espacios que están sufriendo más sequía y clasificar la intensidad de esta en diferentes grados. Por ejemplo, un valor de SPI, para un periodo determinado, de -2,3 indicaría que la cantidad de precipitación que se registrada en ese período se ha situado a 2,3 veces la desviación estándar por debajo del valor medio.

SPI	CATEGORÍA
≥ 1.65	Extremadamente húmedo
1.28 a 1.64	Severamente húmedo
0.84 a 1.27	Moderadamente húmedo
-0.83 a 0.83	Normal
-1.27 a -0.84	Moderadamente seco
-1.64 a -1.28	Severamente seco
≤ -1.65	Extremadamente seco

La teoría de Agnew refinó los valores de umbrales de sequía en 2020.



	SPI en septiembre de 2026		
	Acumulado año agrícola		Acumulado año agrícola
	1 mes		1 mes
A CORUÑA	-0.45	JAEN	-1.13
ALBACETE	-0.44	LA RIOJA	-1.46
ALICANTE	-0.33	LAS PALMAS	-0.52
ALMERIA	-0.50	LEON	-0.67
ARABA/ALAVA	-1.37	LLEIDA	-1.68
ASTURIAS	-0.70	LUGO	-0.67
AVILA	-1.36	MADRID	-1.48
BADAJOZ	-0.85	MALAGA	-0.40
BALEARES	-0.17	MELILLA	-1.34
BARCELONA	-0.06	MURCIA	-0.34
BIZKAIA	-1.03	NAVARRA	-1.36
BURGOS	-1.51	OURENSE	-0.76
CACERES	-0.90	PALENCIA	-0.82
CADIZ	-1.82	PONTEVEDRA	-0.59
CANTABRIA	-0.60	SALAMANCA	-0.98
CASTELLON	-0.82	STA CRUZ TENERIFE	-0.10
CEUTA	-0.47	SEGOVIA	-1.35
CIUDAD REAL	-1.21	SEVILLA	-1.19
CORDOBA	-1.94	SORIA	-1.25
CUENCA	-1.00	TARRAGONA	-1.35
GIPUZKOA	-1.24	TERUEL	-0.73
GIRONA	-0.29	TOLEDO	-1.48
GRANADA	-0.43	VALENCIA	0.06
GUADALAJARA	-1.63	VALLADOLID	-0.63
HUELVA	-0.92	ZAMORA	-0.57
HUESCA	-1.92	ZARAGOZA	-0.93

NOTA: Los datos numéricos de SPI figuran en el ANEXO 1 del informe COPAC.





2.2. Evolución mensual de las precipitaciones Años hidrológicos 2023/2024 a 2026/27.

AÑO HIDROLÓGICO									
	VALOR NORMAL DE REFERENCIA (1991-2020)	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027	
	Precipitación normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	%respecto al valor normal mensual	Precipitación	%respecto al valor normal mensual
Año hidrológico	**640,1 mm**	**671 mm**	**5%**	**684 mm**	**7%**	**647 mm**	**2%**	**33 mm**	
Octubre*	77,8 mm	105 mm	35%	147 mm	89%	48 mm	-38%	33 mm	-58%
Noviembre	78,1 mm	71 mm	-9%	38 mm	-52%	93 mm	19%		
Diciembre	73,3 mm	33 mm	-54%	24 mm	-67%	80 mm	9%		
Enero	64,5 mm	68 mm	5%	88 mm	36%	119 mm	85%		
Febrero	51,5 mm	70 mm	35%	34 mm	-34%	124 mm	141%		
Marzo	59,4 mm	120 mm	102%	149 mm	151%	49 mm	-18%		
Abril	63,5 mm	32 mm	-50%	71 mm	11%	37 mm	-42%		
Mayo	56,8 mm	38 mm	-34%	51 mm	-10%	48 mm	-15%		
Junio	32,0 mm	48 mm	49%	22 mm	-32%	12 mm	-61%		
Julio	16,8 mm	10 mm	-39%	21 mm	24%	4 mm	-74%		
Agosto	21,7 mm	24 mm	12%	14 mm	-34%	23 mm	6%		
Septiembre	44,7 mm	52 mm	16%	25 mm	-42%	9 mm	-80%		

* Dato provisional a 13 de octubre

NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17)



** Dato provisional a 13 de octubre de 2026*

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.3. Distribución territorial (principales observatorios de AEMET).

Figura 5. ***Precipitaciones acumuladas del 1 al 13 de octubre de 2026***

ESTACIÓN (AEMET)	Periodo del 01/10/2026-13/10/26			
	Precipitación Acumulada desde 01/10/2026	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) (mm)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020)(%)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) de la semana anterior (%)
TOTAL ASTURIAS	97,1	55,5	133,6%	194,2%
TOTAL CANTABRIA	53,3	9,1	20,6%	42,1%
TOTAL PAIS VASCO	39,3	-8,0	-16,8%	14,8%
TOTAL CASTILLA Y LEON	26,3	3,6	16,1%	161,4%
TOTAL LA RIOJA	35,8	21,4	148,6%	322,4%
TOTAL NAVARRA	73,8	49,2	200,0%	333,3%
TOTAL ARAGÓN	43,9	26,6	154,1%	436,9%
TOTAL CATALUÑA	137,6	107,6	358,1%	833,9%
TOTAL MADRID	48,3	18,3	61,2%	278,9%
TOTAL CASTILLA LA MANCHA	20,1	0,7	3,6%	124,3%
TOTAL EXTREMADURA	10,9	-15,2	-58,2%	-0,9%
TOTAL VALENCIA	33,7	13,0	62,6%	233,3%
TOTAL BALEARES	12,6	-15,0	-54,4%	-36,8%
TOTAL ANDALUCÍA	7,0	-15,7	-69,3%	-28,3%
TOTAL MURCIA	77,1	64,3	500,8%	943,2%
TOTAL CANARIAS	11,5	3,1	37,6%	139,1%
CEUTA	8,1	-18,3	-69,3%	-26,4%
MELILLA	7,6	-7,1	-48,3%	14,3%
Media Nacional	32,6	3,1	10,5%	123,3%

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.4. Agosto



El mes de agosto de 2026 ha tenido carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 22,9 mm, valor que representa el 6 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. El carácter de la temperatura en España de agosto de 2026 ha sido muy cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,4 °C, esto supone una anomalía de +1,4 °C respecto a la media del periodo de referencia 1991-2020.

2.5. Predicción estacional de la AEMET.

La predicción de anomalías en el trimestre **octubre-noviembre-diciembre** en la península y ambos archipiélagos es la siguiente:

- **Temperatura:** hay una probabilidad muy alta de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España. En el suroeste peninsular la probabilidad es algo menor. (Periodo de referencia 1991-2020)

- **Precipitación:** hay una probabilidad alta de que la precipitación se encuentre en el tercil húmedo en el noroeste y centro peninsulares y Extremadura (de manera más acusada al sur de Galicia, Castilla y León y provincia de Cáceres). En el resto de España la probabilidad de los terciles es la climatológica. (Periodo de referencia 1991-2020)

3. HIDROLOGÍA

3.1. RESERVAS USO CONSUNTIVO. AÑO HIDROLOGICO 2026/2027.

Datos de la semana del 6 al 13 de octubre de 2026.

- **Las reservas disminuyen** con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 59 % de su capacidad (22.879 hm3), valor inferior a la semana anterior (59,1 %), valor superior al año pasado (49,3 %), superior a la media de los últimos 5 años (35,7 %) y superior a la media de los últimos 10 años (37,8 %). La reserva del Segura es superior en 24,1 puntos porcentuales respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 48,9 %, las del Guadiana se sitúan en un 72 %, en el Guadalquivir están al 68,9 % y en las cuencas Internas de Cataluña están al 73,4 %.

TRASVASE TAJO SEGURA

- Los embalses de la cabecera del Tajo**, Entrepeñas y Buendía:** capacidad conjunta de 1.282 hm^3. Autorizados 27 hm^3 para septiembre.

Fuente: Dirección General del Agua MITERD

Evolución reservas de uso consuntivo (Inicio Año hidrológico 2026-2027):



% Capacidad de reservas de uso consuntivo por cuencas

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	40	54,8	68,5	73,7	71,9
Cantábrico Occidental	28	60,9	58,7	72,2	70,7
Miño - Sil	218	60,2	58,8	50,2	42,4
Galicia Costa	40	50,6	62,0	67,6	65,9
Cuencas Internas del País Vasco	15	71,4	76,2	75,2	71,0
Duero	1.172	40,3	43,9	38,2	39,1
Tajo	2.847	49,2	54,5	39,4	36,2
Guadiana	6.865	72,0	57,9	34,7	39,7
Tinto, Odiel y Piedras	140	61,1	63,8	63,7	64,9
Guadalete-Barbate	1.237	74,9	41,8	26,2	36,9
Guadalquivir	5.494	68,9	41,5	27,0	33,2
Vertiente Atlántica	18.096	63,1	50,4	34,1	37,4
Cuenca Mediterránea Andaluza	743	63,3	44,6	32,9	38,0
Segura	555	48,9	16,8	25,0	24,8
Júcar	1.357	50,3	47,4	46,2	37,5
Ebro	1.631	36,7	49,1	41,8	41,7
Cuencas Internas de Cataluña	497	73,4	74,0	46,1	56,4
Vertiente Mediterránea	4.783	47,2	46,2	40,3	39,0
TOTAL PENINSULAR	22.879	59,0	49,3	35,7	37,8

AGUA EMBALSADA: 59,0 %

% Capacidad de reservas (uso consuntivo) por cuencas con respecto a la media de los últimos 10 años



3.2. INDICADORES DE ESTADO DE SEQUÍA

El BOE de 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los Planes Especiales de Sequía. En este apartado se analiza la situación, indicadores y escenarios respecto a sequía y escasez con los nuevos planes de sequía de las demarcaciones intercomunitarias y las unidades territoriales en ellos establecidas.

A finales de agosto de 2026, la situación de los **indicadores de sequía prolongada** es la que se muestra en el Mapa.

A continuación, se representan, por su posible incidencia en el sector agrario, **los mapas de escasez coyuntural de los meses de julio y agosto.**

A fecha 31 de agosto de 2026

A fecha 31 de julio de 2026

Situación de los indicadores de Escasez Coyuntural por cuencas a finales de agosto de 2026.

La situación de los escenarios de Escasez Coyuntural en las demarcaciones intercomunitarias a finales de agosto de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa de agosto. Aunque agosto no es un mes en el que se previeran lluvias de importancia, se ha producido un ligero empeoramiento respecto a la escasez coyuntural. A grandes rasgos, la situación sigue siendo favorable, y en la mayor parte de las cuencas hay una situación casi generalizada de Normalidad o Prealerta. Al final del mes de agosto, las demarcaciones de Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencias de la AGE), Cantábrico Occidental, Tajo, Segura, Ceuta, Melilla, Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto Odiel y Piedras tienen todas sus UTE en escenario de Normalidad o Prealerta.

Las demarcaciones del Miño-Sil (Limia), Guadalquivir (Guardal) y Júcar (Marina Baja) tienen una única UTE en escenario de Alerta. Dos UTE en escenario de Alerta tienen las demarcaciones de Galicia Costa (Río Lérez-Ría de Pontevedra y Río Anllóns-Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo) y del Ebro (Gállego-Cinca y Aragón-Arba). En las Cuencas internas del País Vasco hay tres UTE en Alerta (Oka, Lea y Artibai). En todos estos casos, el resto de UTE permanece en Normalidad o Prealerta. En la demarcación del Guadiana se mantiene una única UTE en escenario de Emergencia (Mancha Occidental). El resto de UTE están en escenarios de Normalidad (16) o Prealerta (4). En la demarcación del Duero la UTE de Támega-Manzanas pasa a escenario de Emergencia, y tres UTE más (Tuerto, Torío-Bernesga y Carrión) lo hacen a escenario de Alerta. El resto se encuentra en escenario de Normalidad (11) o de Prealerta (3). A modo de resumen de la situación respecto a la escasez coyuntural, en el mes de agosto hay 2 UTE en escenario de Emergencia (en Duero y en Guadiana), y 13 UTE en Alerta (3 en País Vasco y Duero, 2 en Galicia Costa y Ebro, y una en Miño-Sil, Guadalquivir y Júcar).
Geográficamente, el 2% de la superficie del territorio se sitúa en UTE en escenario de Emergencia, y el 2% en escenario de Alerta.

HUMEDAD DEL SUELO

La semana anterior





Hace 1 año



4. TENDENCIAS DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS. AGOSTO 2026

Se presentan las estimaciones de rendimiento disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España hasta el mes de agosto de 2026, elaboradas por la SGACE con las informaciones extraídas a partir de ESYRCE. Estas estimaciones se actualizan progresivamente en función de la evolución de la campaña agrícola. El periodo de aforo va desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.

CEREALES:

Cereales de secano. Todos los cultivos analizados presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025, aunque algunos se mantienen próximos a sus medias históricas recientes.

Por cultivos, la cebada de 2 carreras presenta un rendimiento medio estimado de 2.605 kg/ha, un 25% inferior al de 2025. Este valor se sitúa un 1% por encima de la media de los últimos cinco años y un 4% por debajo de la media de los últimos diez años. Los mayores descensos respecto a la campaña anterior se observan en el centeno y la cebada de 6 carreras, con rendimientos medios de 1.873 y 2.096 kg/ha, respectivamente, un 30% y un 24% inferiores a los registrados en 2025. Mientras que el centeno se sitúa por debajo de sus referencias históricas, la cebada de 6 carreras se mantiene ligeramente por encima de la media quinquenal y próxima a la decenal. Por su parte, el trigo blando y semiduro alcanza un rendimiento medio estimado de 2.919 kg/ha, un 26% inferior al de la campaña precedente, situándose ligeramente por debajo de sus medias históricas. El trigo duro presenta el comportamiento más favorable, con 2.539 kg/ha, un 16% menos que en 2025, pero un 10% por encima de la media de los últimos cinco años y un 5% de la decenal. La avena alcanza un rendimiento medio estimado de 1.629 kg/ha, un 24% menos que en 2025. Este valor se sitúa un 2% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 7% por debajo de la media decenal, manteniéndose próximo a sus referencias históricas, aunque alejado de los resultados obtenidos en la campaña anterior. Por su parte el triticale presenta un rendimiento medio de 2.077 kg/ha, un 20% inferior al registrado en la campaña anterior. Al no disponerse de referencias históricas de cinco y diez años en la serie analizada, no es posible establecer una comparación con estos periodos

Gráfico: Serie histórica rendimientos cereales de secano (Kg/ha).



Cereales de regadío: En términos generales, los cultivos analizados presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025, aunque varios se mantienen próximos o por encima de sus medias históricas recientes. La cebada de dos carreras presenta un rendimiento medio estimado de 5.122 kg/ha, un 10% inferior al registrado en 2025. No obstante, este valor se sitúa un 4% por encima de la media de los últimos cinco años y un 3% por encima de la media decenal. La cebada de seis carreras presenta un rendimiento estimado de 4.965 kg/ha, un 3% superior al de 2025. Asimismo, se sitúa claramente por encima de sus medias históricas, alcanzando el 131% de la media quinquenal y el 140% de la decenal. Por su parte, el maíz presenta un rendimiento medio estimado de 12.849 kg/ha, un 2% inferior al obtenido en 2025, situándose un 4% por debajo de la media de los últimos cinco años y prácticamente en línea con la media decenal. El trigo duro alcanza un rendimiento de 4.810 kg/ha, un 5% inferior al de 2025, aunque se mantiene un 3% por encima de la media quinquenal y prácticamente en línea con la decenal. El trigo blando y semiduro registra un rendimiento medio estimado de 5.368 kg/ha, un 10% inferior al de 2025, situándose ligeramente por debajo de sus medias históricas. La avena alcanza 3.068 kg/ha, un 17% menos que en 2025 y también ligeramente por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años. El centeno presenta un rendimiento medio de 3.489 kg/ha, un 12% inferior al registrado en la campaña anterior y alrededor de un 10% por debajo de sus referencias históricas. Por su parte, el triticale alcanza 4.382 kg/ha, un 9% menos que en 2025. Finalmente, el arroz presenta un rendimiento medio estimado de 8.461 kg/ha, un 4% superior al registrado en 2025 y por encima de las medias de los últimos cinco y diez años





- **LEGUMINOSAS DE GRANO:**

En relación con las leguminosas grano de secano, se observa un descenso de los rendimientos respecto a la campaña 2025 en la mayoría de las especies analizadas, aunque las habas secas se mantienen por encima del valor registrado en la campaña anterior.

Los guisantes secos presentan un rendimiento medio estimado de 997 kg/ha, un 21% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 5% por encima de la media de los últimos cinco años y un 7% por debajo de la media de los últimos diez. Los yeros alcanzan un rendimiento medio estimado de 649 kg/ha, un 16% inferior al de la campaña precedente. No obstante, este valor se sitúa un 8% por encima de la media de los últimos cinco años y un 4% por debajo de la media de los últimos diez años. Las habas secas presentan un

rendimiento medio de 1.033 kg/ha, un 4% superior al registrado en 2025, aunque por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años.
Por su parte, las lentejas alcanzan 698 kg/ha, un 4% inferiores a las de la campaña precedente, no obstante, este valor se sitúa por encima de las medias de los últimos cinco y diez años, un 26% y un 11%, respectivamente. Los garbanzos registran un rendimiento medio estimado de 774 kg/ha, un 12% inferior al de 2025 y por debajo de sus medias históricas de referencia.
En cuanto a la veza, presenta un rendimiento medio estimado de 880 kg/ha, un 21% inferior al observado en la campaña anterior.

En relación con las leguminosas grano de regadío, se observan comportamientos diferenciados respecto a la campaña 2025. Los guisantes secos alcanzan un rendimiento medio estimado de 2.744 kg/ha, un 16% superior al registrado en la campaña precedente. Este valor se sitúa prácticamente en línea con la media de los últimos cinco años y un 5% por encima de la media de los últimos diez. Las habas secas presentan un rendimiento estimado de 1.921 kg/ha, un 17% inferior al de 2025, situándose ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años y prácticamente en línea con la media decenal. Por su parte, los garbanzos alcanzan un rendimiento medio de 1.103 kg/ha, un 19% superior al registrado en 2025, aunque por debajo de sus medias históricas de referencia. Los veros alcanzan un rendimiento medio de 1.008 kg/ha, un 24% inferior al registrado en 2025, situándose ligeramente por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años. Finalmente, la veza presenta un rendimiento medio estimado de 1.194 kg/ha, un 30% inferior al de la campaña anterior.

- **HORTÍCOLAS:**

Dentro del grupo de cultivos hortícolas de regadío, respecto a la campaña anterior, se registran incrementos de rendimiento en berenjena (+9%), cebolla (+2%), guisantes verdes (+7%), judías verdes (+13%), pepino (+58%), sandía (+20%) y zanahoria (+20%). De estos cultivos, berenjena (+11%), pepino (+13%) y sandía (+14%) presentan además un rendimiento superior a su media de los últimos cinco años, mientras que cebolla (+1%), guisantes verdes (-2%), las judías verdes (-15%) y zanahoria (-6%) se sitúan ligeramente por debajo de sus respectivas medias históricas. Por el contrario, ajo (-5%), calabacín (-2%), habas verdes (-39%), melón (-7%), pimiento (-14%) y tomate (-4%) presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025. Entre ellos, únicamente el ajo supera su media de los últimos cinco años (+3%), mientras que el resto se sitúan por debajo de sus valores medios, destacando especialmente las habas verdes (-63%), el pimiento (-14%) y el calabacín (-10%). En comparación con la media de los últimos diez años, los rendimientos se sitúan por encima de esta referencia en ajo, berenjena, pepino, sandía y tomate, mientras que el resto de los cultivos presentan valores inferiores, con los descensos más acusados en habas verdes (-65%), judías verdes (-28%) y pimiento (-17%).

- **FRUTALES NO CÍTRICOS:**

En el grupo de frutales no cítricos en secano, el cerezo y guindo presentan un rendimiento medio de 3.097 kg/ha, un 31% inferior al registrado en la campaña anterior. Asimismo, el rendimiento se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro y cinco años, con descensos del 13% y 14%, respectivamente, y un 17% inferior a la media de los últimos diez años.

En el grupo de frutales no cítricos en regadío, el aguacate alcanza un rendimiento medio estimado de 4.947 kg/ha, un 23% inferior al registrado en la campaña 2025 y por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El albaricoquero presenta un rendimiento medio de 13.127 kg/ha, un 9% superior al de la campaña anterior y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El cerezo y guindo alcanzan un

rendimiento medio de 7.868 kg/ha, un 16% superior al registrado en 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El ciruelo, con un rendimiento de 14.930 kg/ha, registra un descenso del 6% respecto a la campaña anterior. Por su parte, el manzano presenta un incremento del 12% respecto a 2025, situándose por encima de sus medias históricas de cuatro, cinco y diez años, mientras que el peral registra un descenso del 13%, situándose por debajo de estas referencias. En cuanto al melocotonero, nectarina y paraguaya, presentan descensos respecto a la campaña anterior, con rendimientos medios de 21.613, 22.908 y 25.052 kg/ha, respectivamente. Por el contrario, la platerina alcanza un rendimiento medio estimado de 26.168 kg/ha, un 72% superior al registrado en la campaña anterior.

Por último, la platanera registra un rendimiento medio de 53.052 kg/ha, manteniéndose en niveles muy similares a los de la campaña 2025 y ligeramente por encima de sus medias históricas. En resumen, los mayores incrementos respecto a 2025 en cuanto a los rendimientos corresponden a platerina (+72%), cerezo y guindo (+16%), manzano (+12%) y albaricoquero (+9%). Por el contrario, los descensos más acusados se observan en aguacate (-23%), peral (-13%), melocotonero (-14%), ciruelo (-6%), paraguaya (-6%), nectarina (-5%) y platanera (-1%). Respecto a las medias históricas disponibles, destacan los índices superiores a la media en albaricoquero, cerezo y guindo, manzano y platanera, mientras que aguacate, ciruelo y peral presentan índices inferiores a dichas referencias.

- **FRUTALES CÍTRICOS:**

Las primeras estimaciones de rendimiento para cítricos en regadío los resultados deben tener en cuenta el carácter preliminar de las estimaciones. Dentro del grupo de cítricos en regadío, el limonero presenta un rendimiento medio estimado de 28.513 kg/ha, un 40% superior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. En naranjo, el rendimiento estimado alcanza los 22.172 kg/ha, un 3% superior al de 2025. Este valor se sitúa ligeramente por debajo de la media de los últimos cuatro años y por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años. Por su parte, el mandarino clementina presenta un rendimiento estimado de 21.677 kg/ha, un 10% superior al de 2025, mientras que el mandarino satsuma alcanza los 26.054 kg/ha, un 22% más que en la campaña anterior. En otras mandarinas, el rendimiento estimado es de 13.592 kg/ha, un 29% inferior al registrado en 2025. En pomelo, el rendimiento alcanza los 40.519 kg/ha, un 19% superior al de la campaña anterior. En conjunto, los rendimientos estimados para 2026 representan entre el 71% y el 140% de los obtenidos en 2025, según el cultivo.

- **FRUTALES SECOS**

En el grupo de frutales secos en secano, el almendro presenta un rendimiento medio estimado de 431 kg/ha, un 15% inferior al registrado en la campaña 2025 y ligeramente por encima de la media de los últimos cuatro años, aunque por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años.

En el grupo de frutales secos en regadío, el almendro alcanza un rendimiento medio estimado de 1.974 kg/ha, un 2% inferior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. Por su parte, el avellano presenta un rendimiento medio estimado de 522 kg/ha, un 85% superior al registrado en la campaña 2025, aunque se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. Finalmente, el pistacho, con un rendimiento medio estimado de 970 kg/ha, registra un incremento del 14% respecto a la campaña anterior.

- **OLIVAR:**

Las estimaciones de rendimiento para olivar, deben tener en cuenta el carácter preliminar de dichas estimaciones. Para el olivar de secano, se estima un rendimiento medio de 2.432 kg/ha, un 13% superior al de 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. Este rendimiento supera en un 40% la media de los últimos cuatro años, en un 28% la de los últimos cinco años y en un 18% la correspondiente a los últimos diez años, situándose así en niveles claramente superiores a los registrados en las principales referencias de la serie histórica. En cuanto al olivar de regadío, el rendimiento estimado alcanza los 4.808 kg/ha, un 23% superior al de 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. En concreto, el rendimiento previsto supera en un 32% la media de los últimos cuatro años, en un 25% la de los últimos cinco años y en un 9% la correspondiente a los últimos diez años, situándose así en niveles superiores a los registrados en las principales referencias de la serie histórica.

- **VIÑEDO:**

Las primeras estimaciones de rendimiento para viñedo, tanto de secano como de regadío, los resultados deben tener en cuenta el carácter preliminar de las estimaciones. Para viñedo de secano, las primeras estimaciones apuntan a un rendimiento medio estimado de 5.745 kg/ha, un 22% superior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. Para el viñedo de regadío, se presenta un rendimiento medio estimado de 9.186 kg/ha, un 1% superior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro y cinco años, aunque ligeramente por debajo de la media de los últimos diez años

- **CULTIVOS DE INVERNADERO:**

Dentro del grupo de cultivos de invernadero, respecto a la campaña anterior, se registran incrementos de rendimiento en calabacín (+9%), melón (+4%) y sandía (+8%), mientras que berenjena (-5%), fresa-fresón (-4%), judías verdes (-28%), pepino (-6%), pimiento (-9%), tomate (-14%) y platanera (-5%) presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025. En comparación con las medias de los últimos cuatro y cinco años, berenjena, calabacín, fresa-fresón, melón y sandía se sitúan por encima de ambas referencias, mientras que pepino se mantiene ligeramente por debajo de ellas. El resto de los cultivos presentan rendimientos inferiores a ambas medias, destacando especialmente las judías verdes y el pimiento. Respecto a la media de los últimos diez años, berenjena, fresa-fresón, melón, pepino y sandía se sitúan por encima de esta referencia, mientras que calabacín, judías verdes, pimiento, tomate y platanera presentan rendimientos inferiores.

- **TUBÉRCULOS:**

Dentro del grupo de los tubérculos, la patata de secano, presenta un rendimiento medio estimado de 29.610 kg/ha. Este valor supone un descenso del 7% respecto al registrado en la campaña 2025. Asimismo, el rendimiento estimado se sitúa un 3% por encima de la media de los últimos cinco años y un 11% por encima de la media de los últimos diez años. En cuanto a la patata de regadío, presenta un rendimiento medio estimado de 41.312 kg/ha, un 1% inferior al registrado en la campaña 2025 y a las medias de los últimos cinco y diez años.

- **CULTIVOS INDUSTRIALES:**

En relación con los cultivos industriales de secano, la colza, presenta un rendimiento medio estimado de 1.945 kg/ha, lo que supone un descenso del 26% respecto a la campaña anterior. No obstante, este valor se sitúa ligeramente por encima de la media de los últimos cinco años y en niveles similares a la media de los últimos diez años. Por su parte, el girasol, alcanza un rendimiento medio estimado de 945 kg/ha, un 7% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa similar a la media de los últimos cinco años, aunque permanece por debajo de la media de los últimos diez años.

En cultivos industriales de regadío, la colza presenta un rendimiento medio estimado de 3.373 kg/ha, lo que supone un descenso del 15% respecto a la campaña anterior. Este valor se sitúa prácticamente en línea con la media de los últimos cinco años y ligeramente por debajo de la media de los últimos diez años. Por su parte, el girasol, presenta un rendimiento medio estimado de 2.954 kg/ha, un 3% inferior al registrado en la campaña anterior. No obstante, este valor se sitúa un 10% por encima de la media de los últimos cinco años, aunque ligeramente por debajo de la media de los últimos diez años. En cuanto al algodón, presenta un rendimiento medio estimado de 2.954 kg/ha, un 3% inferior al registrado en la campaña anterior. No obstante, este valor se sitúa un 10% por encima de la media de los últimos cinco años, aunque ligeramente por debajo de la media de los últimos diez años.

La remolacha azucarera, alcanza un rendimiento medio estimado de 93.119 kg/ha, prácticamente en el mismo nivel que el registrado en 2025. Este rendimiento se sitúa ligeramente por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años, un 2% y un 4%, respectivamente. Por último, el tomate de industria, presenta un rendimiento medio estimado de 92.758 kg/ha, lo que supone un incremento del 7% respecto a la campaña anterior. Este valor se sitúa en línea con la media de los últimos cinco años y un 4% por encima de la media de los últimos diez años

5. INFORMACION ADICIONAL

5.1. SEGUROS AGRARIOS

Año 2026

Previsión de indemnizaciones (del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026): 479,77 M€.
Fuente: AGROSEGURO (incluye la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones).

Superficie afectada (del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026): 1.466.702 ha.
Fuente: AGROSEGURO

Cultivos más afectados: (del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026): herbáceos, frutales, uva de vinificación, hortalizas, cítricos, caqui, fresón y frutos rojos y frutos secos.
Fuente: AGROSEGURO

5.2 SINIESTRALIDAD. EVENTOS SIGNIFICATIVOS 2026.

SEPTIEMBRE
La situación meteorológica estuvo marcada por la persistencia de temperaturas superiores a los valores habituales para la época en amplias zonas del interior peninsular, combinadas con puntuales episodios tormentosos de carácter localmente intenso en el área mediterránea y el cuadrante nordeste.

Como consecuencia, los siniestros se concentraron principalmente en cultivos leñosos del arco mediterráneo, destacando los daños por pedrisco en caqui y cítricos de la Comunidad Valenciana, así como en cítricos y uva de mesa, afectada también por lluvia, de la Región de Murcia. Paralelamente, la continuidad de las condiciones secas y cálidas favoreció la persistencia de daños por sequía en cultivos herbáceos (girasol), especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Fuente: *AGROSEGURO*

RESUMEN JRC

Boletín JRC MARS

European Commission

SEGUIMIENTO| SEQUÍA, CULTIVOS RENDIMIENTO.

ORGANISMO | ESCALA JRC -EUROPA

FECHA DEL DOCUMENTO **Septiembre 2026**

Informe Seguimiento de cultivos en Europa: Septiembre 2026

El Joint Research Center (JRC) ha publicado su "Informe de seguimiento de cultivos en Europa: SEPTIEMBRE 2026" en el que se analiza el panorama agrometeorológico de los países europeos con avances de seguimiento de cultivos y previsión de rendimientos. El periodo que abarca este número del 1 de agosto al 19 de septiembre de 2026. El informe completo se encuentra disponible en: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC146189

La lluvia llega demasiado tarde para salvar el rendimiento de las cosechas de verano

Las previsiones de rendimiento de los cultivos de verano de la UE se mantienen muy por debajo de la media de los últimos cinco años y se han reducido aún más este mes en un 7 % en el caso de la remolacha azucarera, en un 2 % tanto para el maíz en grano como para la soja y en un 1 % para las patatas. La previsión para el arroz es un 3 % inferior a la media, lo que refleja principalmente las malas perspectivas en Italia. La producción de pastos y forraje también se mantiene muy por debajo de la media en amplias zonas. Por otra parte, las perspectivas generales para el girasol y la haba de campo han mejorado ligeramente.



Las lluvias que comenzaron a mediados de agosto llegaron demasiado tarde para revertir las pérdidas sufridas anteriormente en los cultivos de verano, pero resultaron beneficiosas para la siembra de cereales de invierno. El suroeste y el sureste de Europa registraron escasas precipitaciones, y la sequedad del suelo sigue limitando el desarrollo de la patata y la remolacha azucarera y afecta cada vez más al establecimiento de la colza de invierno. Por otra parte, el exceso de precipitaciones está dificultando la cosecha en los países bálticos. Las previsiones de tiempo seco en el centro y el sureste de Europa podrían limitar aún más el establecimiento de los cultivos de invierno.



Esta edición presenta un análisis específico de cultivos basado en el satélite Sentinel-2, que proporciona indicadores de crecimiento por satélite para cultivos concretos y permite realizar evaluaciones más detalladas de los cultivos en toda Europa.

Impacto en el norte de España

El prolongado periodo de tiempo seco y caluroso tuvo repercusiones confirmadas en los cultivos de girasol de secano, el maíz verde y los pastos. Los cultivos de regadío obtuvieron resultados algo mejores, aunque las elevadas temperaturas estivales también limitaron su potencial de rendimiento.

Impacto en el oeste y centro de Europa

Los persistentes déficits hídricos siguieron afectando a los cultivos en amplias zonas del oeste y el centro de Europa, a pesar de que las lluvias han supuesto un cierto alivio. Las repercusiones en los cultivos de verano siguen siendo generalizadas y, en algunos casos, se han agravado aún más, mientras que el exceso de lluvias en los países bálticos está dificultando la cosecha y las labores agrícolas.

FUENTES:

- **Situación meteorológica:**
  - AEMET: https://www.aemet.es/es/portada

- **Hidrología:**
  - Boletín hidrológico (MITERD): https://sede.miteco.gob.es/BoleHWeb/
  - Informe situación de sequía y escasez (MITERD): https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento.html

- **Avances de superficies y producciones de cultivos:**
  - SGACE (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce-tendencias-mensuales-rendimientos-cultivos

- **Seguro Agrario:**
  - ENESA (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/enesa/
  - AGROSEGURO: https://agroseguro.es/

- **Boletín JRC MARS:** https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins

ANEXO 1. TABLA VALORES SPI.

SPI en septiembre de 2026			
	Acumulado año agrícola		
	1 mes	6 meses	12 meses
A CORUÑA	-0.45	-1.93	0.30
ALBACETE	-0.44	-1.46	-0.15
ALICANTE	-0.33	-0.63	0.16
ALMERIA	-0.50	-1.23	-0.12
ARABA/ALAVA	-1.37	-1.76	-1.19
ASTURIAS	-0.70	-1.85	-1.49
AVILA	-1.36	-1.39	0.48
BADAJOZ	-0.85	-1.85	0.34
BALEARES	-0.17	-1.22	-0.18
BARCELONA	-0.06	-1.79	-0.08
BIZKAIA	-1.03	-1.81	-0.75
BURGOS	-1.51	-1.72	-1.04
CACERES	-0.90	-1.14	0.80
CADIZ	-1.62	-1.87	0.81
CANTABRIA	-0.60	-1.56	-1.23
CASTELLON	-0.82	-1.77	0.14
CEUTA	-0.47	-1.14	2.08
CIUDAD REAL	-1.21	-1.47	0.43
CORDOBA	-1.94	-1.42	0.80
CUENCA	-1.00	-2.17	-0.49
GIPUZKOA	-1.24	-2.47	-1.24
GIRONA	-0.29	-1.13	0.47
GRANADA	-0.43	-1.17	0.55
GUADALAJARA	-1.63	-1.65	-0.50
HUELVA	-0.92	-2.25	0.31
HUESCA	-1.92	-2.95	-1.23
JAEN	-1.13	-1.63	0.61
LA RIOJA	-1.46	-0.87	0.14
LAS PALMAS	-0.52	0.29	1.39
LEON	-0.67	-0.84	0.09
LLEIDA	-1.88	-2.55	-0.41
LUGO	-0.67	-1.49	-0.21
MADRID	-1.48	-1.82	-0.04
MALAGA	-0.40	-1.20	0.51
MELILLA	-1.34	-1.18	0.25
MURCIA	-0.34	-0.80	0.46
NAVARRA	-1.36	-2.40	-1.15
OURENSE	-0.76	-1.16	0.37
PALENCIA	-0.82	-0.92	-0.11
PONTEVEDRA	-0.59	-1.43	0.82
SALAMANCA	-0.98	-0.89	0.85
SANTA CRUZ DE TENERIFE	-0.10	0.72	1.16
SEGOVIA	-1.35	-1.88	-0.13
SEVILLA	-1.19	-1.86	0.64
SORIA	-1.25	-1.62	-0.13
TARRAGONA	-1.35	-2.56	0.49
TERUEL	-0.73	-1.64	-0.63
TOLEDO	-1.48	-1.69	-0.74
VALENCIA	0.06	-0.71	0.45
VALLADOLID	-0.63	-1.18	-0.03
ZAMORA	-0.57	-0.77	0.75
ZARAGOZA	-0.93	-1.49	-0.46