INFORME COPAC

2026

16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Nº37



Comisión Permanente para Adversidades Climáticas o Medioambientales (COPAC)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pº de la Infanta Isabel, 1 - 28071 Madrid – Tel: 91 347 54 01 – sgapc@mapa.es

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Título:
Informe COPAC

Edita:
© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones

Unidad proponente:
Subsecretaria de Agricultura. Pesca y Alimentación
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

NIPO: 003-24-002-3

Tienda online:
www.mapa.gob.es
https://servicio.mapa.gob.es/tienda/

e-mail:
centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
https://cpage.mpr.gob.es/

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

Seguimiento COPAC 2026 – Impacto en el sector agrario

Índice

04 Resumen Ejecutivo

05 Situación Meteorológica

09 Hidrología

13 Tendencia de Rendimientos de Cultivos

18 Información Adicional

1. RESUMEN EJECUTIVO

- **Año hidrológico 2025/2026.** El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 de octubre de 2025 al 15 de septiembre de 2026) ha sido de 643,1 mm, un 4,8 % superior al valor normal. La precipitación media nacional normal para ese período es de 613,9 mm. Hace una semana fue un 6,1 % superior. Hace un año fue superior en un 8,2 % y hace dos años superior en un 3,8 %.

- **Las reservas disminuyen** con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 61,9 % de su capacidad (24.017 hm3), valor inferior a la semana anterior (62,3 %), valor superior al año pasado (51,8 %), superior a la media de los últimos 5 años (37,3 %) y superior a la media de los últimos 10 años (39,9 %). La reserva del Segura es superior en 27 puntos porcentuales respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 53 %, las del Guadiana se sitúan en un 73,1 %, en el Guadalquivir están al 71,1 % y en las cuencas Internas de Cataluña están al 75,3 %.

- Con datos a fecha de julio de 2026, en el Apartado 4: **ESYRCE** Tendencias de Rendimientos, se proporcionan las estimaciones de rendimiento disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España.

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA

2.1. PRECIPITACIONES Año hidrológico 2025/2026

Año hidrológico 2025/2026. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas (en el periodo del 1 de octubre de 2025 al 15 de septiembre de 2026) ha sido de 643,1 mm, un 4,8 % superior al valor normal. La precipitación media nacional normal para ese período es de 613,9 mm. Hace una semana fue un 6,1 % superior. Hace un año fue superior en un 8,2 % y hace dos años superior en un 3,8 %.

Cierre año hidrológico 2024/2025. Con datos de la AEMET, el valor medio de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico 2024/2025 se situó en 683,7 mm en la Península, un 6,8 % superior al valor normal en el periodo de referencia 1991-2020, que son 640,1 mm.

Mapa. Semana actual



Mapa. Semana anterior



Mapa. Hace un año



Mapa: Hace 2 años



INDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI en sus siglas en inglés)

El SPI (Standardized Precipitation Index), es un índice que permite cuantificar el déficit de precipitación para diferentes escalas temporales y, en base a ello, poder evaluar el impacto del déficit de precipitación sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos hídricos. La clasificación de los periodos de sequía en distintas categorías o intensidades fue señalada por McKee en 1993 y posteriormente refinada por Agnew* en el año 2000. La clasificación es de gran utilidad para determinar los espacios que están sufriendo más sequía y clasificar la intensidad de esta en diferentes grados. Por ejemplo, un valor de SPI, para un periodo determinado, de -2,3 indicaría que la cantidad de precipitación que se registrada en ese período se ha situado a 2,3 veces la desviación estándar por debajo del valor medio.

SPI	CATEGORÍA
≥ 1.65	Extremadamente húmedo
1.28 a 1.64	Severamente húmedo
0.84 a 1.27	Moderadamente húmedo
-0.83 a 0.83	Normal
-1.27 a -0.84	Moderadamente seco
-1.64 a -1.28	Severamente seco
≤ -1.65	Extremadamente seco

La teoría de Agnew refinó los valores de umbrales de sequía en 2020.



SPI en agosto de 2026
12 meses (acumulado año agrícola)

A CORUÑA	0.31	JAEN	0.60
ALBACETE	-0.35	LA RIOJA	0.21
ALICANTE	0.22	LAS PALMAS	1.34
ALMERIA	-0.36	LEON	-0.12
ARABA/ALAVA	-1.18	LLEIDA	-0.02
ASTURIAS	-1.56	LUGO	-0.16
AVILA	0.45	MADRID	-0.08
BADAJOZ	0.35	MALAGA	0.31
BALEARES	-0.04	MELILLA	0.26
BARCELONA	0.18	MURCIA	0.44
BIZKAIA	-0.63	NAVARRA	-1.11
BURGOS	-0.98	OURENSE	0.39
CACERES	0.79	PALENCIA	-0.24
CADIZ	0.82	PONTEVEDRA	0.96
CANTABRIA	-1.09	SALAMANCA	0.67
CASTELLON	0.35	SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.08
CEUTA	2.03	SEGOVIA	-0.18
CIUDAD REAL	0.41	SEVILLA	0.64
CORDOBA	0.67	SORIA	-0.26
CUENCA	-0.77	TARRAGONA	0.61
GIPUZKOA	-1.13	TERUEL	-0.53
GIRONA	0.65	TOLEDO	-0.69
GRANADA	0.53	VALENCIA	0.37
GUADALAJARA	-0.68	VALLADOLID	-0.20
HUELVA	0.36	ZAMORA	0.56
HUESCA	-1.01	ZARAGOZA	-0.45

NOTA: Los datos numéricos de SPI figuran en el ANEXO 1 del informe COPAC.





2.2. Evolución mensual de las precipitaciones Años hidrológicos 2022/2023 a 2025/26.

AÑO HIDROLÓGICO									
	VALOR NORMAL DE REFERENCIA (1991-2020)	2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
	Precipitación normal mensual	Precipitación	valor normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	% respecto valor normal mensual	Precipitación	%respecto al valor normal
Año hidrológico	**640,1 mm**	**561 mm**	**-12%**	**671 mm**	**5%**	**684 mm**	**7%**	**643 mm**	
Octubre	77,8 mm	52 mm	-33%	105 mm	35%	147 mm	89%	48 mm	-38%
Noviembre	78,1 mm	64 mm	-20%	71 mm	-9%	38 mm	-52%	93 mm	19%
Diciembre	73,3 mm	118 mm	43%	33 mm	-54%	24 mm	-67%	80 mm	9%
Enero	64,5 mm	60 mm	-7%	68 mm	5%	88 mm	36%	119 mm	85%
Febrero	51,5 mm	17 mm	-67%	70 mm	35%	34 mm	-34%	124 mm	141%
Marzo	59,4 mm	21 mm	-64%	120 mm	102%	149 mm	151%	49 mm	-18%
Abril	63,5 mm	14 mm	-78%	32 mm	-50%	71 mm	11%	37 mm	-42%
Mayo	56,8 mm	60 mm	6%	38 mm	-34%	51 mm	-10%	48 mm	-15%
Junio	32,0 mm	67 mm	110%	48 mm	49%	22 mm	-32%	12 mm	-61%
Julio	16,8 mm	10 mm	-41%	10 mm	-39%	21 mm	24%	4 mm	-74%
Agosto	21,7 mm	10 mm	-53%	24 mm	12%	14 mm	-34%	23 mm	6%
Septiembre*	44,7 mm	67 mm	51%	52 mm	16%	25 mm	-42%	6 mm	-88%

* Dato provisional a 15 de septiembre

NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17)



** Dato provisional a 15 de septiembre de 2026*

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.3. Distribución territorial (principales observatorios de AEMET).

Figura 5. ***Precipitaciones del 1 de octubre de 2025 al 15 de septiembre de 2026***

ESTACIÓN (AEMET)	Periodo del 01/10/2025-15/09/26			
	Precipitación Acumulada desde 01/10/2025	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) (mm)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020)(%)	Anomalía Ppción acum. respecto de normal (1991-2020) de la semana anterior (%)
TOTAL ASTURIAS	844,7	-148,7	-15,0%	-14,9%
TOTAL CANTABRIA	1.009,0	-47,8	-4,5%	-3,3%
TOTAL PAIS VASCO	1.184,8	-52,9	-4,3%	-2,7%
TOTAL CASTILLA Y LEON	491,4	40,9	9,1%	10,7%
TOTAL LA RIOJA	446,9	30,4	7,3%	9,1%
TOTAL NAVARRA	624,4	-52,2	-7,7%	-6,3%
TOTAL ARAGÓN	330,1	-41,7	-11,2%	-9,4%
TOTAL CATALUÑA	498,7	11,1	2,3%	4,2%
TOTAL MADRID	570,9	27,7	5,1%	10,3%
TOTAL CASTILLA LA MANCHA	376,1	-8,3	-2,2%	-0,3%
TOTAL EXTREMADURA	596,7	135,9	29,5%	31,0%
TOTAL VALENCIA	417,5	77,7	22,9%	25,4%
TOTAL BALEARES	495,7	66,3	15,4%	15,2%
TOTAL ANDALUCÍA	584,1	128,8	28,3%	29,9%
TOTAL MURCIA	344,0	72,8	26,9%	25,5%
TOTAL CANARIAS	294,0	85,8	41,2%	41,2%
CEUTA	1.243,8	524,8	73,0%	74,3%
MELILLA	360,2	0,9	0,3%	1,3%
Media Nacional	643,1	29,2	4,8%	6,1%

Fuente: Elaboración MAPA con datos de AEMET

2.4. Agosto



El mes de agosto de 2026 ha tenido carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 22,9 mm, valor que representa el 6 %* del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. El carácter de la temperatura en España de agosto de 2026 ha sido muy cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,4 °C, esto supone una anomalía de +1,4 °C respecto a la media del periodo de referencia 1991-2020.

*Dato elaborado por MAPA.

2.5. Predicción estacional de la AEMET.

La predicción de anomalías en el trimestre **septiembre-octubre-noviembre** en la península y ambos archipiélagos es la siguiente:

- **Temperatura:** las temperaturas estarán en el tercil superior con alta probabilidad en toda España, aunque la señal cálida es más intensa para el tercio norte y tercio este peninsulares, Baleares y Canarias. (Periodo de referencia 1991-2020)

- **Precipitación:** hay una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercil superior en el noroeste peninsular, vertiente mediterránea y Baleares. Dentro del trimestre, la anomalía de precipitación será mayor en la vertiente mediterránea durante el mes de septiembre, y en el noroeste para el resto del período. (Periodo de referencia 1991-2020)

3. HIDROLOGÍA

3.1. RESERVAS USO CONSUNTIVO. AÑO HIDROLOGICO 2025/2026. Datos de la semana del del 8 al 15 de septiembre de 2026.

- **Las reservas disminuyen** con respecto a la semana pasada. La reserva hidráulica peninsular (uso consuntivo) se sitúa en un 61,9 % de su capacidad (24.017 hm3), valor inferior a la semana anterior (62,3 %), valor superior al año pasado (51,8 %), superior a la media de los últimos 5 años (37,3 %) y superior a la media de los últimos 10 años (39,9 %). La reserva del Segura es superior en 27 puntos porcentuales respecto a la media de los últimos 10 años. Las reservas del Segura se sitúan en un 53 %, las del Guadiana se sitúan en un 73,1 %, en el Guadalquivir están al 71,1 % y en las cuencas Internas de Cataluña están al 75,3 %.

TRASVASE TAJO SEGURA

- Los embalses de la cabecera del Tajo**, Entrepeñas y Buendía:** capacidad conjunta de 1.290 hm^3. Autorizados 27 hm^3 para septiembre.

Fuente: Dirección General del Agua MITERD

Evolución reservas de uso consuntivo (Año hidrológico 2025-2026):



% Capacidad de reservas de uso consuntivo por cuencas

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	45	61,6	72,6	74,8	73,0
Cantábrico Occidental	29	63,0	65,2	75,2	73,7
Miño - Sil	264	72,9	86,5	63,0	61,3
Galicia Costa	47	59,5	70,9	72,4	71,8
Cuencas Internas del País Vasco	16	76,2	76,2	76,2	72,9
Duero	1.474	50,7	48,5	41,5	43,0
Tajo	2.973	51,4	57,3	41,3	38,5
Guadiana	6.968	73,1	58,8	35,2	40,7
Tinto, Odiel y Piedras	160	69,9	71,2	67,4	68,4
Guadalete-Barbate	1.269	76,9	43,4	27,6	38,5
Guadalquivir	5.671	71,1	43,7	28,6	35,0
Vertiente Atlántica	18.916	66,0	52,9	35,7	39,5
Cuenca Mediterránea Andaluza	771	65,7	47,2	35,4	40,4
Segura	601	53,0	19,1	27,0	26,0
Júcar	1.387	51,4	48,2	47,1	38,4
Ebro	1.832	41,2	52,8	43,6	45,2
Cuencas Internas de Cataluña	510	75,3	73,0	47,3	59,7
Vertiente Mediterránea	5.101	50,4	48,5	42,0	41,3
TOTAL PENINSULAR	24.017	61,9	51,8	37,3	39,9

AGUA EMBALSADA: 61,9 %

% Capacidad de reservas (uso consuntivo) por cuencas con respecto a la media de los últimos 10 años



3.2. INDICADORES DE ESTADO DE SEQUÍA

El BOE de 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los Planes Especiales de Sequía. En este apartado se analiza la situación, indicadores y escenarios respecto a sequía y escasez con los nuevos planes de sequía de las demarcaciones intercomunitarias y las unidades territoriales en ellos establecidas.

A finales de julio de 2026, la situación de los **indicadores de sequía prolongada** es la que se muestra en el Mapa.

A continuación, se representan, por su posible incidencia en el sector agrario, **los mapas de escasez coyuntural de los meses de junio y julio.**

A fecha 30 de junio de 2026

A fecha 31 de julio de 2026

Situación de los indicadores de Escasez Coyuntural por cuencas a finales de julio de 2026.

Aunque julio no es un mes en el que se previeran lluvias de importancia, su carácter extremadamente seco, particularmente en el norte, ha producido un ligero empeoramiento respecto a la escasez coyuntural. La situación sigue siendo favorable, y en la mayor parte de las cuencas hay una situación casi generalizada de normalidad o prealerta.

Al final del mes de julio, las demarcaciones de Miño, Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencias de la AGE), Cantábrico Occidental, Duero, Tajo, Segura, Ebro, Ceuta, Melilla, Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto Odiel y Piedras tienen todas sus UTE en escenario de Normalidad o Prealerta.

En la demarcación del Guadiana se encuentra la única UTE en escenario de Emergencia de la Península, que es la UTE de Mancha Occidental, estando el resto en escenarios de Normalidad (18) o Prealerta (2). En la demarcación del Guadalquivir todas las UTE se encuentran en escenario de Normalidad (20) o Prealerta (2) salvo la de Guardal que se mantiene en escenario de Alerta. En la demarcación del Júcar todas las UTE alcanzan el escenario de Normalidad a excepción de la UTE de la Marina Baja que se mantiene en escenario de Alerta.

En la demarcación intracomunitaria de Galicia Costa dos UTE pasan a escenario de Alerta (UTE de Río Lérez y Ría de Pontevedra y UTE de Río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo) manteniéndose el resto en situación de Prealerta (4) y de Normalidad (13). En la demarcación del Cantábrico Oriental, en el ámbito de competencias del País Vasco, tres UTE se encuentran en situación de Alerta (Oka, Lea y Artibai) y el resto se encuentran en situación de Prealerta (4) o Normalidad (5).

Esto supone que el 0,5% de la superficie está en escenario de Alerta y el 1,6% en Emergencia.

HUMEDAD DEL SUELO

La semana anterior

Hace 1 año



4. TENDENCIAS DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS. JULIO 2026

Se presenta, a 30 de julio de 2026, una estimación del rendimiento medio para cada cultivo en Kg/ha, en secano y regadío, tomando como base los aforos disponibles realizados en el marco de los trabajos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) para la campaña 2026. El periodo de aforo va desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.

CEREALES:

Cereales de secano. Todos los cultivos analizados presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025, aunque algunos se mantienen próximos a sus medias históricas recientes.

Por cultivos, la cebada de 2 carreras presenta un rendimiento medio estimado de 2.607 kg/ha, un 25% inferior al de 2025. Este valor se sitúa ligeramente por encima de la media de los últimos cinco años y únicamente un 4% por debajo de la media de los últimos diez. Los mayores descensos respecto a la campaña anterior se observan en el centeno y la cebada de 6 carreras, cuyos rendimientos medios alcanzan 1.848 y 2.020 kg/ha, respectivamente, un 31% y un 27% inferiores a los registrados en 2025, situándose ligeramente por debajo de las referencias históricas. Por su parte, el trigo blando y semiduro registra un rendimiento medio estimado de 2.962 kg/ha, un 24% inferior al de la campaña precedente. Sin embargo, este resultado se mantiene prácticamente equivalente a la media quinquenal y solo ligeramente por debajo de la decenal, situándose dentro de los valores considerados normales para este cereal. El trigo duro presenta el comportamiento más favorable dentro del conjunto analizado. Con un rendimiento medio de 2.508 kg/ha, la reducción frente a 2025 es del 17%, la menor de todos los cereales considerados. Además, supera en un 9% la media de los últimos cinco años y en un 3% la de los últimos diez, confirmando una evolución especialmente positiva en comparación con sus referencias históricas. La avena alcanza 1.667 kg/ha, un 22% menos que en 2025. No obstante, este valor se sitúa prácticamente en línea con la media de los últimos cinco años y solo ligeramente por debajo de la media decenal, lo que refleja un comportamiento acorde con la normalidad de este cultivo, aunque alejado de los buenos resultados obtenidos en la campaña anterior. El triticale presenta un rendimiento medio de 2.086 kg/ha, un 20% inferior al registrado en la campaña anterior.

Gráfico: Serie histórica rendimientos cereales de secano (Kg/ha).



Cereales de regadío: En términos generales, los cultivos analizados presentan comportamientos diferenciados respecto a la campaña 2025, aunque en varios casos los rendimientos se mantienen próximos o por encima de sus medias históricas recientes. La cebada de dos carreras presenta un rendimiento medio estimado de 5.340 kg/ha, un 6% inferior al registrado en 2025. No obstante, este valor se sitúa por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. La cebada de seis carreras presenta un rendimiento estimado de 4.993 kg/ha, ligeramente superior al valor observado en 2025 (4.834 kg/ha), con un índice de variación de 103. Asimismo, el rendimiento estimado se sitúa por encima de las medias históricas de referencia, alcanzando el 132% de la media quinquenal y el 141% de la media decenal. Por su parte, el maíz presenta un rendimiento medio estimado de 13.171 kg/ha, valor muy próximo al obtenido en 2025 (13.053 kg/ha), con un incremento del 1%. Este valor se mantiene prácticamente en línea con la media de los últimos cinco años y ligeramente por encima de la media de los últimos diez. El trigo duro alcanza un rendimiento de 5.129 kg/ha, un 1% superior al de 2025, situándose por encima de sus medias históricas. El trigo blando y semiduro registra un rendimiento medio estimado de 5.432 kg/ha, frente a los 5.991 kg/ha de 2025, lo que representa una reducción del 9%. Respecto a las medias históricas, el rendimiento se sitúa un 1% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 2% por debajo de la media de los últimos diez años. La avena registra un rendimiento medio estimado de 2.947 kg/ha, frente a los 3.686 kg/ha obtenidos en 2025, lo que representa un índice de variación del rendimiento de 80. Este valor se sitúa también por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años, alcanzando respectivamente el 91% y el 93% de dichas referencias. El centeno muestra un rendimiento medio estimado de 3.458 kg/ha, frente a los 3.976 kg/ha registrados en la campaña anterior, lo que supone una disminución del 13%. En relación con las medias históricas, el rendimiento es un 11% inferior tanto a la media de los últimos cinco años como a la de los últimos diez años. Finalmente, el triticale alcanza un rendimiento medio estimado de 4.542 kg/ha, un 6% inferior al registrado en la campaña anterior. En este cultivo, el número de aforos realizados en 2026 supera en un 27% al de la campaña anterior.



- **LEGUMINOSAS DE GRANO:**

En el caso de leguminosas grano de secano, En términos generales, se observa un descenso de los rendimientos respecto a la campaña 2025 en la mayoría de las especies analizadas, aunque las habas secas y las lentejas mantienen valores similares a los de la campaña anterior. Los guisantes secos concentran el mayor número de aforos realizados, con un 38% del total, y presentan un rendimiento medio estimado de 1.061 kg/ha, un 16% inferior al registrado en 2025. No obstante, este valor se sitúa por encima de la media de los últimos cinco años y próximo a la media de los últimos diez años. Los yeros alcanzan un rendimiento medio estimado de 643 kg/ha, un 17% inferior al de la campaña

precedente, situándose por debajo de sus medias históricas de referencia. Las habas secas presentan un rendimiento medio de 996 kg/ha, prácticamente idéntico al registrado en 2025, aunque por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años. Por su parte, las lentejas alcanzan 728 kg/ha, manteniendo un rendimiento prácticamente igual al de la campaña precedente y situándose por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. Los garbanzos registran un rendimiento medio estimado de 790 kg/ha, un 10% inferior al de 2025, situándose por debajo de sus medias históricas de referencia. En cuanto a la veza, presenta un rendimiento medio de 887 kg/ha, un 20% inferior al observado en la campaña anterior. Este cultivo no dispone de medias históricas de referencia al incorporarse a la investigación de rendimientos a partir de 2025.

- **HORTÍCOLAS:**

Dentro del grupo de cultivos hortícolas de regadío, respecto a la campaña anterior, se registran incrementos de rendimiento en zanahoria (+27%), sandía (+21%), y guisantes verdes (+4%). De estos cultivos, la sandía presenta además un rendimiento superior a su media de los últimos cinco años (+14%), mientras que zanahoria (-1%) y guisantes verdes (-5%) se sitúan ligeramente por debajo de sus respectivas medias históricas. Por el contrario, ajo (-3%), berenjena (-11%), calabacín (-1%), cebolla (-3%), habas verdes (-46%), melón (-9%), pimiento (-11%) y tomate (-25%) presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025. Entre ellos, únicamente el ajo supera su media de los últimos cinco años (+6%), mientras que el resto se sitúan por debajo de sus valores medios, destacando especialmente las habas verdes (-68%) y el tomate (-19%). En comparación con la media de los últimos diez años, los rendimientos se sitúan por encima de esta referencia en ajo (+7%) y sandía (+21%), mientras que el resto de cultivos presentan valores inferiores, con los descensos más acusados en habas verdes (-69%), guisantes verdes (-16%) y tomate (-18%).

- **FRUTALES NO CÍTRICOS:**

En el grupo de frutales no cítricos en secano, el cerezo y guindo presentan un rendimiento medio de 3.034 kg/ha, un 32% inferior al registrado en la campaña anterior. Asimismo, el rendimiento se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro y cinco años, con descensos del 15% y 16%, respectivamente, y un 19% inferior a la media de los últimos diez años.

En el grupo de frutales no cítricos en regadío, el aguacate alcanza un rendimiento medio estimado de 4.553 kg/ha, un 29% inferior al registrado en la campaña 2025 y por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El albaricoquero presenta un rendimiento medio de 12.900 kg/ha, un 8% superior al de la campaña anterior y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El cerezo y guindo alcanzan un rendimiento medio de 8.094 kg/ha, un 19% superior al registrado en 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. El ciruelo, con un rendimiento de 15.339 kg/ha, registra un descenso del 3% respecto a la campaña anterior. Por su parte, el manzano y el peral presentan incrementos del 7% y 1%, respectivamente, respecto a 2025, situándose ambos por encima de sus medias históricas de cuatro y cinco años. En cuanto al melocotonero, nectarina y paraguaya, presentan descensos respecto a la campaña anterior, con rendimientos medios de 22.010, 22.984 y 23.961 kg/ha, respectivamente. Por el contrario, la platerina alcanza un rendimiento medio estimado de 27.154 kg/ha, un 78% superior al registrado en la campaña anterior.

Por último, la platanera registra un rendimiento medio de 53.052 kg/ha, manteniéndose en niveles muy similares a los de la campaña 2025 y ligeramente por encima de sus medias históricas. En resumen, los mayores incrementos respecto a 2025 en cuanto a los rendimientos corresponden a platerina (+78%), cerezo y guindo (+19%), albaricoquero

(+8%), manzano (+7%) y peral (+1%). Por el contrario, los descensos más acusados se observan en aguacate (-29%), melocotonero y nectarino (-12%), paraguaya (-10%), nectarina (-5%), ciruelo (-3%) y platanera (-1%). Respecto a las medias históricas disponibles, destacan los índices superiores a la media en albaricoquero, cerezo y guindo, manzano, peral y platanera, mientras que aguacate y ciruelo presentan índices inferiores a dichas referencias.

- **FRUTALES CÍTRICOS:**

Las primeras estimaciones de rendimiento para cítricos en regadío se basan en el módulo de aforos tempranos. Por ello, los resultados deben interpretarse en el contexto de esta metodología y teniendo en cuenta el carácter preliminar de estas estimaciones. Dentro del grupo de cítricos en regadío, para el limonero se estima un rendimiento medio de 28.671 kg/ha, un 41% superior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. En naranjo, el rendimiento estimado es de 21.847 kg/ha, similar al registrado en la campaña 2025 y por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años. Por otro lado, respecto a 2025, las clementinas mantienen un rendimiento similar, las satsumas aumentan un 22% y el grupo de otras mandarinas disminuyen un 36%. En pomelo, el rendimiento estimado alcanza los 40.844 kg/ha, un 20% superior al de 2025. En conjunto, los rendimientos estimados para 2026 representan entre el 64% y el 141% de los obtenidos en 2025 según el cultivo. El limonero, el mandarino satsuma y el pomelo presentan índices superiores a los de la campaña anterior, mientras que el mandarino clementina mantiene valores similares, el naranjo registra un índice próximo a la unidad y otros mandarinos muestran un índice inferior al de 2025. Respecto a las referencias históricas disponibles, el limonero presenta índices superiores a las medias de comparación, mientras que el naranjo se sitúa por debajo de las medias de cuatro, cinco y diez años.

- **OLIVAR:**

Las primeras estimaciones de rendimiento para olivar, tanto de secano como de regadío, se basan en el módulo de aforos tempranos. Por ello los datos deben ser analizados dentro de ese contexto. Para olivar de secano, se estima un rendimiento medio de 2.515 kg/ha, un 17% superior al de 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

En cuanto al olivar de regadío, el rendimiento estimado alcanza los 5.041 kg/ha, un 29% superior al de 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

- **VIÑEDO:**

Las primeras estimaciones de rendimiento para viñedo, tanto de secano como de regadío, se basan fundamentalmente en el módulo de aforos tempranos. Por ello los datos deben ser analizados dentro de ese contexto. Para viñedo de secano, las primeras estimaciones apuntan a un rendimiento medio estimado de 5.882 kg/ha, un 25% superior al registrado en la campaña 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años

- **CULTIVOS DE INVERNADERO:**

Dentro del grupo de cultivos de invernadero, respecto a la campaña anterior, se registran incrementos de rendimiento en melón (+3%), mientras que fresa-fresón (-13%), calabacín (-5%), pimiento (-8%), sandía (-1%), pepino (-39%), tomate (-24%) y platanera (-5%) presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025. En comparación con las medias de los últimos cuatro y cinco años, melón se sitúa por encima de ambas referencias, mientras que fresa-fresón se mantiene prácticamente en línea con ellas. El resto de los

cultivos presentan rendimientos inferiores a ambas medias, destacando especialmente pepino y tomate. Por otra parte, la platanera presenta un rendimiento inferior a la media de los últimos cuatro años, aunque se mantiene prácticamente en línea con la media de los últimos cinco años. Respecto a la media de los últimos diez años, únicamente melón se sitúa por encima de esta referencia, mientras que fresa-fresón y platanera presentan rendimientos ligeramente inferiores. El resto de los cultivos presentan rendimientos inferiores a la media de los últimos diez años.

- **TUBÉRCULOS:**

Dentro del grupo de los tubérculos, la patata de secano, presenta un rendimiento medio estimado de 34.651 kg/ha. Este valor supone un descenso del 9% respecto al registrado en la campaña 2025. Asimismo, el rendimiento estimado se sitúa un 20% por encima de la media de los últimos cinco años y un 30% por encima de la media de los últimos diez años. En cuanto a la patata de regadío, presenta un rendimiento medio estimado de 37.146 kg/ha, un 11% inferior al registrado en la campaña 2025 y a las medias de los últimos cinco y diez años.

- **CULTIVOS INDUSTRIALES:**

En secano, la colza, único cultivo representativo, presenta un rendimiento medio estimado de 1.952 kg/ha, lo que supone un descenso del 26% respecto a la campaña anterior. No obstante, este valor se sitúa ligeramente por encima de la media de los últimos cinco años y en niveles similares a la media de los últimos diez años. Por su parte, el girasol, con 356 aforos realizados, alcanza un rendimiento medio estimado de 901 kg/ha, un 12% inferior al registrado en 2025 y ligeramente por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años. En cultivos industriales de regadío, la colza presenta un rendimiento medio estimado de 3.323 kg/ha, lo que supone un descenso del 13% respecto a la campaña anterior, aunque se sitúa ligeramente por encima de las medias de los últimos cinco y diez años. Por su parte, el girasol, con 74 aforos realizados, alcanza un rendimiento medio estimado de 2.467 kg/ha, un 8% superior al registrado en 2025 y por encima de las medias de los últimos cinco y diez años.

5. INFORMACION ADICIONAL

5.1. SEGUROS AGRARIOS

Año 2026

Previsión de indemnizaciones (del 1 de enero al 31 de agosto de 2026): 453,17 M€.
Fuente: AGROSEGURO (incluye la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones).

Superficie afectada (del 1 de enero al 31 de agosto de 2026): 1.333.348 ha.
Fuente: AGROSEGURO

Cultivos más afectados: (del 1 de enero al 31 de agosto de 2026): herbáceos, frutales, uva de vinificación, hortalizas, cítricos, caqui, frutos secos y fresón y frutos rojos.
Fuente: AGROSEGURO

5.2 SINIESTRALIDAD. EVENTOS SIGNIFICATIVOS 2026.

AGOSTO

Durante el mes de agosto, España ha experimentado una situación meteorológica especialmente adversa, caracterizada por la alternancia de episodios de calor intenso con tormentas de elevada severidad. Las altas temperaturas persistentes favorecieron procesos de estrés térmico e hídrico en numerosos cultivos de secano, mientras que la sucesiva entrada de aire frío en altura dio lugar a la formación de tormentas muy activas acompañadas de pedrisco, fuertes rachas de viento, lluvias torrenciales e inundaciones localizadas. Los fenómenos más destacados se registraron en amplias zonas del valle del Ebro, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía. Especial relevancia tuvieron las tormentas ocurridas durante la segunda quincena del mes, que provocaron daños muy significativos en caqui, frutales, frutos secos, uva de vino, hortalizas (tomate, pimiento, cebolla, lechuga y brócoli) y cultivos herbáceos (maíz), especialmente por pedrisco. Asimismo, las elevadas temperaturas mantuvieron los daños por sequía y asurado afectando al cultivo de girasol y, en menor medida, al viñedo y los cultivos hortícolas.

Fuente: *AGROSEGURO*

RESUMEN JRC

Boletín JRC MARS

European Commission

SEGUIMIENTO| SEQUÍA, CULTIVOS RENDIMIENTO.

ORGANISMO | ESCALA JRC -EUROPA

FECHA DEL DOCUMENTO **Agosto 2026**

Informe Seguimiento de cultivos en Europa: Agosto 2026

El Joint Research Center (JRC) ha publicado su "Informe de seguimiento de cultivos en Europa: AGOSTO 2026" en el que se analiza el panorama agrometeorológico de los países europeos con avances de seguimiento de cultivos y previsión de rendimientos. El periodo que abarca este número del 1 de julio al 15 de agosto de 2026. El informe completo se encuentra disponible en: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC146187

El prolongado tiempo seco y caluroso reduce drásticamente el rendimiento de los cultivos de verano. El deterioro de los pastos suscita preocupación por el suministro de forraje.

El calor persistente y los déficits hídricos excepcionales han empeorado considerablemente las perspectivas de los cultivos de verano en todo el oeste y la mayor parte del centro de Europa, reduciendo la fertilidad y la acumulación de biomasa, perjudicando el llenado del grano y acelerando la senescencia. Las repercusiones van desde reducciones moderadas del rendimiento hasta pérdidas graves, siendo probable que se produzca una mala cosecha en las regiones más afectadas. La productividad de los pastizales y la disponibilidad de pastos también han disminuido notablemente, lo que suscita preocupación por el suministro de forraje. Aunque las condiciones de los cultivos de verano siguen siendo más favorables en algunas zonas del norte y el este de Europa, las previsiones de rendimiento de la UE para todos los cultivos de verano se han reducido drásticamente, situándose por debajo de la media de los últimos cinco años en hasta un 14 %.

Una vez finalizada en gran medida la cosecha, las perspectivas de rendimiento para la mayoría de los cereales de invierno se han confirmado en torno a la media de los últimos cinco años a nivel de la UE.

Las condiciones más frescas y húmedas previstas en gran parte de Europa occidental y central podrían suponer un cierto alivio, aunque demasiado tarde para compensar las pérdidas ya sufridas.



Impacto:

Efectos graves derivados del estrés térmico y el déficit hídrico: en Francia, el sur de Alemania, el norte y el centro de Italia, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría y el oeste de Rumanía.

Impactos moderados debido al estrés térmico y al déficit hídrico en Países del Benelux, Eslovenia y Croacia.

Alertas por condiciones de sequía: en sur de Irlanda, norte de Alemania y Dinamarca, sur de Polonia, oeste de Ucrania y oeste de Bulgaria.

Por el estrés térmico en norte de España y sur de Turquía: se registraron temperaturas muy elevadas a nivel local, aunque hasta ahora con efectos limitados sobre el estado de los cultivos.

Efectos ya comunicados sobre los cultivos de invierno en España, Francia, Alemania, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Polonia, Lituania y Ucrania. Las condiciones adversas registradas a principios de la temporada ya habían reducido las previsiones de rendimiento. Las posteriores olas de calor aceleraron la maduración y la cosecha en varias regiones.

FUENTES:

- **Situación meteorológica:**
  - AEMET: https://www.aemet.es/es/portada

- **Hidrología:**
  - Boletín hidrológico (MITERD): https://sede.miteco.gob.es/BoleHWeb/
  - Informe situación de sequía y escasez (MITERD): https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento.html

- **Avances de superficies y producciones de cultivos:**
  - SGACE (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce-tendencias-mensuales-rendimientos-cultivos

- **Seguro Agrario:**
  - ENESA (MAPA): https://www.mapa.gob.es/es/enesa/
  - AGROSEGURO: https://agroseguro.es/

- **Boletín JRC MARS:** https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins

ANEXO 1. TABLA VALORES SPI.

SPI en agosto de 2026			
	12 meses (acumulado año agrícola)	6 meses	12 meses
A CORUÑA	0.31	-2.38	0.31
ALBACETE	-0.35	-0.72	-0.35
ALICANTE	0.22	0.32	0.22
ALMERIA	-0.36	-1.07	-0.36
ARABA/ALAVA	-1.18	-0.90	-1.18
ASTURIAS	-1.56	-1.41	-1.56
AVILA	0.45	-0.91	0.45
BADAJOZ	0.35	-1.62	0.35
BALEARES	-0.04	-0.63	-0.04
BARCELONA	0.18	-1.03	0.18
BIZKAIA	-0.63	-0.80	-0.63
BURGOS	-0.98	-1.18	-0.98
CACERES	0.79	-1.31	0.79
CADIZ	0.82	-1.50	0.82
CANTABRIA	-1.09	-0.91	-1.09
CASTELLON	0.35	-0.23	0.35
CEUTA	2.03	-0.17	2.03
CIUDAD REAL	0.41	-0.74	0.41
CORDOBA	0.67	-0.91	0.67
CUENCA	-0.77	-1.63	-0.77
GIPUZKOA	-1.13	-1.56	-1.13
GIRONA	0.65	-0.22	0.65
GRANADA	0.53	-1.07	0.53
GUADALAJARA	-0.68	-1.03	-0.68
HUELVA	0.36	-1.99	0.36
HUESCA	-1.01	-2.25	-1.01
JAEN	0.60	-1.04	0.60
LA RIOJA	0.21	0.07	0.21
LAS PALMAS	1.34	2.69	1.34
LEON	-0.12	-0.88	-0.12
LLEIDA	-0.02	-1.70	-0.02
LUGO	-0.16	-1.81	-0.16
MADRID	-0.08	-1.14	-0.08
MALAGA	0.31	-1.27	0.31
MELILLA	0.26	-0.35	0.26
MURCIA	0.44	-0.05	0.44
NAVARRA	-1.11	-1.67	-1.11
OURENSE	0.39	-1.56	0.39
PALENCIA	-0.24	-0.83	-0.24
PONTEVEDRA	0.96	-1.90	0.96
SALAMANCA	0.67	-0.51	0.67
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.08	2.67	1.08
SEGOVIA	-0.18	-1.46	-0.18
SEVILLA	0.64	-1.52	0.64
SORIA	-0.26	-1.12	-0.26
TARRAGONA	0.61	-1.04	0.61
TERUEL	-0.53	-0.52	-0.53
TOLEDO	-0.69	-1.10	-0.69
VALENCIA	0.37	-0.15	0.37
VALLADOLID	-0.20	-0.75	-0.20
ZAMORA	0.56	-0.66	0.56
ZARAGOZA	-0.45	-0.54	-0.45