



ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA LENGUA AZUL

07.11.2025



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA LENGUA AZUL.....	3
2.1. SITUACIÓN EN MARRUECOS.....	5
2.2. SITUACIÓN EN TÚNEZ.....	9
3. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN EUROPA	9
3.1. FRANCIA.....	12
3.2. PORTUGAL.....	14
3.3. ITALIA	15
3.4. PAÍSES BAJOS.....	16
3.5. REINO UNIDO	17
3.6. ALEMANIA	19
3.7. GRECIA.....	20
4. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA.....	21
5. VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA	26



1. INTRODUCCIÓN

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y silvestres (principalmente ovinos, pero también bovinos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos, wapitíes y camélidos), y es transmitida por los insectos, en particular, por la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo Culicoides.

El virus causante de la lengua azul es identificado como miembro de la familia Reoviridae. Se han identificado 27 serotipos distintos, y la capacidad de cada cepa para provocar la enfermedad varía considerablemente.

La gravedad de la enfermedad varía según las diferentes especies, con síntomas más graves en los ovinos que causan la muerte, pérdida de peso, problemas respiratorios o reproductivos. Algunas cepas pueden causar también síntomas clínicos en bovino. En los ovinos altamente susceptibles, la morbilidad puede alcanzar hasta el 100%. La mortalidad media es de entre 2% y 30% pero puede alcanzar el 70%. En los bovinos la tasa de infección es con frecuencia más alta que en los ovinos y la presencia y gravedad de los signos clínicos varían según la cepa vírica.

Esta enfermedad se encuentra incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), y como enfermedad de categoría C en la lista de enfermedades (con Programa de control y erradicación voluntario) del Reglamento de Ejecución 2021/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, relativo a la aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades de la lista..

Para más información sobre la enfermedad se puede consultar el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx

2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA LENGUA AZUL

La lengua azul tiene una distribución global importante en regiones donde el insecto vector (esto es, los mosquitos de la especie Culicoides) está presente, incluida África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y varias islas de los trópicos y subtropicos. El virus se mantiene en áreas donde el clima favorece la supervivencia de los mosquitos al invierno.

En general, los ovinos de las áreas donde la enfermedad es endémica tienen una resistencia natural a la lengua azul. Los focos aparecen cuando se introducen ovinos susceptibles, en particular, las razas europeas, en las áreas endémicas, o cuando el virus



es introducido en una región en particular por el desplazamiento en el aire de *Culicoides* infectados. El episodio de la enfermedad generalmente coincide con un incremento de la actividad del vector durante los periodos de temperatura alta y lluvias, y una remisión con la primera helada o condiciones de frío intenso.

En base a los datos obtenidos de la OMSA, y de las últimas referencias bibliográficas disponibles, se resume cuáles han sido los serotipos detectados en los últimos años, y las especies de vectores responsables de la transmisión.

África

En el continente africano, origen y principal reservorio del virus, se han identificado los serotipos 1, 2, 3, 4 y 10. La elevada diversidad refleja la circulación endémica de múltiples cepas y la coexistencia de varios *Culicoides* vectores competentes, especialmente *C. imicola* y *C. bolitinos*.

América

En América se han detectado los serotipos 2, 10, 11 y 17, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Los vectores más relevantes son *Culicoides sonorensis* en América del Norte y *C. insignis* en América Central y del Sur.

Asia

El continente asiático presenta una amplia variedad de serotipos: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 y 15, lo que indica una circulación heterogénea del virus. Estos serotipos se han descrito en países como India, China y el sudeste asiático, donde actúan especies como *C. brevitarsis*, *C. imicola* y *C. peregrinus*.

Europa

En Europa se han notificado los serotipos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12 y 16. Las regiones mediterráneas (España, Italia, Grecia) han sido las más afectadas, con *C. imicola* como vector predominante, mientras que en el norte y centro de Europa la transmisión ha implicado especies locales como *C. obsoletus* y *C. dewulfi*.

Oceanía

En esta región se ha confirmado la presencia del serotipo 16, transmitido principalmente por *Culicoides brevitarsis*, especie endémica del norte de Australia y Papúa Nueva Guinea.

Oriente Medio

Los serotipos 1 y 4 son los predominantes, asociados a la circulación regional entre el norte de África, la península arábiga y Asia occidental. Los vectores más comunes son *C. imicola* y *C. schultzei*.



En base a los datos cuantitativos de la OMSA relativos al periodo comprendido entre 2021 y 2025, se ha observado un incremento significativo en el número total de focos, destacando especialmente el año 2024, en el que varios países europeos notificaron brotes de gran magnitud. Alemania concentró la mayor parte de los casos registrados a nivel mundial, seguida de Italia, España, Suiza y Francia. En Oriente Medio, la situación endémica manifiesta la circulación constante del virus en países como Israel y Arabia Saudí, mientras que en la parte norte de África se sucedieron focos esporádicos. En el hemisferio sur, así como en América y el resto de Asia, los casos fueron aislados.

2.1. SITUACIÓN EN MARRUECOS


Marruecos ha sido considerado un país endémico para la lengua azul desde su primera detección en 2004. La enfermedad, transmitida por *Culicoides* spp., ha estado asociada principalmente a los serotipos 1 y 4, responsables de varios brotes entre 2004 y 2007 que afectaron a numerosas provincias. Desde entonces, el virus ha mantenido una circulación intermitente en el territorio, favorecida por las condiciones climáticas y ecológicas del país, que permiten la persistencia de los vectores.

En la siguiente tabla se resume el número de focos y el número de animales afectados comunicados por Marruecos desde el año 2021:

AÑO	Nº focos	Nº animales afectados
2021	65	413
2022	41	331
2023	121	503
2024	14	126
2025 (hasta septiembre)	226	1.342
TOTAL	467	2.715


Resumen focos LA Marruecos años 2021-2025 (hasta septiembre 2025) (fuente: ONSSA)

A continuación, se representa la distribución mensual de los focos de LA declarados por Marruecos en los años 2021-2025 (hasta septiembre 2025):




Evolución mensual focos LA Marruecos años 2021-2025
(hasta septiembre 2025) (fuente: ONSSA)


En los siguientes mapas se muestran las provincias de Marruecos donde han sido declarados focos de LA en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 respectivamente.




Mapa focos LA Marruecos año 2021 (fuente: ONSSA)




Mapa focos LA Marruecos año 2022 (fuente: ONSSA)



Mapa focos LA Marruecos año 2023 (fuente: ONSSA)



Mapa focos LA Marruecos año 2024 (fuente: ONSSA)



Mapa focos LA Marruecos año 2025 (fuente: ONNSA)



2.2. SITUACIÓN EN TÚNEZ

En la siguiente tabla se resume el número de focos y el número de animales afectados comunicados a la OMSA por Túnez entre los años 2020 y 2022:

AÑO	Nº total focos	Nº focos por serotipo		
		Bovinos	Ovinos	Caprinos
2020	352	218	757	-
2021	54	45	95	-
2022	16	11	23	-
TOTAL	422	274	875	0

Resumen focos LA Marruecos años 2020-2022 (fuente: OMSA y ONSSA)

Desde comienzos de 2023 Túnez no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de LA en su territorio, si bien, de acuerdo con la información que Túnez suministra en las reuniones de la Red Mediterránea de Sanidad Animal (REMESA), la enfermedad se mantiene endémica en el país, con una especial incidencia del serotipo 4.

3. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN EUROPA

En Europa, la distribución de la enfermedad ha variado sustancialmente en las últimas décadas. Históricamente, la cuenca mediterránea concentraba la mayor parte de los casos, con circulación confirmada de los serotipos 1, 2, 4, 9, 10 y 16, todos ellos asociados a introducciones desde el norte de África y a condiciones climáticas favorables para los vectores en el sur del continente.

En agosto de 2006 se notificó en los Países Bajos el primer brote del serotipo 8, constituyendo la aparición más septentrional registrada hasta entonces. A partir de ese episodio, el virus se extendió por Europa central y septentrional, afectando a países donde hasta el momento no se consideraba una enfermedad endémica. Estos brotes compartían una serie de características epidemiológicas relevantes: su alta latitud, la presencia de signos clínicos en bovinos (hasta entonces infrecuentes en brotes mediterráneos) y la capacidad de supervivencia invernal del vector, que permitió la persistencia del virus entre temporadas.

Posteriormente, en septiembre de 2018, se detectó por primera vez en Europa el serotipo 3 en Cerdeña (Italia), en animales centinela, con un linaje genéticamente muy similar a las cepas de Túnez de 2016, lo que sugiere una introducción desde el norte de África. El escenario cambió en septiembre de 2023, cuando se notificó la presencia del serotipo 3 en los Países Bajos, en torno a Ámsterdam. En cuestión de semanas, el virus se diseminó por todo el país y, antes de finalizar el año, ya se había detectado en Bélgica, Alemania y el Reino Unido. A lo largo de 2024, se extendió hacia el sur y el este de Europa,




alcanzando Francia (5 de agosto de 2024), Portugal (24 de agosto) y España (30 de septiembre).

Paralelamente, una nueva cepa del serotipo 8 emergió en Francia en 2023, afectando a más de la mitad del territorio y propagándose hacia la Península Ibérica, Suiza y Cerdeña.


Durante 2025, la situación epidemiológica de la lengua azul en Europa ha seguido evolucionando, con una expansión sostenida del virus hacia el norte y el este del continente y la aparición de nuevos serotipos en regiones previamente indemnes. Este proceso evidencia que el virus de la lengua azul continúa adaptándose a diferentes ecosistemas europeos, impulsado por la movilidad de animales, las condiciones climáticas favorables y la amplia distribución de vectores competentes del género *Culicoides*.

En base a la información facilitada por la Plataforma ESA (Epidémiosurveillance Santé Animale) con fecha de 3 de octubre de 2025, estos son los serotipos detectados en cada uno de los países europeos hasta el momento.



Mapa serotipos lengua azul en Europa hasta 3 de octubre de 2025 (fuente: ESA)

En el siguiente mapa se muestra el estatus sanitario de los Estados Miembros o zonas de los mismos establecidos en la UE a fecha 18 de julio de 2025.



Estatus sanitario lengua azul en la UE (julio 2025)

Desde el 21 de abril de 2021, únicamente se deben comunicar a ADIS los focos de lengua azul que estén localizados en zona libre (los países sin estatus no realizan en principio notificaciones inmediatas). A continuación, se recoge el total de focos notificados desde 2021 en los diferentes países europeos, basándose en la información transmitida mediante los informes semestrales de la OMSA.

País	2021	2022	2023	2024	2025
Reino Unido	-	-	14	233	135
Croacia	1	-	-	4	127
Italia	3.323	322	421	5.827	83
Serbia	0	-	-	-	81
Eslovenia	-	-	-	-	62
Noruega	-	-	-	92	44




Grecia	11	3	23	110	42
Macedonia del Norte	-	-	-	1	32
Portugal	10	8	1	198	17
Checa (Rep.)	-	-	-	115	13
Bulgaria	2	-	-	-	7
Polonia	-	-	-	8	4
Hungría	-	-	-	-	4
Rumania	0	-	-	-	4
Liechtenstein	-	-	-	6	2
Montenegro	0	0	-	-	1
Alemania	1	-	25	15.816	-
Suiza	-	-	-	3.025	-
España	452	66	125	2.539	-
Dinamarca	-	-	-	891	-
Austria	-	-	-	288	-
Francia	204	186	1.841	235	-
Bélgica	2	-	1	14	-
Andorra	-	-	-	2	-
Luxemburgo	0	0	0	2	-
Países bajos	-	-	32	2	-
Suecia	-	-	-	0	-
Albania	-	0	-	-	-
Bosnia-Herzegovina	0	-	-	-	-
Total general	4.006	585	2.483	29.408	658

Tabla brotes de lengua azul informes semestrales 2021-2025 (fuente: WAHIS-OMSA)


3.1. FRANCIA

Desde el 1 de junio de 2025, Francia mantiene una situación endémica frente a la lengua azul, con circulación confirmada de tres serotipos: 3, 4 y 8. Estos serotipos se consideran enzooticos en el conjunto del territorio metropolitano, incluida Córcega.

Durante el periodo comprendido entre junio y octubre de 2025, se han notificado 6.523 focos del serotipo 3 y 3.020 focos del serotipo 8, lo que confirma una intensa actividad viral en buena parte del país. En cuanto al serotipo 4, entre el día 1 de junio y el 31 de mayo de 2025 fueron detectados 10 focos en la isla de Córcega. Desde el 1 de junio no se han registrado más casos en la isla.



Mapa focos S3 hasta 30/10/2025 (fuente: Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia)



Mapa focos S8 hasta 30/10/2025 (fuente: Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia)



Ante esta situación, el Estado francés ha puesto en marcha una campaña nacional de vacunación centrada en los serotipos más activos. Se han adquirido siete millones de dosis de vacuna frente al serotipo 8, destinadas principalmente al ganado ovino, y dosis adicionales frente al serotipo 1, orientadas a proteger los departamentos limítrofes con España ante un posible riesgo de introducción.

En materia de control sanitario, la consideración de la lengua azul como enfermedad enzootica implica un cambio de estrategia: los focos ya no conllevan restricciones de movimiento dentro del territorio nacional. Sin embargo, los intercambios con otros Estados miembros o países terceros siguen sujetos a las exigencias europeas en materia de vacunación, pruebas PCR o desinsectización, dependiendo del destino de los animales.

Toda la información procede del Ministerio francés de Agricultura, de la Agroalimentación y de la Soberanía Alimentaria, disponible en su página oficial sobre la *situation de la fièvre catarrhale ovine (FCO)*, que puede consultarse para acceder a las actualizaciones más recientes:

<https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fievre-catarrhale-ovine-fco-en-france>

3.2. PORTUGAL

Desde comienzos de 2025, Portugal mantiene una situación activa de lengua azul, con circulación confirmada de los serotipos 3, 4 y 8 en el territorio continental.

El serotipo 4 está presente de forma endémica desde 2004. Durante 2024 se notificaron varios focos esporádicos en los distritos de Beja, Évora y Portalegre, con circulación residual durante 2025.

El serotipo 3 fue identificado por primera vez el 13 de septiembre de 2024 en una explotación ovina del distrito de Évora. Desde entonces, se considera que todo el territorio continental está afectado por este serotipo, aunque su circulación durante 2025 se ha mantenido limitada y de baja intensidad, sin evidencias de expansión significativa.

El serotipo 8 se detectó por primera vez el 28 de noviembre de 2024 en una explotación bovina del distrito de Portalegre. A lo largo de 2025 se han confirmado nuevos focos en explotaciones ovinas de los municipios de Alcácer do Sal, Serpa, Moura, Vila Viçosa y Alcoutim.

En cuanto a las medidas sanitarias, se mantiene la vacunación obligatoria frente a los serotipos BTV-1 y BTV-4 para el ganado ovino reproductor, mientras que la vacunación frente a los serotipos 3 y 8 se recomienda en función del riesgo epidemiológico, con prioridad en los municipios afectados.



Las regiones autónomas de Madeira y Azores continúan reconocidas oficialmente como libres de lengua azul.

3.3. ITALIA


Desde comienzos de 2025, Italia mantiene una situación endémica frente a lengua azul, con circulación confirmada de los serotipos 1, 3, 4, 5 y 8. La enfermedad afecta tanto a la Italia continental como a las islas, especialmente Cerdeña, donde se concentra la mayor parte de los focos.

Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025, se han notificado 1.417 focos de lengua azul, de los cuales el serotipo 8 representa cerca del 80 % del total. Este serotipo se detectó por primera vez a finales de 2023, con los primeros focos confirmados en Cerdeña, y ha mostrado una fuerte expansión durante 2025, alcanzando su pico de actividad en julio, con 466 explotaciones afectadas, algunas de ellas con coinfecciones por los serotipos 3 y 4.

El serotipo 3 constituye el segundo serotipo más frecuente, con detecciones mayoritariamente en Cerdeña, aunque también se han registrado focos aislados en Lacio, Lombardía, Piamonte y Umbría. Este serotipo circula en la isla desde 2018, pero los análisis sugieren que en 2024 se habría introducido una nueva cepa de origen neerlandés, responsable de la mayor parte de las infecciones actuales.

El serotipo 4, presente de forma esporádica en varias regiones del continente, representa menos del 8 % de los casos registrados en 2025, mientras que el BTV-1 se detectó el 11 de agosto de 2025 en dos explotaciones ovinas de Campania.

El serotipo 5, por su parte, fue identificado por primera vez el 28 de agosto de 2025 en el sur de Cerdeña, confirmado en tres ovejas de un rebaño de más de 300 cabezas.




Mapa focos lengua azul Italia (hasta 30/10/2025) (fuente: IZS)

La información se basa en los datos publicados por el *Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario* del Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) de Italia, disponibles en su portal oficial: https://www.izs.it/BENV_NEW/datiemappe.html

3.4. PAÍSES BAJOS

No se ha notificado ningún caso de lengua azul en los Países Bajos durante 2025. En 2024, el país había confirmado 8.942 focos del serotipo 3 y 12 focos de serotipo 12 mediante RT-PCR, así como 2.116 sospechas clínicas no confirmadas por laboratorio.

En el siguiente mapa se muestran los focos reportados durante 2024 en este país.



Mapa focos LA en Países bajos en 2024 (fuente: NVWA)

La información se basa en los datos publicados por la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), disponibles en su página oficial sobre la situación de la lengua azul en los Países Bajos, que puede consultarse para acceder a las actualizaciones más recientes:

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/blauwtong/documenten/dier/dierziekten/blauwtong/publicaties/blauwtong-positief-2025>

3.5. REINO UNIDO

Durante el 1 de julio de 2025, el Reino Unido ha notificado 154 casos de lengua azul correspondientes principalmente al serotipo 3 y, en menor medida, al serotipo 8. Por distribución territorial:

- En Inglaterra, se han confirmado 141 casos, de los cuales 136 corresponden exclusivamente al serotipo 3, 1 caso al serotipo 8, y 4 casos con coinfección por los serotipos 3 y 8.
- En Gales, se han registrado 13 casos, todos del serotipo 3.
- En Escocia, no se han detectado casos hasta la fecha.


El serotipo 3 fue detectado por primera vez el 11 de noviembre de 2023. Durante 2024, se confirmaron 265 focos, localizados principalmente en Inglaterra. En 2025, el primer

foco del año se registró el 11 de julio, en el condado de Oxfordshire, tras la aparición de signos clínicos compatibles en un ovino. Posteriormente, se confirmaron dos casos en bovinos en Hertfordshire, identificados durante los controles previos al movimiento de animales.

Hasta el 29 de septiembre de 2025, se han notificado 80 focos del serotipo 3, la mayoría en la zona centro y sur de Inglaterra.

Respecto al serotipo 8, éste fue detectado por primera vez el 19 de septiembre de 2025, en un único ovino que presentaba signos clínicos leves: costras con pequeños sangrados en el hocico, secreción nasal, erosiones en el labio superior y cojera sin lesiones visibles. Los otros ocho ovinos del rebaño resultaron negativos a las pruebas de FCO.

En febrero de 2025, se confirmó un caso positivo al serotipo 12 del virus de la lengua azul en un bovino perteneciente a un grupo de 15 animales, en la región de Kent (Inglaterra). Este hallazgo constituye, hasta la fecha, el único foco detectado en el país por dicho serotipo.




Mapa focos lengua azul UK (hasta 30/10/2025) (fuente: APHA)

Toda la información procede del Gobierno del Reino Unido, disponible en su página oficial sobre la situación actual de la lengua azul, que puede consultarse para acceder a las actualizaciones más recientes: <https://www.gov.uk/guidance/bluetongue-latest-situation>

3.6. ALEMANIA

Alemania ha experimentado una reemergencia significativa de la lengua azul desde finales de 2023, asociada principalmente al serotipo 3 del virus (BTV-3). El primer foco fue detectado el 12 de octubre de 2023, y el virus se propagó rápidamente durante 2024, afectando a prácticamente todos los Länder del país.

Según datos del Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), desde mayo de 2024 se han notificado más de 15.000 focos de BTV-3 en el territorio alemán, lo que llevó a la pérdida del estatus de país libre de lengua azul. Durante 2025, hasta el 3 de octubre, se habían confirmado 1.925 focos, distribuidos por los 16 estados federados.



Mapa focos lengua azul Alemania 2025 (hasta 30/10/2025) (fuente: FLI-TSIS)

Ante la magnitud de la epizootia, las autoridades alemanas autorizaron, mediante orden de emergencia, el uso de vacunas inactivadas frente al serotipo 3 el 6 de junio de 2024, ampliando posteriormente su autorización de manera indefinida el 27 de noviembre de 2024. La vacunación se considera actualmente la única medida eficaz para proteger a los animales susceptibles frente a la enfermedad.




La información procede del Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), que publica regularmente datos sobre la *Bluetongue Disease* en Alemania:

<https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/bluetongue-disease/>

3.7. GRECIA

El serotipo 3 se ha detectado desde el 18 de septiembre de 2024. En total, se han identificado 37 focos, de los cuales tres corresponden a 2025 (fuente: WAHIS-OMSA, eventos 5927 y 6890).

Por otro lado, el serotipo 8 identificado por primera vez en Grecia el 2 de octubre de 2024, continúa activo bajo el evento ID 6605, con informes de seguimiento hasta el 21 de octubre de 2025. Hasta esa fecha, se han contabilizado 1.471 casos y 570 muertes en rumiantes domésticos (principalmente ovejas), distribuidos en múltiples regiones, incluidas Florina, Kilkis, Thessaloniki, Kavala, Ilia y Aitolioakarnania.



Mapa focos LA en Grecia hasta 3 de noviembre de 2025 (fuente: WAHIS-OMSA)



4. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA


La primera incursión de virus en España, desde los años cincuenta, fue en el año 2000 con la introducción del serotipo 2 en las Islas Baleares, que fue erradicado en el año 2002. Desde entonces se han detectado cuatro serotipos del virus en España:

- Serotipo 1 (S1): tuvo su origen en el norte de África y fue detectado por primera vez en España en julio de 2007.
- Serotipo 3 (S3): presente en el norte de África (Túnez) desde 2018, se detectó en Países Bajos en octubre de 2023 y por primera vez en España en octubre de 2024.
- Serotipo 4 (S4): procedente de África del Norte, fue detectado por primera vez en España en noviembre de 2003 en la isla de Menorca.
- Serotipo 8 (S8): tras su primera detección en Países Bajos en 2006, se extendió rápidamente por Europa y fue detectado en España en enero de 2008.

Durante la temporada 2022-2023, que incluye del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, se confirmaron en total 80 focos, todos ellos de serotipo 4 y localizados en la zona oeste de España. El 17 de febrero de 2023 se confirmó la circulación en el sur de Galicia, en zonas próximas a la frontera de Portugal, donde a finales de 2022 las autoridades de este país han detectado circulación del virus en cuatro explotaciones centinela muestreadas en el marco de la implementación del programa de vigilancia de lengua azul en España para el año 2022. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los focos por provincias:

CCAA	Provincia	Nº focos
ANDALUCÍA	CÁDIZ	9
	CÓRDOBA	4
	JAÉN	3
	MÁLAGA	5
	SEVILLA	1
CASTILLA LA MANCHA	TOLEDO	18
CASTILLA Y LEÓN	ÁVILA	3
	SALAMANCA	16
EXTREMADURA	BADAJOS	6
	CÁCERES	11
GALICIA	OURENSE	2
	PONTEVEDRA	2
Total		80

Focos LA temporada 2022-2023 (fuente: RASVE)



Mapa focos LA temporada 2022-2023 (fuente: RASVE)


En la temporada 2023-2024, que incluye del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, se confirmaron en total 125 focos de lengua azul afectando a 7 bovinos y 217 ovinos. De ellos, 4 fueron de serotipo 1 (2 en Cádiz y 2 en Málaga), otro foco en Cádiz fue de serotipos 1 y 4 y el resto de focos fueron de serotipo 4. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los focos por provincias:

CCAA	Provincia	Nº focos		
		Serotipo 1	Serotipo 4	Serotipo 1 y 4
ANDALUCÍA	ALMERÍA	-	2	-
	CÁDIZ	2	-	1
	CÓRDOBA	-	4	-
	GRANADA	-	1	-
	HUELVA	-	6	-
	JAÉN	-	4	-
	MÁLAGA	2	-	-
	SEVILLA	-	4	-
ASTURIAS	ASTURIAS	-	16	-
CANTABRIA	CANTABRIA	-	3	-
CASTILLA LA MANCHA	ALBACETE	-	7	-
	CIUDAD REAL	-	17	-
	CUENCA	-	2	-
	TOLEDO	-	6	-
CASTILLA Y LEÓN	ÁVILA	-	3	-
	SALAMANCA	-	2	-
EXTREMADURA	BADAJOS	-	6	-
	CÁCERES	-	10	-
GALICIA	A CORUÑA	-	7	-
MADRID	MADRID	-	3	-
MURCIA	MURCIA	-	16	-
VALENCIA	ALICANTE	-	1	-
Total general		4	120	1

Focos LA temporada 2023-2024 (fuente: RASVE)



En el siguiente mapa se muestra la localización de los focos comunicados en la temporada 2023-2024.




Mapa focos LA temporada 2023-2024 (fuente: RASVE)

Durante la temporada 2024-2025, fueron confirmados en total 2.113 focos de lengua azul con la siguiente distribución por provincias y serotipos:

CCAA	PROVINCIA	SERTIPOS												
		S1	S1-S3	S1-S3-S4	S1-S3-S8	S1-S4	S1-S4-S8	S1-S8	S3	S3-S4	S3-S8	S4	S4-S8	S8
ANDALUCÍA	ALMERÍA	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	CÁDIZ	9	1	3	-	1	-	-	9	1	-	4	-	-
	CÓRDOBA	2	1	-	-	1	-	-	11	-	-	1	1	-
	HUELVA	6	12	1	-	-	-	-	40	-	-	1	-	-
	JAÉN	4	-	1	-	2	1	2	2	-	-	1	-	6
	MÁLAGA	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
	SEVILLA	11	7	4	-	1	-	-	61	1	-	-	-	-
ARAGÓN	HUESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
ASTURIAS	ASTURIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
BALEARES	BALEARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
CANTABRIA	CANTABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
CASTILLA LA MANCHA	CIUDAD REAL	4	1	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	12
	TOLEDO	5	6	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-	18
CASTILLA Y LEÓN	ÁVILA	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	SALAMANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
CATALUÑA	BARCELONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
	GIRONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199
	LLEIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
EXTREMADURA	BADAJOS	172	184	-	7	3	-	6	162	-	5	1	-	3
	CÁCERES	190	117	1	7	2	-	-	135	4	1	7	-	1
MADRID	MADRID	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
MURCIA	MURCIA	-	4	-	2	-	-	1	3	-	1	-	-	-
NAVARRA	NAVARRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
PAÍS VASCO	BIZKAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	GIPUZKOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Focos LA temporada 2024-2025 (hasta 31 marzo 2025) (fuente: RASVE)

En el siguiente mapa se muestra la localización de los focos comunicados desde el comienzo de la temporada 2024-2025.



Mapa focos LA temporada 2024-2025 (hasta 31 marzo 2025) (fuente: RASVE)


En 2024 se dieron una serie de circunstancias excepcionales, entre ellas la circulación simultánea de cuatro serotipos diferentes del virus de la lengua azul por primera vez en España (serotipos 1, 3, 4 y 8), detectados en amplias zonas del territorio nacional.

Esta situación, junto con la complejidad logística que supone vacunar frente a tres o cuatro serotipos de forma simultánea, y la disponibilidad limitada de dosis vacunales frente a cada uno de ellos, dificultó la posibilidad de llevar a cabo una vacunación obligatoria eficaz en un periodo razonable antes del reinicio de la actividad del vector.

Por ello, fue necesario replantear la estrategia nacional de control y erradicación vigente hasta el momento. En la mayor parte del territorio peninsular, esta se ha sustituido por una estrategia de protección clínica, basada en la vacunación voluntaria de los animales susceptibles, eliminándose asimismo la obligación de vacunación previa para los animales que se mueven dentro de estas zonas. Las Islas Baleares, debido a su condición de insularidad, mantiene el programa de erradicación tal como se venía aplicando, y por su parte, las Islas Canarias continúan siendo reconocidas como territorio libre de lengua azul.




En este sentido, en marzo de 2025, fue publicada la Orden APA/229/2025, de 10 de marzo, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul y la Resolución de 12 de marzo de 2025, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, por la que se aplica la Orden APA/229/2025. Como resultado, se han establecido las zonas que se muestran en el siguiente mapa:



Mapa España zonas LA (marzo 2025)

En la temporada 2025-2026 se ha tomado la determinación de declarar únicamente el primer foco de cada provincia para cada uno de los serotipos que circulan en nuestro país. De esta forma, queda constituido el mapa de la siguiente forma:



Mapa serotipos por provincias LA temporada 2025-2026 (hasta 6 noviembre 2025) (fuente: RASVE)

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se destaca la importancia de reforzar las acciones de sensibilización en los sectores ganaderos afectados, con el objetivo de informar sobre la nueva estrategia nacional frente a la lengua azul. Se pretende así concienciar a los ganaderos sobre el riesgo real de infección en toda la España peninsular por cualquiera de los serotipos actualmente presentes (1, 3, 4 y 8), especialmente teniendo en cuenta que no existen restricciones a los movimientos de animales. Asimismo, se subraya la importancia de la vacunación frente a los serotipos circulantes como principal herramienta preventiva.

5. VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA



El programa nacional de vigilancia, control y erradicación de la Lengua Azul se basa en cuatro líneas de acción:

- Vigilancia activa serológica y virológica: se basa en la realización de un muestreo durante el período de actividad del vector en explotaciones centinelas de animales de las especies sensibles que permita detectar la evidencia de circulación vírica, diferenciándose dos zonas de vigilancia según estén consideradas o no de riesgo, lo que determina el número de muestras.
- Vigilancia pasiva clínica: se realiza de forma continua durante todo el año y se basa en la obligación tanto de los veterinarios como de los titulares de las explotaciones de comunicar las sospechas clínicas de LA que hayan podido detectar.
- Vigilancia entomológica: tiene como objetivo monitorizar la abundancia y la distribución de las poblaciones de los vectores de la LA, para lo que se dispone de estaciones permanentes de captura funcionando todo el año.

A través del siguiente enlace se puede acceder a la información completa del Plan de Vigilancia de Lengua Azul aplicado en España durante el año 2025:

<https://www.mapa.gob.es/es/dam/jcr:ea9528db-4661-4b5d-8801-5688035fcd78/Programa%20LA%202025%20actualizado%20julio%20.pdf>