

A photograph of a lush green landscape with several large, mature trees in the foreground and middle ground. A small pond or stream is visible in the distance. The sky is clear and blue. The text is overlaid on a semi-transparent green rectangular area.

# Conservación de la Biodiversidad, fauna cinegética y sanidad animal desde la perspectiva de WWF España

Madrid, (14/06/2018)

Luis Suárez, Responsable de  
especies de WWF España



# Biodiversidad en España

- En España hay unas 80.000 especies de plantas y animales.
- Un 24% de nuestro territorio es Red Natura 2000 y aportamos el 18% del total de la red
- Tenemos un alto nivel de endemismos (44% en islas)



# Un complejo equilibrio





# Presión histórica sobre predadores

- Existe una alta presión sobre determinadas especies de grandes depredadores que pueden ejercer un cierto control sobre ciertas especies o tener un efecto sanitario
- Lobo: Caza y controles (200) + furtivismo → 500-750
- Zorro: Caza > 200.000/año
- Venenos.






# El efecto del veneno en la fauna silvestre . El veneno en España 1992-2013. WWF – SEO (2016)



## Incidencia en la fauna silvestre en España


Animales envenenados por grupos (1992-2013)



De los **18.503** animales. Los más afectados aves rapaces : Buitres (4 especies ). Milanos (2 especies ) y Águilas (varias especies).



# Presión histórica sobre predadores





# Nuevo modelo de gestión cinegética



- Una parte importante de la superficie de España corresponde a cotos de caza cercados (altísimas densidades).
- Se importan desde otros países o se crían en granjas
- Se cercan y engordan artificialmente (cercones prevalencia es próxima al 100%)





# Cambios sociales



- Reducción del número cazadores
- Abandono zonas rurales
- Intensificación de ciertas prácticas agrarias y abandono de otras
- Nuevas prácticas ganaderas -> impacto sobre Biodiversidad



# Potenciar la biodiversidad

- Reducir la presión sobre grandes predadores y favorecer su expansión preferentemente hacia zonas con altas densidades de ungulados silvestres
- Impulsar medidas de prevención de ataques al ganado
- Potenciar y favorecer la presencia de carroñeros



# Potenciar la sostenibilidad actividad cinegética

Reducir cotos vallados, buscar la unión de varias acotados incrementado superficies de gestión

Prohibir la importación de animales de otros países, controlar y limitar sueltas

Prohibir cercones.

Reducir puntos de alimentación artificial y controlar la alimentación suplementaria especialmente para jabalí.

Cumplir planes cinegéticos y ajustar las densidades de especies a la capacidad de carga de cada medio

Incrementar la presión sobre las poblaciones de jabalí



# Potenciar practicas sostenibles en ganadería

- Adecuar cargas ganaderas a la capacidad de carga de cada territorio
- Favorecer y potenciar practicas sostenibles y ganaderías ecológicas.
- Apoyo a la ganadería extensiva
- Reducir interacciones con fauna salvaje (puntos de agua, comederos, etc)



**WWF**®

¡Muchas gracias!

- [www.wwf.es](http://www.wwf.es)
- [www.panda.org](http://www.panda.org)