

Influenza aviar: fortalecer la vigilancia y la preparación ante el aumento de los brotes notificados

OMSA Señal
Actualizaciones sobre cuestiones emergentes de sanidad animal

Desde principios de octubre de 2026 han aumentado los brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) tanto en aves de corral como en otras especies, incluidas las aves silvestres, a medida que comienza la nueva temporada de otoño e invierno en el hemisferio norte. La OMSA insta a sus Miembros a reforzar la vigilancia en todas las poblaciones animales, consolidar la bioseguridad y revisar su grado de preparación. Además de la vigilancia en aves de corral, la vigilancia en aves silvestres es esencial: puede proporcionar una señal temprana de un aumento de la circulación del virus y ayudar a alertar a los productores avícolas sobre los cambios en los niveles de riesgo. Los Informes de situación de la OMSA ofrecen información periódica para apoyar la conciencia situacional y la preparación. También se notifican detecciones de IAAP en diversas especies de mamíferos, incluido el ganado bovino, lo que subraya la importancia de mantener la vigilancia más allá de las aves de corral domésticas y las aves silvestres.

La información notificada a la OMSA a través del Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS) indica un aumento de los brotes de IAAP notificados desde principios de octubre de 2026, tanto en aves de corral como en otras especies. Entre el 2 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, siete países y territorios notificaron 16 nuevos brotes en aves de corral, que afectaron a unas 13 700 aves. En el mismo período, 17 países y territorios notificaron 70 nuevos brotes en otras especies, incluidas las aves silvestres. El aumento fue más marcado en las últimas tres semanas (del 16 de octubre al 5 de noviembre), que representan 13 de los 16 brotes en aves de corral y 49 de los 70 brotes en otras especies, principalmente en Europa. Estas observaciones ponen de relieve la necesidad de seguir la situación en distintas poblaciones animales y zonas geográficas. Por sí solas, no permiten concluir que exista un resurgimiento mundial ni indican cómo evolucionará la temporada actual.

No obstante, el aumento de las notificaciones refuerza la importancia de la detección temprana y de una acción oportuna. La situación epidemiológica puede diferir considerablemente entre regiones y sistemas de producción. Por ello, las estrategias de vigilancia deben reflejar las circunstancias nacionales y locales, incluidas la distribución y la densidad de las explotaciones avícolas, el contacto entre aves domésticas y silvestres, los patrones migratorios, las detecciones previas y la capacidad para detectar e investigar los casos sospechosos.

Perspectivas

La información histórica notificada a la OMSA durante los últimos 15 años muestra un patrón estacional recurrente de los brotes de IAAP: la actividad suele ser más baja en septiembre, comienza a aumentar en octubre y tradicionalmente alcanza su punto máximo en febrero. Este patrón ha estado influido en gran medida por las notificaciones procedentes del hemisferio norte y debe entenderse como una tendencia histórica. El momento y la intensidad de la transmisión varían entre años y regiones, y están influidos por varios factores, entre ellos la migración de las aves silvestres, los sistemas de producción, las prácticas de bioseguridad, los movimientos de animales, el estado inmunitario de las poblaciones susceptibles y las características del propio virus. A medida que aumenta la actividad estacional, será esencial seguir vigilando tanto las poblaciones de aves de corral como las de otras especies para comprender cómo evoluciona la situación epidemiológica. La vigilancia en aves silvestres tiene un papel particular en este contexto. La detección de IAAP en aves silvestres puede proporcionar una alerta temprana de la circulación del virus en el medioambiente, a veces antes de que se detecte la infección en explotaciones avícolas.

Cuando estos hallazgos se evalúan y comunican con rapidez, pueden ayudar a los Servicios veterinarios a informar a los productores avícolas sobre los cambios en el riesgo y a animarlos a reforzar la bioseguridad y adoptar medidas preventivas. La alerta temprana es más eficaz cuando se consideran conjuntamente los datos de los distintos sistemas de vigilancia. Los resultados de la vigilancia en aves silvestres, los informes procedentes de explotaciones avícolas, las investigaciones de mortalidades inusuales y la información pertinente sobre otros animales susceptibles pueden contribuir a una evaluación más completa del riesgo. El nivel de riesgo y la respuesta adecuada dependerán del contexto epidemiológico local.

Una estrecha colaboración entre las autoridades veterinarias y de salud pública es fundamental para garantizar que la información sobre la circulación del virus en los animales se comparta y evalúe de forma oportuna y coordinada. Un enfoque de vigilancia integrada, que combine la vigilancia de la salud animal y humana en el marco de One Health, puede favorecer la detección temprana de posibles eventos zoonóticos, fortalecer la evaluación del riesgo y orientar las medidas apropiadas para minimizar el riesgo de transmisión a las personas.

La OMSA publica periódicamente Informes de situación mundiales sobre la influenza aviar, que ofrecen información consolidada sobre los brotes notificados y la evolución de la situación epidemiológica en las poblaciones de aves de corral y de otras especies. Se alienta a los Miembros y a otras partes interesadas a consultar estos informes para seguir la evolución de la situación, apoyar la conciencia situacional y orientar las actividades de vigilancia y preparación.

La OMSA también apoya a sus Miembros mediante sus normas internacionales, su red de Centros colaboradores y de referencia, la red OFFLU y los sistemas mundiales de información sobre enfermedades. El intercambio oportuno y transparente de información, incluso a través de WAHIS, sigue siendo esencial para fortalecer la alerta temprana, respaldar la toma de decisiones informada y facilitar una acción coordinada.

Recomendaciones para los Miembros de la OMSA

- fortalecer la vigilancia basada en el riesgo y la detección temprana de la IAAP en aves de corral, aves silvestres, mamíferos y otras poblaciones animales pertinentes, e investigar las infecciones sospechosas, en particular en las zonas de alto riesgo;
- mantener y, cuando proceda, reforzar la vigilancia en aves silvestres, incluida la investigación de enfermedades o mortalidades inusuales, y utilizar los resultados para fundamentar las evaluaciones del riesgo y proporcionar información oportuna sobre el riesgo a los productores avícolas;
- reforzar la bioseguridad a nivel de explotación, incluidas las medidas para impedir el contacto entre aves de corral y aves silvestres, controlar el acceso de personas, vehículos y equipos, y aplicar prácticas eficaces de higiene, limpieza y desinfección;
- asegurar que los granjeros, los trabajadores avícolas, los actores vinculados a la fauna silvestre y otros grupos pertinentes sepan reconocer y notificar con prontitud los casos sospechosos o las enfermedades y mortalidades inusuales a los Servicios veterinarios;
- mantener la capacidad de los Servicios veterinarios y de los laboratorios de diagnóstico para investigar los brotes sospechosos, tomar y analizar muestras, y aplicar medidas de respuesta oportunas y proporcionadas;
- notificar las detecciones de IAAP a través de WAHIS, de conformidad con los requisitos internacionales de notificación de la OMSA, y revisar los planes nacionales de preparación y respuesta, incluidos los mecanismos de coordinación entre los Servicios veterinarios, las autoridades de salud pública, las autoridades de fauna silvestre, los productores y otras partes interesadas pertinentes.

World Organisation for Animal Health
Organisation mondiale de la santé animale
Organización Mundial de Sanidad Animal

OMSA Señal
Actualizaciones sobre cuestiones emergentes de sanidad animal