

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA

20.11.2026

ÍNDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN.....3
2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA..3
3. SITUACIÓN EN EUROPA DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA ...5
4. SITUACIÓN EN ESPAÑA DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA..10
5. MEDIDAS Y ACTUACIONES APLICADAS 16

1. INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a rumiantes domésticos y silvestres. Es causada por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHEV), un Orbivirus de la familia Reoviridae, estrechamente relacionado con el virus de la lengua azul. La enfermedad es transmitida por la picadura de mosquitos del género Culicoides.

En el ganado vacuno puede producir clínica leve o moderada (fiebre, lesiones en mucosa bucal, cojeras por inflamación del rodete coronario, inflamación de la lengua, diarrea hemorrágica, abortos), pudiendo ser más grave en determinadas edades (animales mayores de 2 años de edad), razas (Limousine, Blonde d'Aquitaine y sus cruces industriales) y sistemas de producción (extensivo). El ganado ovino es susceptible a la infección, pero no presentan ninguna sintomatología, y el caprino es poco susceptible a la infección.

En fauna silvestre afecta en particular a los ciervos, si bien también se han detectado grandes diferencias en la clínica y mortalidad entre diferentes zonas. Entre los signos clínicos observados con mayor frecuencia en los cérvidos, se encuentran la pérdida del instinto de huida, incoordinación, cojeras, dificultad respiratoria, dificultad para la ingestión de alimentos, edema o eritema en diferentes zonas de la cabeza y sialorrea.

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica está incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se encuentra clasificada como enfermedad de categoría D+E según el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, lo que implica que deben adoptarse medidas para evitar su propagación y establecer una vigilancia.

Para más información sobre la enfermedad se puede consultar el siguiente enlace:

Enfermedad hemorrágica epizoótica (mapa.gob.es)

2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA

La enfermedad hemorrágica epizoótica ha sido típicamente asociada a regiones templadas y subtropicales, donde los mosquitos del género *Culicoides* facilitan su transmisión. Sin embargo, en los últimos años, el virus ha experimentado una expansión geográfica. Zonas que antes no eran habitables para estos insectos ahora cuentan con temperaturas más altas y mayor humedad, lo que favorece su proliferación y contribuye a la propagación de la EHE hacia nuevas áreas.

Los brotes de la enfermedad suelen coincidir con un aumento en la actividad del vector durante periodos de altas temperaturas y lluvias, mientras que la remisión se produce con la primera helada o la llegada de condiciones de frío intenso.

A continuación, se muestran los datos de distribución mundial obtenidos a partir de la OMSA de aquellos países que reportaron la enfermedad como presente en sus informes semestrales de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

AÑO	PAÍSES
2021	Argelia, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Guadalupe, Guyana Francesa, Israel, Mayotte, Reunión, Timor-Leste, Túnez
2022	Argelia, Australia, España, Estados Unidos de América, Guadalupe, Guyana Francesa, Italia, Mayotte, Reunión, Timor-Leste, Túnez
2023	Australia, España, Estados Unidos de América, Francia, Guadalupe, Italia, Mauricio, Mayotte, Portugal, Timor-Leste, Túnez
2024	Andorra, Australia, Brasil, España, Estados Unidos de América, Francia, Guadalupe, Italia, Mauricio, Mayotte, Portugal, Timor-Leste
2025	Andorra, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Guadalupe, Portugal, Timor-Leste

Tabla 1. Países con enfermedad presente (Fuente: OMSA)

2.1 SITUACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

En los Estados Unidos, los brotes de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) han sido recurrentes desde su primera aparición en 1955, especialmente en las poblaciones de ciervos de cola blanca, con un predominio de los serotipos EHEV-1 y EHEV-2. Sin embargo, la situación ha experimentado un cambio importante en los últimos años, con una expansión hacia el norte. Un brote severo en el Hudson Valley (Nueva York) en 2020 provocó la muerte estimada de 1.500 ciervos y marcó el inicio de detecciones anuales recurrentes en la región.

En 2024, el New York State Department of Environmental Conservation confirmó nuevos casos en el condado de Orange, una región situada considerablemente más al norte de lo habitual para esta enfermedad. Los programas de vigilancia entomológica llevados a cabo entre 2023 y 2024 identificaron varias especies de *Culicoides*, aunque sin documentar de forma concluyente una presencia amplia del principal vector competente, *C. sonorensis*.

En 2025, la EHE continúa activa en el medio-oeste y el noreste de EE. UU., con casos confirmados en ciervos silvestres de varios condados de Michigan y detecciones compatibles en estados como Ohio, Maryland y Virginia. Los reportes recientes parecen señalar una variedad geográfica amplia**,** lo que implica el refuerzo de la vigilancia para esta enfermedad.

Durante el verano y el otoño de 2026, se ha registrado una temporada de EHE inusualmente extensa en el Medio Oeste superior y las Grandes Llanuras del norte. Los focos han afectado principalmente a poblaciones silvestres de ciervo de cola blanca, aunque también se han confirmado casos puntuales en ciervos en cautiverio y en ganado bovino.

2.2 SITUACIÓN NORTE DE ÁFRICA

En el norte de África, la situación de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) ha mostrado un incremento en los últimos años, especialmente con la aparición de nuevos brotes que han afectado tanto a ciervos como al ganado.

En 2020, varios brotes fueron originados por el serotipo EHEV-6, mientras que, en 2021, el serotipo EHEV-8 causó una serie de brotes importantes en ganado bovino en Túnez. Este fue un evento significativo, ya que representó la primera circulación del serotipo EHEV-8 en la región desde 1982, cuando se aisló por primera vez en Australia. La circulación del virus en el norte de África ha sido un factor importante en la expansión de la EHE hacia otras regiones.

3. SITUACIÓN EN EUROPA DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA

El 8 de noviembre de 2022, se detectaron los primeros casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en Europa, específicamente en bovinos de las islas de Cerdeña y Sicilia, en Italia. Pocos días después, el 17 de noviembre se notificó el primer caso en España, concretamente en la provincia de Sevilla.

Así pues, en la temporada comprendida entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, se contabilizaron un total de 22 focos en Europa, todos pertenecientes al serotipo 8 del virus, 11 en Italia repartidos entre las islas de Sicilia y Cerdeña y 11 en España, dentro de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. En el siguiente mapa se muestra la localización exacta de estos focos.



Mapa 1. Focos EHE Temporada 2022-2023 (ADIS)

No obstante, fue en la temporada 2023-2024 (entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024) cuando la enfermedad experimentó una rápida propagación hacia el norte y el oeste de Europa. A partir de junio de 2023, comenzaron a notificarse focos en el sur de España que avanzaron rápidamente hacia el norte del país afectando mayoritariamente a bovinos y algunos cérvidos.

Portugal notificó su primer caso en el distrito de Beja. Desde esta región, al igual que ocurrió en España, la enfermedad continuó su expansión hacia el norte, afectando finalmente a 11 de los 18 distritos del país. En total, se registraron 97 focos en Portugal, con bovinos y cérvidos como principales especies afectadas.

En septiembre de 2023, se confirmó el primer caso en Francia, concretamente en la región de Nueva Aquitania. Posteriormente, los focos se extendieron a las regiones de Occitania, Países del Loira y Bretaña, alcanzando un total de 225 focos en el país, que afectaron exclusivamente a bovinos.

Por su parte, Italia notificó dos focos en gamos dentro de la isla de Cerdeña durante esta temporada.

En el siguiente mapa, se recogen la totalidad de focos acontecidos en Europa en la temporada 2023-2024.



Mapa 2. Focos EHE Temporada 2023-2024 (ADIS)

En lo correspondiente a la temporada 2024-2025, desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, fueron comunicados a través de ADIS un total de 249 focos en Europa: 183 notificaciones corresponden a España, 47 a Portugal, 18 a Francia y una a Andorra.

Estos datos apuntan a un descenso de casos respecto a la temporada anterior, con una circulación focalizada en áreas donde el virus no había estado presente o había circulado con escasa intensidad el año previo.

A continuación, se presenta el mapa que recoge los focos notificados en Europa durante la temporada 2024-2025.



Mapa 3. Focos EHE Temporada 2024-2025 (ADIS)

En marzo de 2026 se publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/501 de la Comisión, de 5 de marzo de 2026, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002 en lo que respecta a la notificación a la Unión de enfermedades de la lista, las regiones de los Estados miembros a efectos de notificación y envío de informes, y las solicitudes de reconocimiento del estatus de libre de enfermedad. Desde entonces únicamente se comunica a través de ADIS el primer foco de cada serotipo de cada región.

En la temporada 2025-2026, y desde el comienzo de la temporada 2026-2027 hasta la fecha, se han registrado un número bajo de notificaciones de EHE en Europa.

Entre junio de 2025 y junio de 2026 se registraron 5 focos de EHE en Francia y desde entonces no ha sido comunicado ningún nuevo foco en su territorio.



Mapa 4. Focos EHE Temporada 2025 Francia

En el caso de Portugal, en 2025 se notificaron 2 focos y desde entonces no ha sido comunicado ningún nuevo foco en su territorio.



Mapa 5. Focos EHE Temporada 2025 Portugal

Hasta noviembre de 2026, cuando se detectó por primera vez la presencia del serotipo 7 en Europa, el responsable de todos los casos detectados en Europa desde su introducción en 2022 era el serotipo 8. Su origen más probable se sitúa en Túnez, dado que los primeros aislados europeos mostraban una elevada similitud con los detectados en ese país en 2021.

4. SITUACIÓN EN ESPAÑA DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA

La enfermedad se confirmó por primera vez en España el 17 de noviembre de 2022, cuando el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete determinó mediante PCR la presencia del virus en muestras de vacas con clínica compatible, procedentes de explotaciones de las provincias de Cádiz y Sevilla.

Dado el gran número de explotaciones afectadas, tras las primeras notificaciones se decidió tomar como criterio la comunicación únicamente del primer foco acontecido por comarca ganadera. De esta forma, en la temporada comprendida entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, se contabilizaron un total de 7 comarcas afectadas pertenecientes a las provincias de Sevilla (2), Cádiz (2), Huelva (1), Málaga (1) y Badajoz (1).



Mapa 6. Focos EHE Temporada 2022-2023 (RASVE)

La temporada 2023-2024 comenzó con la confirmación, a finales de junio, de los primeros casos detectados en tres ciervos en la comarca de Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) en Sevilla. Pocos días después, se confirmó otro brote en una explotación bovina en la comarca de Aracena (Sierra Oriental), en Huelva. Tras estos primeros casos, se detectaron nuevas sospechas clínicas en explotaciones bovinas en las provincias de Cádiz, el norte de Huelva, Sevilla, Córdoba, y el sur de Badajoz y Ciudad Real. Estos casos fueron objeto de investigación para confirmar la propagación de la enfermedad, que continuó su extensión hacia el norte durante todo el resto de la temporada.

De esta manera, en la temporada 2023-2024 se contabilizaron un total de 263 comarcas afectadas tal y como se muestra en el siguiente mapa y en la tabla que recoge las comarcas con focos por Comunidad Autónoma.



Mapa 7. Focos EHE Temporada 2023-2024 (RASVE)

CCAA	PROVINCIA	Nº FOCOS
Andalucía	CÁDIZ	4
	CÓRDOBA	6
	GRANADA	4
	HUELVA	7
	JAÉN	7
	MÁLAGA	2
	SEVILLA	9
Aragón	HUESCA	7
	TERUEL	3
	ZARAGOZA	2
Cantabria	CANTABRIA	12
Castilla - La Mancha	ALBACETE	5
	CIUDAD REAL	8
	CUENCA	3
	GUADALAJARA	4
	TOLEDO	7
Castilla y León	ÁVILA	13
	BURGOS	12
	LEÓN	5
	PALENCIA	1
	SALAMANCA	12

	SEGOVIA	8
	SORIA	6
	VALLADOLID	5
	ZAMORA	10
Cataluña	GIRONA	1
	LLEIDA	6
Comunidad de Madrid	MADRID	9
Navarra	NAVARRA	8
Comunitat Valenciana	CASTELLÓN	4
	VALENCIA	3
Extremadura	BADAJOZ	8
	CÁCERES	7
Galicia	A CORUÑA	11
	LUGO	9
	OURENSE	7
	PONTEVEDRA	2
La Rioja	LA RIOJA	7
País Vasco	ARABA/ÁLAVA	1
	BIZKAIA	1
	GIPUZKOA	1
Principado de Asturias	ASTURIAS	14
Región de Murcia	MURCIA	2

Tabla 2. Nº comarcas afectadas por provincia

El 30 de mayo de 2024 se confirmó el primer caso de serotipo 8 del virus de la EHE desde el inicio del periodo de actividad vectorial 2024-2025, localizado en la comarca de Cogolludo, en la provincia de Guadalajara. Esta comarca ya había estado entre las afectadas en la España peninsular desde la introducción del virus en el país a finales de 2022.

Durante la temporada 2024-2025 se notificaron en total 187 comarcas afectadas por EHE (Mapa 7) que se corresponden con 28 provincias (Tabla 39. Principalmente se ha detectado circulación en el centro y norte del país, afectando en mayor medida a comarcas en las que no hubo circulación anterior o circuló con menor intensidad durante la temporada pasada.



Mapa 8. Focos EHE Temporada 2024-2025 (RASVE)

CCAA	PROVINCIA	Nº FOCOS
Aragón	HUESCA	2
	TERUEL	1
	ZARAGOZA	1
Cantabria	CANTABRIA	12
Castilla - La Mancha	GUADALAJARA	3
Castilla y León	ÁVILA	3
	BURGOS	13
	LEÓN	15
	PALENCIA	8
	SALAMANCA	6
	SEGOVIA	6
	SORIA	6
	VALLADOLID	2
	ZAMORA	7
Cataluña	BARCELONA	6
	GIRONA	7
	LLEIDA	5
Comunidad de Madrid	MADRID	4
Navarra	NAVARRA	7
Galicia	A CORUÑA	11

	LUGO	14
	OURENSE	14
	PONTEVEDRA	7
La Rioja	LA RIOJA	7
País Vasco	ARABA/ÁLAVA	1
	BIZKAIA	1
	GIPUZKOA	1
Principado de Asturias	ASTURIAS	17

Tabla 3. Nº comarcas afectadas por provincia

En la temporada 2025-2026 no se notificó ningún foco de la enfermedad en nuestro país.

Respecto a la actual temporada 2026-2027, el 5 de noviembre han sido confirmados 3 focos del serotipo 7 explotaciones de bovino localizadas en las provincias de Cádiz, Ciudad Real y Badajoz, siendo la primera vez que se detecta dicho serotipo en España y en la Unión Europea.



Mapa 9. Focos EHE Temporada 2026-2027 (RASVE)

Hasta la fecha, únicamente las Islas Baleares y Canarias tienen la consideración de territorio libre de EHE en nuestro país.

5. MEDIDAS Y ACTUACIONES APLICADAS

- Recomendación de desinsectación de los animales y las explotaciones de la zona afectada.
- Movimientos intracomunitarios según el Reglamento 688/2020
- A nivel nacional está permitido el movimiento interno de animales no sintomáticos, previa desinsectación de animales y vehículos.
- Se ha realizado un seguimiento de las explotaciones afectadas para evaluar el impacto de la enfermedad.
- Se ha realizado en colaboración con el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete y las comunidades autónomas, muestreos seriados en determinadas explotaciones de bovino, ovino y caprino en las zonas afectadas para aumentar el grado de conocimiento sobre el impacto de la enfermedad a nivel de rebaño a lo largo del tiempo.
- Se ha realizado un estudio de vigilancia serológica al finalizar la temporada 2023, para evaluar la prevalencia entre explotaciones y dentro de ellas.
- Se han realizado ensayos en animalario de infección experimental en ovino en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Desde agosto de 2024 se encuentran disponibles **dos vacunas autorizadas eficaces frente al serotipo 8 circulante**, como herramienta de ayuda al control de la enfermedad, que pueden ser administrada de forma voluntaria por los ganaderos previa prescripción o receta de sus veterinarios, con el objetivo de prevenir la clínica, reducir la mortalidad, así como para flexibilizar los movimientos a zonas libres en la Unión Europea. Sin embargo, **estas vacunas no son eficaces frente al serotipo 7** de la enfermedad.