



**ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA
LENGUA AZUL**

22.10.2026



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA LENGUA AZUL	3
2.1. SITUACIÓN EN MARRUECOS.....	7
2.2. SITUACIÓN EN TÚNEZ	10
3. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN EUROPA	10
3.1. FRANCIA.....	12
3.2. PORTUGAL.....	14
3.3. ITALIA	15
3.4. PAÍSES BAJOS.....	17
3.5. REINO UNIDO	18
3.6. ALEMANIA	19
3.7. GRECIA.....	20
4. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA.....	21
5. VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA	24



1. INTRODUCCIÓN

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes (principalmente ovinos, pero también bovinos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos, wapitíes y camélidos), y es transmitida por los insectos, en particular, por la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo Culicoides.

El virus causante de la lengua azul es identificado como miembro de la familia Reoviridae. Se han identificado 27 serotipos distintos, y la capacidad de cada cepa para provocar la enfermedad varía considerablemente.

La gravedad de la enfermedad varía según las diferentes especies, con síntomas más graves en los ovinos que causan la muerte, pérdida de peso, problemas respiratorios o reproductivos. Algunas cepas pueden causar también síntomas clínicos en bovino. En los ovinos altamente susceptibles, la morbilidad puede alcanzar hasta el 100%. La mortalidad media es de entre 2% y 30% pero puede alcanzar el 70%. En los bovinos la tasa de infección es con frecuencia más alta que en los ovinos y la presencia y gravedad de los signos clínicos varían según la cepa vírica.

Esta enfermedad se encuentra incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), y como enfermedad de categoría D+ E (enfermedad objeto de vigilancia sobre la que deben adoptarse medidas para evitar su propagación en relación con su introducción en la Unión o con desplazamientos entre Estados Miembros), tras la modificación del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882, relativo a la categorización de la infección por el virus de la lengua azul (serotipos 1-24) como una enfermedad de la lista recogida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/169 de la Comisión, de 26 de enero de 2026.

Para más información sobre la enfermedad se puede consultar el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx

2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA LENGUA AZUL

La lengua azul tiene una distribución global importante en regiones donde el insecto vector (los mosquitos de la especie Culicoides) está presente, lo cual incluye a regiones de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y varias islas de los trópicos y subtrópicos. El virus se mantiene en áreas donde el clima favorece la supervivencia de los mosquitos al invierno.

En general, los ovinos de las áreas donde la enfermedad es endémica tienen una resistencia natural a la lengua azul. Los focos aparecen cuando se introducen ovinos



susceptibles, en particular, las razas europeas, en las áreas endémicas, o cuando el virus es introducido en una región en particular por el desplazamiento en el aire de *Culicoides* infectados. El episodio de la enfermedad generalmente coincide con un incremento de la actividad del vector durante los periodos de temperatura alta y lluvias, y una remisión con la primera helada o condiciones de frío intenso.

En base a los datos obtenidos de la OMSA, y de las últimas referencias bibliográficas disponibles, se resume cuáles han sido los serotipos detectados en los últimos años, y las especies de vectores responsables de la transmisión.

África

África, particularmente la región subsahariana, constituye un área de elevada diversidad y circulación endémica del virus de la lengua azul (BTV). En Sudáfrica se ha documentado una amplia diversidad de serotipos, y en distintas regiones del continente se han identificado numerosos serotipos, incluidos BTV-1, BTV-2, BTV-3, BTV-4 y BTV-8, entre otros.

La elevada diversidad refleja la circulación endémica de múltiples cepas y la coexistencia de varios *Culicoides* vectores competentes, especialmente *C. imicola* y *C. bolitinos* (Coetzee et al., 2012).

América

En América, la distribución del BTV presenta diferencias importantes entre Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Según el departamento de Agricultura de Estados Unidos, se han establecido diversos serotipos, entre ellos BTV-3, BTV-6, BTV-10, BTV-11, BTV-12, BTV-13 y BTV-17. En Centroamérica, el Caribe y Sudamérica se han descrito también diversos serotipos, con patrones distintos según países.

Entre los principales vectores del virus de la lengua azul en América destacan *Culicoides sonorensis*, asociado principalmente a la transmisión en amplias zonas de América del Norte, y *C. insignis*, considerado un vector relevante en América Central, América del Sur y la cuenca del Caribe (MacLachlan et al., 2013).

Asia

El continente asiático presenta una amplia variedad de serotipos: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 y 15, lo que indica una circulación heterogénea del virus. Estos serotipos se han descrito en países como India, China y el sudeste asiático, donde actúan especies como *Culicoides actoni*, *Culicoides brevitarsis*, *Culicoides sonorensis*, *Culicoides fulvithorax*, *Culicoides imicola* (or *Culicoides minutus*), *Culicoides oxystoma*, and *Culicoides peregrinus* (Haque et al., 2025).



Europa

Europa presenta una situación epidemiológica dinámica de la lengua azul, caracterizada por la circulación de varios serotipos y por la expansión de la enfermedad hacia regiones septentrionales y centrales del continente. Entre los serotipos notificados se encuentran BTV-1, BTV-3, BTV-4, BTV-5, BTV-6, BTV-8, BTV-12 y BTV-16, aunque su distribución geográfica y relevancia epidemiológica varían según el país y el periodo considerado.

La transmisión está condicionada por la distribución, abundancia y competencia vectorial de diferentes especies de *Culicoides*. En Europa intervienen especies del complejo *C. obsoletus* y otras especies adaptadas a condiciones templadas, mientras que *C. imicola* tiene especial relevancia en regiones mediterráneas.

Oceanía

En Oceanía, según datos del gobierno australiano, se han detectado al menos 13 serotipos en el país desde 1958, entre ellos BTV-1, BTV-2, BTV-3, BTV-4, BTV-5, BTV-7, BTV-9, BTV-12, BTV-15, BTV-16, BTV-20, BTV-21 y BTV-23.

La transmisión se produciría principalmente por *Culicoides brevitarsis*, especie endémica del norte de Australia y Papúa Nueva Guinea.

Oriente Medio

Los serotipos 1 y 4 son los predominantes en esta región, asociados a la circulación regional entre el norte de África, la península arábiga y Asia occidental. Los vectores más comunes son *C. imicola* y *C. schultzei* (Hassanpour, A. et al., 2019).

A partir de los datos de la OMSA correspondientes al periodo 2023-2026, se observa un incremento del número de focos de lengua azul notificados, especialmente durante 2024, año en el que varios países europeos registraron un elevado número de focos. La siguiente tabla recoge la distribución de los focos notificados por país durante el periodo analizado.

PAÍS	2023	2024	2025	2026
Alemania	25	15.816	3.332	19
Andorra	-	2	-	-
Arabia Saudí	260	442	488	-
Australia	2	37	-	-
Austria	-	288	2.371	-
Bélgica	1	14	16	-



Bosnia-Herzegovina	-	-	32	-
Botsuana	-	-	1	-
Brasil	1	6	3	-
Bulgaria	-	-	17	-
Checa (Rep.)	-	115	228	-
Chipre	2	14	2	5
Croacia	-	4	802	-
Dinamarca	-	891	138	-
Ecuador	31	25	32	-
Eslovaquia	-	-	-	1
Eslovenia	-	-	152	-
España	125	2.539	259	-
Francia	1.841	0	13.737	-
Grecia	23	110	188	6
Hungría	-	-	18	1
India	2	31	13	-
Iraq	2	-	-	-
Irlanda	-	-	-	47
Israel	160	89	73	-
Italia	421	5.827	0	3
Japón	-	6	-	-
Lesoto	1	24	7	-
Libia	-	26	-	-
Liechtenstein	-	6	3	-
Lituania	-	-	10	5
Luxemburgo	-	2	0	-
Macedonia del Norte	-	1	39	-
Madagascar	0	10	11	-
Marruecos	21	15	276	8
Montenegro	-	-	158	-
Namibia	-	-	4	-
Noruega	-	92	44	-
Países bajos	32	2	-	-
Palestina	8	5	-	-
Perú	1	1	-	-
Polonia	-	8	80	6
Portugal	1	198	590	2
Reino Unido	14	232	363	510
Rumania	-	-	56	3



Serbia	-	-	134	1
Sudáfrica	37	27	-	-
Suiza	-	3.025	3.679	516
Túnez	51	29	15	-
Total general	3.062	29.959	27.371	1.133

Nº focos datos cuantitativos por países entre 2023-2026 (fuente : WAHIS-OMSA)

2.1. SITUACIÓN EN MARRUECOS

Marruecos ha sido considerado un país endémico para la lengua azul desde su primera detección en 2004. La enfermedad, transmitida por *Culicoides* spp., ha estado asociada principalmente a los serotipos 1 y 4, responsables de varios brotes entre 2004 y 2007 que afectaron a numerosas provincias. Desde entonces, el virus ha mantenido una circulación intermitente en el territorio, favorecida por las condiciones climáticas y ecológicas del país, que permiten la persistencia de los vectores.

En la siguiente tabla se resume el número de focos y el número de animales afectados comunicados por Marruecos desde el año 2023:

AÑO	Nº focos	Nº animales afectados
2023	121	503
2024	14	126
2025	276	1.559
2026 (hasta agosto)	46	343
TOTAL	498	2.862


Resumen focos LA Marruecos años 2023-2026 (hasta agosto 2026) (fuente: ONSSA)

A continuación, se representa la distribución mensual de los focos de LA declarados por Marruecos en los años 2023-2026 (hasta agosto 2026):




Evolución mensual focos LA Marruecos años 2022-2025 (hasta agosto 2026) (fuente: ONSSA)


En los siguientes mapas se muestran las provincias de Marruecos donde han sido declarados focos de LA en 2023, 2024, 2025 y 2026 respectivamente.




Mapa focos LA Marruecos año 2023 (fuente: ONSSA)



Mapa focos LA Marruecos año 2024 (fuente: ONSSA)



Mapa focos LA Marruecos año 2025 (fuente: ONNSA)



Mapa focos LA Marruecos año 2026 (fuente: ONSSA)

2.2. SITUACIÓN EN TÚNEZ

En la siguiente tabla se resume el número de focos y el número de animales afectados comunicados a la OMSA por Túnez entre los años 2023 y 2025:

Año	Serotipo 2	Serotipo 4	Serotipo 5	Serotipo 8	No identificado	Total general
2023	-	51	-	-	-	51
2024	12	4	-	-	13	29
2025	-	-	11	4	-	15

Nº focos presentes en Túnez (fuente: WAHIS-OMSA)

A fecha de elaboración del presente informe, no constan nuevas notificaciones de focos de lengua azul correspondientes a 2026. Sin embargo, la enfermedad presenta un carácter endémico en el país, por lo que la ausencia de nuevas notificaciones no implica necesariamente la ausencia de circulación viral.

3. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN EUROPA

En Europa, la distribución de la enfermedad ha variado sustancialmente en las últimas décadas. Históricamente, la cuenca mediterránea concentraba la mayor parte de los casos, con circulación confirmada de los serotipos 1, 2, 4, 9, 10 y 16, todos ellos



asociados a introducciones desde el norte de África y a condiciones climáticas favorables para los vectores en el sur del continente.

En agosto de 2006 se notificó en los Países Bajos el primer brote del serotipo 8, constituyendo la aparición más septentrional registrada hasta entonces. A partir de ese episodio, el virus se extendió por Europa central y septentrional, afectando a países donde hasta el momento no se consideraba una enfermedad endémica. Estos brotes compartían una serie de características epidemiológicas relevantes: su alta latitud, la presencia de signos clínicos en bovinos (hasta entonces infrecuentes en brotes mediterráneos) y la capacidad de supervivencia invernal del vector, que permitió la persistencia del virus entre temporadas.


Posteriormente, en septiembre de 2018, se detectó por primera vez en Europa el serotipo 3 en Cerdeña (Italia), en animales centinela, con un linaje genéticamente muy similar a las cepas de Túnez de 2016, lo que sugiere una introducción desde el norte de África. El escenario cambió en septiembre de 2023, cuando se notificó la presencia del serotipo 3 en los Países Bajos, en torno a Ámsterdam. En cuestión de semanas, el virus se diseminó por todo el país y, antes de finalizar el año, ya se había detectado en Bélgica, Alemania y el Reino Unido. A lo largo de 2024, se extendió hacia el sur y el este de Europa, alcanzando Francia (5 de agosto de 2024), Portugal (24 de agosto) y España (30 de septiembre).

Paralelamente, una nueva cepa del serotipo 8 emergió en Francia en 2023, afectando a más de la mitad del territorio y propagándose hacia la Península Ibérica, Suiza y Cerdeña.

Durante 2025 y 2026, la situación epidemiológica de la lengua azul en Europa ha seguido evolucionando, con una expansión sostenida del virus hacia el norte y el este del continente y la aparición de nuevos serotipos en regiones previamente indemnes. Este proceso evidencia que el virus de la lengua azul continúa adaptándose a diferentes ecosistemas europeos, impulsado por la movilidad de animales, las condiciones climáticas favorables y la amplia distribución de vectores competentes del género *Culicoides*.

En este contexto, desde el 1 de noviembre de 2026, se recategoriza como enfermedad de categoría D+E en la normativa de la Unión Europea. Como consecuencia, dejan de ser aplicables las disposiciones específicas relativas al reconocimiento del estatus sanitario de ausencia de enfermedad y a los programas de erradicación voluntaria para esta infección.

A partir de la información disponible en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el siguiente mapa muestra la distribución de los distintos serotipos detectados en los países europeos entre 2023 y 2026.




Mapa serotipos lengua azul circulantes en Europa entre 2023 y 2026 (fuente: OMSA)

3.1. FRANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2024 y el 1 de junio de 2025, se notificaron 10.813 focos de BTV-3 y 17.038 focos de BTV-8. Posteriormente, entre el 1 de junio de 2025 y el 1 de junio de 2026, se registraron 7.606 focos de BTV-3 y 3.342 de BTV-8, lo que refleja una reducción del número de focos notificados de ambos serotipos respecto al periodo anterior.

Según la información publicada por el Ministerio de Agricultura francés, a fecha de 15 de octubre de 2026, la situación epidemiológica de la lengua azul en Francia está marcada por la circulación del serotipo 3 (BTV-3), con 1.201 focos notificados desde el 1 de junio de 2026, principalmente en el suroeste del país. En el mismo periodo se ha registrado un foco del serotipo 8 (BTV-8).

En cuanto al serotipo 4 (BTV-4), no se ha aislado en la Francia metropolitana desde 2018 y no se han notificado focos en Córcega durante 2026, aunque en esta isla se registraron 14 focos clínicos entre junio y diciembre de 2025.



Mapa focos S3 y S8 hasta 22/10/2026 (fuente: Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia)



La información expuesta procede del Ministerio francés de Agricultura y Soberanía Alimentaria, disponible en su página oficial sobre la *situation de la fièvre catarrhale ovine (FCO)*, que puede consultarse para acceder a las actualizaciones más recientes:
<https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fievre-catarrhale-ovine-fco-en-france>


3.2. PORTUGAL

La situación epidemiológica de la lengua azul en Portugal continental durante 2026 está caracterizada principalmente por la circulación de los serotipos 3 (BTV-3) y 8 (BTV-8).

El serotipo 3 se detectó por primera vez en Portugal el 13 de septiembre de 2024, en una explotación del municipio de Évora. Desde entonces, se ha extendido por el territorio continental. Por su parte, el serotipo 8 se confirmó por primera vez el 28 de noviembre de 2024 en ganado bovino del municipio de Nisa.

Durante 2025 se registró una circulación importante de los serotipos 3 y 8, especialmente en ganado ovino. Según el programa oficial portugués de profilaxis vacunal para 2026-2027, durante ese año se contabilizaron 1.242 focos en ovinos, 17 en caprinos y 170 en bovinos.

En cuanto a la situación durante 2026, la actualización de la Dirección General de Alimentación y Veterinaria de Portugal (DGAV), de 15 de octubre, identifica circulación de BTV-3 y BTV-8 en distintos municipios del territorio continental. Entre las zonas con circulación notificada figuran los distritos de Beja, Castelo Branco y Évora, con detecciones de ambos serotipos en algunos municipios.



Acumulación focos Portugal 2026 (fuente : dgav)

Las regiones autónomas de Madeira y Azores continúan reconocidas oficialmente como libres de lengua azul.

La información expuesta procede de la Dirección General de Alimentación y Veterinaria, disponible en su página web oficial en la que puede consultarse las actualizaciones más recientes:

<https://www.dgav.pt/animais/conteudo/animais-de-producao/ovinos-e-caprinos/saude-animal/doencas-dos-ovinos-e-caprinos/lingua-azul-febre-catarral-ovina/>

3.3. ITALIA

Durante 2026, Italia continúa presentando una situación caracterizada por la circulación de varios serotipos y la detección de nuevas variantes.

En 2024, Italia registró una intensa circulación del serotipo 3 del virus de la lengua azul (BTV-3), que, seis años después de su primera detección en Cerdeña, provocó una importante onda epidémica en la isla, con más de 2.330 focos y 109.851 casos confirmados. La circulación del virus se extendió asimismo a otras tres regiones: Sicilia, Toscana y Trentino-Alto Adigio/Tirol del Sur. De forma simultánea, el serotipo 8 (BTV-8), detectado en




Cerdeña desde 2023, se propagó por toda la isla y por amplias zonas de la Italia continental, con un total de 3.847 focos y 131.946 casos confirmados durante 2024.

En 2025, el BTV-8 continuó expandiéndose hacia regiones que no se habían visto afectadas durante la onda epidémica del año anterior, registrándose 2.449 focos. Por el contrario, la circulación del BTV-3 fue más limitada, con 409 focos confirmados. Por su parte, la detección del serotipo 5 (BTV-5) en el sur de Cerdeña, en agosto de 2025, constituyó una nueva alerta epidemiológica. A diciembre de ese año, se habían confirmado 102 focos de este serotipo, concentrados principalmente en el sur de la isla. Asimismo, se detectó circulación residual de los serotipos 1 (BTV-1) y 4 (BTV-4) en varias regiones italianas (Plebani G, Palombieri A, Sghaier S, Gatta G, Ben Hassine T, Curini V, et al. Evolutionary Dynamics of Bluetongue virus serotypes 3, 4, and 8 circulating in Italy, 2024–2025. Veterinaria Italiana).

Durante 2026, los datos disponibles muestran una amplia distribución territorial y una actividad especialmente relevante en Cerdeña. En el periodo analizado se han contabilizado 338 notificaciones, de las cuales 118 corresponden al serotipo 8 (BTV-8), 90 al serotipo 3 (BTV-3), 65 al serotipo 4 (BTV-4) y 2 al serotipo 5 (BTV-5).

La principal novedad notificada en octubre de 2026 es la detección del serotipo 12 (BTV-12) en dos explotaciones de la provincia de Oristano, en Cerdeña. El virus se identificó en tres animales centinela, un ovino y dos bovinos que no presentaban signos clínicos en el momento de la toma de muestras. Esta detección amplía el conjunto de serotipos identificados en Italia y pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia para determinar la extensión territorial de su circulación.



Mapa focos lengua azul Italia (hasta 21/10/2026) (fuente: IZS)




La información se basa en los datos publicados por el *Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario* del Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) de Italia, disponibles en su portal oficial: https://www.izs.it/BENV_NEW/datiemappe.html

3.4. PAÍSES BAJOS

En 2024, el país había confirmado 8.942 focos del serotipo 3 y 12 focos de serotipo 12 mediante RT-PCR, así como 2.116 sospechas clínicas no confirmadas por laboratorio.

En el siguiente mapa se muestran los focos reportados durante 2024 en este país.



Mapa focos LA en Países bajos en 2024 (fuente: NVWA)

Durante 2025 y 2026 no se detectaron nuevas infecciones por el virus de la lengua azul (BTV) en los Países Bajos, ni por el serotipo 3 (BTV-3) ni por el serotipo 12 (BTV-12).

La información se basa en los datos publicados por la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), disponibles en su página oficial sobre la situación de la lengua azul en los Países Bajos, que puede consultarse para acceder a las actualizaciones más recientes:

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dier/dierziekten/blauwtong/uitleg>



3.5. REINO UNIDO

Durante la temporada epidemiológica 2025-2026, comprendida entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, se notificaron 348 casos de lengua azul en Gran Bretaña, principalmente asociados al serotipo 3 (BTV-3), aunque también se detectó el serotipo 8 (BTV-8). Adicionalmente, se confirmaron cinco casos de BTV-3 en Irlanda del Norte.


La situación epidemiológica ha experimentado un cambio significativo durante la temporada actual. Según la última actualización de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal del Reino Unido (APHA), publicada el 20 de octubre de 2026, se han contabilizado 3.426 explotaciones afectadas por BTV-3 o por el virus de serotipo no determinado, con datos hasta el 19 de octubre de 2026.

La distribución territorial es la siguiente:

- Inglaterra: 2.884 explotaciones afectadas.
- Gales: 491 explotaciones afectadas.
- Escocia: 51 explotaciones afectadas.
- Irlanda del Norte: no se han notificado casos durante esta temporada.

Hasta la fecha de actualización, no se han registrado casos de BTV-8 durante la temporada 2026-2027. La mayoría de las detecciones se han producido tras la notificación de signos clínicos sospechosos, aunque también se han identificado infecciones mediante pruebas previas al movimiento y otras actuaciones de vigilancia.

La distribución geográfica de los focos muestra una importante concentración en el suroeste de Inglaterra, particularmente en Devon y Cornwall, aunque también se han registrado casos en otras zonas de Inglaterra, Gales y Escocia. Ante esta evolución, se han establecido zonas restringidas en Inglaterra, Gales y Escocia, con condiciones específicas para el movimiento de animales y productos reproductivos.



Mapa focos lengua azul UK (hasta 21/10/2026) (fuente: APHA)

Toda la información procede del Gobierno del Reino Unido, disponible en su página oficial sobre la situación actual de la lengua azul, que puede consultarse para acceder a las actualizaciones más recientes: <https://www.gov.uk/guidance/bluetongue-latest-situation>


3.6. ALEMANIA

Alemania ha experimentado una reemergencia significativa de la lengua azul desde finales de 2023, asociada principalmente al serotipo 3 del virus (BTV-3). El primer foco fue detectado el 12 de octubre de 2023, y el virus se propagó rápidamente durante 2024, afectando a prácticamente todos los Länder del país.

Desde octubre de 2025 se han detectado también infecciones por el serotipo 8 (BTV-8), con circulación de dos variantes genéticamente diferentes. La variante BTV8-FRA2015 se ha identificado en Renania-Palatinado, Baden-Württemberg y Renania del Norte-Westfalia y suele producir síntomas ausentes o leves. Por su parte, la variante BTV8-FRA2023, introducida desde el sur de Europa, ha sido confirmada en Baden-Württemberg, Baviera, Hesse, Renania-Palatinado, Sajonia y Sarre. Esta última se ha asociado a cuadros

clínicos compatibles con la enfermedad y podría provocar manifestaciones importantes, especialmente en ovinos y bovinos.

El FLI considera posible que BTV8-FRA2023 continúe extendiéndose hacia el norte. Los datos de la OMSA muestran notificación de focos hasta mayo de 2026 con un total de 44 focos notificados.



Mapa focos S8 en Alemania desde octubre 2025 a octubre 2026 (fuente: WAHIS)

El Instituto recomienda la vacunación frente a BTV-8, dado que las vacunas autorizadas son eficaces frente a ambas variantes, y señala que puede administrarse simultáneamente la vacuna frente a BTV-3.

La información procede del Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), que publica regularmente datos sobre la *Bluetongue Disease* en Alemania:
<https://www.fli.de/en/news/animal-disease-situation/bluetongue-disease/>


3.7. GRECIA

Según los informes de seguimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA/WAHIS) consultados, Grecia presenta una situación epidemiológica de lengua azul caracterizada por la detección de varios serotipos del virus de la lengua azul, concretamente los serotipos 3, 4 y 8, con eventos iniciados entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.



El serotipo 8 es el que presenta la mayor repercusión acumulada en los informes examinados. En el evento iniciado en julio de 2025 (ID 6605) se notificaron 3.499 casos y 1.708 muertes en el conjunto de las especies recogidas, con una afectación predominante del ganado ovino, que acumuló 3.232 casos y 1.621 muertes.

En cuanto al serotipo 3, el evento iniciado en agosto de 2025 (ID 6890) acumula 102 casos y 41 muertes, todos ellos notificados en ovinos. Por su parte, el serotipo 4, detectado en el evento iniciado en noviembre de 2025 (ID 7056), presenta una afectación considerablemente menor en los datos disponibles, con ocho casos en ovino-caprino.



Mapa focos LA en Grecia 2023-2026 (fuente: WAHIS-OMSA)


4. SITUACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA

La primera incursión de virus en España, desde los años cincuenta, fue en el año 2000 con la introducción del serotipo 2 en las Islas Baleares, que fue erradicado en el año 2002. Desde entonces se han detectado cuatro serotipos del virus en España:

- Serotipo 1 (S1): tuvo su origen en el norte de África y fue detectado por primera vez en España en julio de 2007.

- Serotipo 3 (S3): presente en el norte de África (Túnez) desde 2018, se detectó en Países Bajos en octubre de 2023 y por primera vez en España en octubre de 2024.
- Serotipo 4 (S4): detectado por primera vez en territorio peninsular en octubre 2004 y, tras su erradicación, nuevamente se detectó en octubre de 2010. En las Islas Baleares reaparece en julio de 2021 y se declara erradicado en 2023.
- Serotipo 8 (S8): tras su primera detección en Países Bajos en 2006, se extendió rápidamente por Europa y fue detectado en España en enero de 2008 y erradicado en enero 2013, nuevamente detectado en octubre de 2020 y erradicado a finales de 2022. Se ha detectado de nuevo desde junio de 2024.

Durante la temporada 2024-2025, comprendida entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, se confirmaron un total de 2.113 focos de lengua azul, cuya distribución por provincias y serotipos se recoge en el siguiente mapa:




Mapa focos LA temporada 2024-2025 (hasta 31 marzo 2025) (fuente: RASVE)

Durante 2024, por primera vez en España, se constató la circulación simultánea de cuatro serotipos del virus de la lengua azul (1, 3, 4 y 8), detectados en amplias zonas del territorio nacional. Debido a la elevada actividad epidemiológica en el territorio peninsular junto con la dificultad para mantener las medidas presentes hasta entonces, se hizo

necesario replantear un cambio de estrategia pasando del control y erradicación a una estrategia de protección a nivel de la península basada en la vigilancia y en la vacunación voluntaria de los animales sensibles frente a los serotipos circulantes, manteniéndose las Islas Canarias como zona libre y las Islas Baleares como zona sometida a un programa de control y erradicación,

Asimismo y en este contexto, al inicio de la temporada 2025-2026, se estableció el criterio de notificar únicamente la primera detección de cada serotipo en cada provincia durante la temporada epidemiológica.

Desde el punto de vista epidemiológico, la temporada 2025-2026 se caracterizó por la expansión territorial de los serotipos 3 y 8, así como por la detección del serotipo 1 en las provincias de Cáceres y Ciudad Real y del serotipo 4 en Badajoz. Por el contrario, no se registraron notificaciones en las provincias de Palencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y Girona, ni en las islas Canarias.




Mapa serotipos por provincias LA temporada 2025-2026 (fuente: RASVE)

En la temporada 2026-2027 se mantiene este criterio de notificación, de acuerdo además con el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/501, por el que se modifica el

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002, que hace necesaria que esta notificación se realice a nivel de la Unión Europea.

A fecha de 22 de octubre de 2026, el mapa refleja la distribución territorial de las primeras detecciones notificadas durante la temporada en curso. En comparación con la temporada anterior, se observa un menor número de notificaciones, junto con la identificación de serotipos en provincias en las que no se habían registrado previamente. Entre estas nuevas detecciones destacan el serotipo 3 en el País Vasco, el serotipo 1 en Toledo y el serotipo 4 en Córdoba.



Mapa serotipos por provincias LA temporada 2026-2027 (fuente: RASVE)

5. VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA LENGUA AZUL EN ESPAÑA

El programa nacional actual de vigilancia, control y erradicación de la Lengua Azul se basa en tres líneas de acción:

- Vigilancia activa serológica y virológica: Esta vigilancia actualmente solo se mantiene en las Islas Canarias y las Islas Baleares. Se basa en la realización de un muestreo durante el período de actividad del vector en explotaciones



centinelas de animales de las especies sensibles que permita detectar la evidencia de circulación vírica.

- Vigilancia pasiva clínica: se realiza de forma continua durante todo el año y se basa en la obligación tanto de los veterinarios como de los titulares de las explotaciones de comunicar las sospechas clínicas de LA que hayan podido detectar.
- Vigilancia entomológica: tiene como objetivo monitorizar la abundancia y la distribución de las poblaciones de los vectores de la LA, para lo que se dispone de estaciones permanentes de captura funcionando todo el año.

A través del siguiente enlace se puede acceder a la información completa del Plan de Vigilancia de Lengua Azul aplicado en España durante el año 2026:

[Programa nacional de vigilancia de Lengua Azul y de la Enfermedad Hemorrágica Epizootica en España 2026](#)