


ALMEJA RUBIA

VNR

Venerupis rhomboides (Pennant, 1777)



Nombres **FAO**: **es** almeja rubia
fr palourde rose
en banded



Talla (mm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (mm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	25 (I, G)	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 60 mm

Caracteres más significativos

Caparazón sólido, equivalvo, equilateral, de forma ovalada, con el lado anterior más corto que el posterior. El tamaño más común oscila entre 35 y 45 mm. La superficie externa es tan lisa y brillante que parece que está pulida a pesar de que está cubierta por líneas de crecimiento concéntricas poco marcadas. Ligamento externo. Carece de lúnula. Umbo orientado hacia delante.

Especies con caracteres semejantes:


Ruditapes decussatus (almeja fina)
Ruditapes philippinarum (almeja japonesa)
Venerupis pullastra (almeja babosa)
Callista chione (almejón)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	almeja chocha, chocha
Galicia	ameixa beada, ameixa rosada, ameixa rubia, ameixa vermella
Murcia	chocha
País Vasco	txirla zerrendaduna


Descripción General

Superficie externa de color amarillo pálido o crema tirando a rubio, que presenta en ocasiones manchas irregulares de color marrón-rojizo, rosa-violáceo e incluso negruzco. Superficie interna lisa, blanca y brillante, que presenta a menudo tintes rosáceos o anaranjados en el vértice.



Charnela robusta, heterodonta, con tres dientes cardinales en cada valva. El diente central de la valva izquierda, así como el central y posterior de la valva derecha son bifidos. Carece de dientes laterales. Seno paleal ovalado y profundo, aunque sin alcanzar el centro de las valvas. Sifones unidos a lo largo de toda su longitud.

Hábitat y comportamiento



Especie bentónica, que habita en la zona intermareal, a una profundidad máxima de 200 m, generalmente en fondos de arena limpia, donde se entierra unos 15-30 cm.

Cierra herméticamente sus valvas para aislarse del exterior, manteniendo en el interior la cantidad de agua necesaria para sobrevivir.

Tiene hábitos sedentarios y gregarios, aunque puede moverse reptando.

Se alimenta a través de sus sifones de las partículas alimenticias suspendidas en el agua, para lo que asoma ligeramente las dos valvas por encima del nivel del suelo.

Distribución




Se distribuye a lo largo del litoral atlántico europeo desde Noruega hasta el Mediterráneo, incluidas las islas Británicas.

Reproducción

Especie dioica con fecundación externa.

La hembra expulsa gran cantidad de huevos, que son fecundados en el agua. El desarrollo de éstos da lugar a las larvas, que son pelágicas durante 10-15 días, transcurridos los cuales descienden al fondo, se fijan al sustrato y comienzan a vivir enterradas.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Pesca artesanal, semiindustrial y ocasionalmente deportiva. Se realiza a lo largo de todas las costas españolas, generalmente mediante el empleo de dragas desde las embarcaciones, practicándose también el marisqueo a pie. Destacan las rías Bajas por ser el lugar en el que se llevan a cabo la mayor parte de las capturas; en la actualidad se utiliza un arte llamado *raño*, y antiguamente se empleaba otro llamado *can*, que ha sido prohibido. El periodo de máxima extracción tiene lugar entre marzo y mayo.

Comercialización

Especie muy apreciada comercialmente debido a la calidad de su carne. Se desembarca fresca y entera. Se puede encontrar en los mercados fresca, marinada o congelada.

