


PEZ DE SAN PEDRO

JOD

Zeus faber (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** pez de San Pedro
fr saint Pierre
en John dory



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (años)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-		
comercial	-	-	-	3-4	

LONGITUD MÁXIMA: 90 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo ovalado, muy alto y muy comprimido. Altura máxima menos de tres veces en la longitud total. La talla media es de 30 cm de longitud y no suele sobrepasar los 60 cm.

Lo que realmente caracteriza la librea de este extraño pez son las dos manchas oscuras presenta en cada flanco.

Cabeza muy grande con respecto al cuerpo, con un perfil convexo o recto encima de los ojos, que son grandes. Boca grande, oblicua y muy protráctil.

En la base de las aletas dorsal y anal se encuentran unas grandes placas óseas con espinas agudas, en número variable, de 29 a 40 y no necesariamente simétricas.

Línea media dorsal con una única aleta muy aparente, cuya parte delantera presenta 9-10 radios espinosos con unas extensiones filamentosas muy largas. El resto de radios, entre 22-24, son blandos y llegan hasta el pedúnculo caudal. Las aletas pectorales son cortas y redondeadas y las pélvicas, que están claramente separadas, son largas y grandes. Aleta anal formada por 3-5 espinas y 20-24 radios blandos que llega hasta el pedúnculo. Aleta caudal redondeada.

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	gallo, gallopedro
Asturias	cañada, pez cura, san Martín, san Pedro
Baleares	gall, gall de la mar, gall de san Pera, gall de san Pere, gall de sant Pere, gallo
Canarias	gallo Cristo, gallo de san Pedro, san Pedro
Cantabria	abeja, cañada, gallo barbero, san Martín, san Pedro
Cataluña	gall, gall de mar, gall de sant Pere, peix de san Pere, peix de sant Pere
Com. Valenciana	gall, gall marí, gallo, peix de san Pere
Galicia	cañada, martela, martiña, martiño, peixe de san martiño, peixe galo, peixe san martino, pez reloj, sanmartiño, samartiño, san Martín, san martiño, san mustiño, san pedriño
País Vasco	martina, martiña, muchu Martín, mutxo Martín, muxumartin, muxumartina, ollarra


Especies con caracteres semejantes:

Zeus capensis (pez de san Pedro del Cabo)

Orden: Zeiformes - Familia: Zeidae

Descripción General

Coloración del cuerpo gris verdoso, con algunas rayas longitudinales e irregulares de un color pardo con tonos dorados que pueden desaparecer cuando el pez está muerto. A cada lado del cuerpo, debajo de la línea lateral, destaca claramente una característica mancha oscura rodeada por un anillo de un color amarillo claro. La membrana interradial de las aletas pélvicas y de la anal es de color negro. La de la aleta dorsal es verde oscuro.




Las escamas son pequeñas, no están imbricadas y son difíciles de ver excepto las que se encuentran en la línea lateral, que es completa.

La boca está armada por dientes pequeños dispuestos en múltiples series, muy apretadas, en ambas maxilas y también en el vómer. Aberturas branquiales amplias.

Los radios inferiores de las aletas pectorales (2-3) son libres, no están unidos por una membrana, y con aspecto digitiforme. Los radios superiores tienen un aspecto normal.


Hábitat y comportamiento



Especie demersal que vive solitaria o en pequeños cardúmenes cerca de fondos fangosos o de praderas de *Posidonia oceanica*. Se encuentra en la plataforma a una cierta profundidad, hasta los 400 m, pero sobretodo entre los 50 y 200 m. En invierno pueden verse algunos ejemplares a poca profundidad en el Mediterráneo. El 75% de su dieta la constituyen sobre todo clupeidos y gádidos

con los que comparte hábitat. Una gran parte del resto de la dieta la cubren los cefalópodos y, más esporádicamente, los crustáceos.

Distribución



Especie de amplia distribución. Se encuentra en el Atlántico oriental, desde Noruega hasta Sudáfrica, incluido el Mediterráneo y el mar Negro.

También se halla presente en el Pacífico (Ja-

pón, Corea, Nueva Zelanda y Australia) y en el Índico.

Reproducción


Especie dioica. Adquiere la madurez sexual tarde, a los 3-4 años.

Se reproduce en los meses de verano, de junio a agosto en el Atlántico y más temprano en el Mediterráneo. La freza tiene lugar en fondos rocosos.

Los huevos y las larvas son pelágicos, se encuentran entre aguas sin ligarse a ningún sustrato.

Especie de crecimiento lento. No suele sobrepasar los 12 años de edad y como máximo puede llegar a pesar 8 kg.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura mediante palangre de fondo y arrastre; también con redes de enmalle (trasmallo).

Comercialización

Especie de carne muy apreciada pero relativamente poco conocida. Alcanza precios elevados.

Se desembarca principalmente fresco y entero. Una pequeña parte se desembarca fresco o congelado, sin cabeza.

