



JUREL REAL

HMV

Caranx rhonchus (Geoffroy St. Hilaire, 1817)



Nombres **FAO**: **es** macarela real
fr comète coussut
en false scad



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 60 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado y comprimido. Las tallas más comunes se sitúan alrededor de los 30-35 cm.

Rostro alargado. Párpados adiposos bien desarrollados. Boca oblicua y grande, armada por una hilera de dientes pequeños en ambas maxilas.

La línea lateral forma una amplia curva en forma de "S". Presenta escudetes sólo en la parte trasera de la línea lateral. Además, posee una línea lateral accesoria corta que termina justo antes de llegar a la altura de la primera dorsal.

Muestra una característica mancha negra que se sitúa en la parte anterior de la segunda dorsal y dos pínulas detrás de esta aleta dorsal y de la segunda anal.

Presenta dos aletas dorsales. La primera, triangular y más alta que la segunda, está formada por 8 espinas; el primer radio es corto. La segunda contiene una sola espina y 28-32 radios blandos. Las aletas pectorales son largas. Las pélvicas están formadas por 1 solo radio duro y 5 blandos. La primera aleta anal tiene 2 radios duros, de pequeño tamaño, y la segunda un único radio duro seguido de 26 radios blandos; su forma es similar a la de la segunda dorsal. Aleta caudal ahorquillada y pedúnculo caudal fino en relación con el cuerpo.

Especies con caracteres semejantes
Trachurus trachurus (jurel)


Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	chicharro, jurel, jurel dorado, jurela
Canarias	chicharro
Cataluña	sorella, sorella roncaire, surella
Com. Valenciana	sorella
Galicia	xurelo amarelo


Orden: Perciformes - Familia: Carangidae

Descripción General

Externamente, el jurel real se parece más a los jureles (*Trachurus* spp) que a muchos de sus congéneres (género *Caranx*). El dorso es gris o verde azulado y los flancos y el vientre más claros, con reflejos plateados. Presenta una mancha negra a lo largo del borde de los primeros radios de la segunda aleta dorsal y, como los jureles, también presenta una mancha negra por encima de la inserción de la aleta pectoral. La línea lateral está revestida por 30 escamas en la parte curva y por 21-23 escudetes en la zona recta.



Hábitat y comportamiento




Especie epipelágica y gregaria, que normalmente se encuentra a poca profundidad, entre 30 y 50 m, si bien ocasionalmente se puede encontrar hasta los 200 m. Los juveniles suelen observarse

nadando en grupos bajo la umbrela de las medusas, donde encuentran protección entre sus tentáculos urticantes, a la vez, aprovechan los restos de las presas ingeridas por las medusas o incluso filamentos y gónadas de las medusas.

Se alimenta de peces, crustáceos y algunos cefalópodos.

Distribución



Se encuentra en el Mediterráneo meridional y en el Atlántico oriental, desde Marruecos hasta Senegal.

Reproducción

Alcanza la madurez sexual en su segundo año de vida. Se reproduce en aguas templadas durante buena parte del año, con un pico muy marcado que se sitúa entre abril y junio. Forma bancos muy densos, cercanos a la costa, para reproducirse.

Las hembras ponen de 480-990 huevos.

Los ejemplares de más talla pueden alcanzar hasta 1 kg de peso.

Artes de Pesca

Se captura mediante artes de cerco, jáveas desde la costa y arrastre.

Comercialización

Especie de interés comercial.

Se comercializa junto con otras especies de la familia *Trachurus*, sobre todo en las costas del Sur y del Mediterráneo español. La forma más habitual de desembarco y comercialización es entero y fresco, pero también puede ser procesado a bordo y conservado en congelador.

