



# PARGO

## RPG

*Pagrus pagrus* (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** pargo  
**fr** red porgy  
**en** pagre rouge



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	<-H
mínima	15 (7)	18 (1),(7)	33 (7)	M	<-H
comercial	-	-	-	26,7	24

**UICN: EN**

**LONGITUD MÁXIMA: MED: 50cm ATL: 75cm**

### Caracteres más significativos

Cuerpo ovalado, alto y comprimido. Perfil dorsal convexo con una pequeña protuberancia sobre los ojos. Tamaño habitual 30-35 cm.

Cabeza relativamente grande. La dentición es característica de este género y está formada por 4 incisivos en la mandíbula superior y 6 en la inferior, seguidos por una hilera de caninos que antecede a dos bandas de molares, que a su vez precede a una multitud de diminutos dientes granulares.

Aleta caudal con 11-13 radios duros, y 9-10 radios blandos. Aleta anal con 3 radios duros y 7-8 blandos. Aletas pectorales grandes. Aletas torácicas con una espina y cinco radios blandos. Aleta caudal bifurcada.

### Especies con caracteres semejantes


- Pagrus auriga* (pargo sémola)
- Dentex gibbosus* (sama de pluma)
- Dentex maroccanus* (sama marroquí)
- Dentex canariensis* (chacarona de Canarias)
- Dentex dentex* (dentón)
- Pagrus caeruleostictus* (zapata)

### Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	bocinegro, cachucho, pagro
Asturias	maceta, machote, mazote, prao, rubial, rubiel, rutidas
Baleares	págara, pagra, pagre, pagro, paguera, pàguera
Canarias	bocinegro, lauriana
Cantabria	dentón, maceta, machote, mazote, ruda, rutida, rutidas, urta
Cataluña	pàgara, pagre, paguera, pàguera, palmireño, pargolí (juveniles), pargolí
Com. Valenciana	págara, pagre, palmireño
Galicia	abretán, abrota, bica, prago, pragueta, rutidas
País Vasco	abrota, gurbín, lamote, limote, momar, mutur motx, sabaya, txelba, txelba arrunt, txelba arrunta, urta

## Descripción General

El color del cuerpo es rosado, más oscuro en el dorso y más plateado en el vientre. Las escamas del dorso presentan una pequeña mancha amarilla que produce la impresión de un fino estriado amarillento. También posee unos puntos azules en la superficie dorsal, especialmente en los juveniles. En la cabeza se distingue una banda oscura que va de la nuca a la comisura de los labios y una franja amarillenta entre los ojos. Aletas rosadas. Aleta caudal rosa oscuro, con los dos lóbulos blanco-azulados. Mancha oscura desde la nuca hasta el extremo posterior de la boca. Mancha pequeña en la base de las pectorales.



Preopérculo desnudo. Línea lateral con 50-56 escamas.

## Hábitat y comportamiento



Especie típicamente demersal de distribución batimétrica relativamente amplia; puede encontrarse cerca de la superficie o a más de 250 m. En el Mediterráneo, los adultos suelen encontrarse en

fondos litorales, especialmente formando bancos muy numerosos cuando el coralígeno da paso a fondos arenosos o fangosos (30-60 m), mientras que los juveniles son más frecuentes en praderas de fanerógamas donde forman pequeños grupos.

El pargo es un pez carnívoro con especial predilección por los crustáceos, aunque también come otros invertebrados bentónicos (poliquetos, moluscos) y peces.

## Distribución



Se encuentra en el Atlántico este, desde las islas Británicas hasta Angola, incluidas las Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, el mar Mediterráneo y el mar Negro. También se encuentra en el Atlántico oeste, desde las costas de Estados Unidos (Cabo Hatteras) hasta Argentina.

Esta amplia distribución está actualmente en tela de juicio dado que los resultados de un análisis genético en ambos lados del Atlántico ha demostrado una notable distancia genética entre ambas poblaciones, lo que hace necesaria una profunda revisión de la especie.

## Reproducción


El pargo es una especie hermafrodita proterogónica. En general, la primera madurez sexual como hembra la alcanza a los 3 años de edad. A partir de ese momento ya empiezan a aparecer algunos machos funcionales pero algunos individuos no llegan a presentar la inversión sexual hasta los 6 años de edad.

La puesta varía con la latitud; requiere una temperatura del agua de 15 a 19°C. Así, en el Mediterráneo se produce en primavera, pero en las Canarias se inicia en el mes de enero.

El asentamiento de la especie se debe producir a poca profundidad y sus larvas son difíciles de distinguir de las de otros espáridos. Se han encontrado juveniles en los esteros litorales.

Mediante fecundación artificial se han obtenido híbridos de pargo macho con hembras de dorada (*Sparus aurata*).

## Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

## Artes de Pesca

Se captura con palangre y, más ocasionalmente, con trasmallo. Las grandes capturas se realizan al arrastre a pesar de que rara vez este arte pesca ejemplares grandes. Es una especie muy apreciada por los pescadores deportivos, que la capturan al volantín desde embarcación e incluso desde la costa mediante el lanzado (*surf-casting*). Aunque no es frecuente, también se captura en pesca submarina.

## Comercialización

De carne delicada, el pargo es tan valorado como la dorada aunque más raro en los mercados. Se vende principalmente en fresco, aunque también congelado.

Se desembarca principalmente entero y fresco, aunque una pequeña parte es procesada a bordo y se conserva congelada.

Actualmente se contempla la posibilidad de su cultivo. En este sentido, ya se ha logrado la reproducción en cautividad y se está investigando la posibilidad de criarlo en jaulas de forma parecida a la dorada.

