



TORDO NEGRO

WRM

Labrus merula (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** merlo
fr merle
en brown wrasse



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (años)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	←H
mínima	-	-	-	4	2
comercial	-	-	-		

LONGITUD MÁXIMA: 45 cm

Caracteres más significativos

Presenta un cuerpo alargado y levemente comprimido pero de aspecto robusto, sobre todo en los ejemplares adultos. Se trata de uno de los dos grandes lábridos mediterráneos y su talla habitual es 30-40 cm.

La cabeza es amplia y relativamente corta; la longitud cefálica es menor que la altura máxima del cuerpo. Posee una boca más bien pequeña, caracterizada por sus carnosos labios y la fuerte dentadura que presenta en ambas mandíbulas.

La coloración es muy variada, pero no existe dimorfismo sexual. La parte blanda

de la aleta dorsal es característicamente más larga que alta y las aletas impares están orladas de azul.

Aleta dorsal larga que llega hasta el pedúnculo caudal y que está compuesta por 13 radios espinosos como mínimo. Aleta anal formada por tres radios espinosos. Aleta caudal truncada.

Especies con caracteres semejantes

Labrus bergylta (maragota)


Labrus mixtus (gallano)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	bodión, tordo
Asturias	durδος, tena
Baleares	tord
Com. Valenciana	tordo
Galicia	cabras, martela, serrán, vello, xean

Descripción General

La coloración puede ser uniformemente verdosa, parda y pardo-rojiza, algo más clara en el vientre, y con o sin manchas claras. También puede presentar un aspecto jaspeado, con grandes manchas oscuras y claras sobre el color de fondo. Esta librea es visible cuando el pez se halla en descanso. En época de freza, los machos adquieren un bello color azulado, oscuro, uniforme y aterciopelado. Las aletas dorsal, pectorales, anal y caudal están ribeteadas de un azul eléctrico muy vivo. Los ejemplares jóvenes pueden presentar la librea verde con la franja longitudinal blanca que va del ojo al pedúnculo caudal, como en *L. bergylta* y *L. viridis*.



Posee más de 40 y menos de 50 escamas en la línea lateral, que es completa y sigue el perfil dorsal del cuerpo.

Posee labios carnosos formados por 6-9 pliegues. La boca está armada con fuertes dientes caninos en ambas mandíbulas, de 7 a 12 en la superior y de 8 a 14 en la inferior. Carece de dientes faríngeos.

Hábitat y comportamiento



Acostumbra a vivir a poca profundidad, aunque ocasionalmente puede alcanzar hasta los 50 m. Su hábitat ideal lo integran los fondos rocosos infralitorales, poblados de algas fotófilas, pero se aventura regularmente en la praderas de *Posidonia oceanica* (sobre todo si existen rocas en las cercanías).

En su medio, el tordo negro parece un pez plácido que se desplaza con calma y una cierta majestuosidad por el fondo en busca de alimento. Además es una especie confiada, lo que hace que sea muy escaso en fondos en los que se practica la pesca submarina. Es, por tanto, una de las mejores especies indicadoras de los efectos de la protección en las reservas marinas.

Es un pez carnívoro que se alimenta de crustáceos, moluscos y poliquetos; también es un buen depredador de equinodermos por lo que constituye una de las especies clave para mantener a raya las poblaciones de erizos en el sistema litoral.

Distribución



El tordo negro es un pez típicamente mediterráneo que se puede encontrar en el Atlántico inmediato: el sur de España y Portugal y el norte de Marruecos, hasta las Azores.

Reproducción

Como la mayoría de lábridos, el tordo negro es una especie hermafrodita proterogónica que alcanza la madurez sexual como hembra a los dos años, cuando mide entre 15 y 20 cm de longitud. La inversión sexual se produce a partir de los 4 años de edad. A pesar de que se creía que esta especie, como muchos otros lábridos, era nidificante y sus huevos eran demersales, la reproducción en cautividad ha demostrado que el tordo negro no nidifica y que los huevos que pone son pelágicos.

Se reproduce de febrero a mayo y los juveniles se pueden observar entre las algas durante el verano.

El tordo negro puede alcanzar hasta los 45 cm de longitud y 17 años de edad.

Artes de Pesca

Se captura mediante trasmallo y es una presa ocasional de los pescadores profesionales, al volantín o a fondo desde la costa. Los pescadores submarinos aprecian el gran tamaño que puede alcanzar.

Comercialización

Como la mayoría de lábridos, el tordo negro presenta un interés comercial muy limitado, a pesar de que su carne se sitúa entre las mejores de la familia.

Se desembarca y comercializa fresco y entero.

