



CONEJO PRP

Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832)



Nombres **FAO**: **es** escolar prometeo
fr escolier clair
en roudi escolar



Talla (cm)	Caladero			Edad de Maduración Sexual (años)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-		
comercial	-	-	-	<50	

LONGITUD MÁXIMA: 100 cm

Caracteres más significativos


Cuerpo moderadamente alargado, comprimido y fusiforme. Las tallas más frecuentes se sitúan entre 40 y 80 cm, con mayor presencia de hembras que de machos.

La cabeza es grande y la boca es amplia. La mandíbula inferior es algo más larga que la superior y ambas mandíbulas constan de unos dientes largos y agudos.

El dorso está provisto de dos aletas dorsales, la primera mucho más larga que la segunda y compuesta sólo por 18-20 radios duros; todos los radios de la segunda (17-20) son blandos. La aleta anal es casi simétrica a la segunda dorsal; está compuesta por 2-3 espinas y 15-17 radios blandos. Detrás de la aleta anal y de la segunda dorsal hay dos pínulas. La cola es grande y ahorquillada. Las aletas pélvicas están reducidas a una espina, que desaparece en los ejemplares mayores de 40 cm.

Descripción General


La coloración de esta especie es gris, a veces con tonos pardos. Las aletas son oscuras en los adultos y amarillentas en los jóvenes. Las cavidades bucal y branquial son negras.



El cuerpo está provisto de escamas en los ejemplares mayores de 20 cm de longitud.

Cavidad bucal y branquial son negras.

Hábitat y comportamiento



Especie bentopelágica, que se encuentra entre los 80-800 m de profundidad.


Se alimenta de peces, cefalópodos y crustáceos.

Es conejo es bentopelágico. Puede

vivir cerca del fondo pero posee una amplia distribución vertical, generalmente entre 100 y 750 m de profundidad. Vive a lo largo del talud continental, alrededor de las islas oceánicas y las montañas submarinas. Los machos suelen situarse entre los 600 y 800 m de profundidad, mientras que las hembras lo hacen entre 300 y 500 m. Esta separación suele desaparecer en la época de puesta.

Realiza migraciones diarias: durante la noche se aleja del fondo. Se trata de un cazador activo, potente nadador que suele perseguir a sus presas. Se alimenta de peces, cefalópodos y crustáceos.

Distribución



Es una especie que vive en la plataforma y el talud continental de los mares tropicales y templados de todo el mundo, aunque es raro encontrarla en el Pacífico oriental.

Reproducción

En los mares tropicales se reproduce a lo largo de casi todo el año, mientras que en las áreas templadas lo hace preferentemente en primavera y verano.

La primera madurez en esta especie se alcanza cuando los ejemplares miden algo menos de 50 cm de longitud. A los tres años de vida ya miden algo más de 40 cm; a los 10 años ya superan los 70 cm.

Artes de Pesca

No existe una pesca dirigida hacia esta especie. Suele capturarse con palangres en el talud de las islas Canarias y áreas adyacentes, donde es bastante abundante.

Comercialización

Se desembarca fresco o congelado, entero y eviscerado sin cabeza.

