

Países afectados o con mayor riesgo  
de Peste Porcina Africana

**Bélgica**  
**Polonia**  
**Rumanía**  
**Estonia**  
**Letonia**  
**Lituania**  
**Hungría**  
**Bulgaria**  
**República Checa**  
**Italia**  
**Moldavia**  
**Rusia**  
**Bielorrusia**  
**Alemania**  
**Austria**  
**Eslovaquia**  
**Países Bajos**  
**Luxemburgo**  
**Francia**



En colaboración con



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN



REAL  
FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA  
DE CAZA



PESTE PORCINA AFRICANA  
**¡MÁXIMA ALERTA!**

Proteja a nuestros animales,  
evite que la Peste Porcina  
Africana entre en España



## ¿Qué es la Peste Porcina Africana?

**Es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a jabalíes y cerdos domésticos causada por un virus de la familia Asfarviridae.**

**Hay cepas que pueden provocar cuadros agudos o híperagudos con niveles de mortalidad y morbilidad próximos al 100%.**

**Otras cepas cursan cuadros clínicos subagudos o incluso crónicos con menor mortalidad**

1



**Lave en profundidad ropa y calzado para eliminar cualquier resto de materia orgánica:**

- Lavado largo con agua entre 60° y 80° C, con detergentes para la ropa (o Nonidet P-40, desoxicolato o saponina)
- Cepille muy bien las botas, sobre todo las juntas y las ranuras de las suelas, con agua caliente y jabón

2

**Tras el lavado, desinfecte la ropa:**



- Con dióxido de cloro a 200 ppm
- Con ácido cítrico 0,2% (2 g/l)
- Entre 10 y 30 minutos

3

**Espere un mínimo de 72 horas para volver a utilizar la ropa y el calzado en el campo**



4

**Notificación de casos de mortalidad a normales a las autoridades veterinarias competentes**

5

**Trofeos**

**- Desinfección de trofeos:**

- Inmersión en agua hirviendo hasta eliminar toda materia que no sean huesos y dientes
- Remojo en solución de sosa comercial (carbonato sódico) al 4%, mantenida a un pH superior a 11,5 durante 48 horas
- Remojo en solución de ácido fórmico (100 kg sal y 12 kg de ácido fórmico por 1.000 litros de agua), a un pH inferior a 3,0. Al menos 48 horas
- Cueros crudos: salazón con sal marina con un 2% de sosa comercial al menos 28 días, o con formol al 1% durante una semana

**- Documentación:**

Certificado que garantice que los subproductos animales y productos derivados se manipulen de conformidad con el reglamento SANDACH

