Las primeras atenciones para el potro neonato

Ernesto Corbella

Con algunos sencillos "cuidados", pero no por ello menos importantes, podemos ayudar al potro a afrontar lo mejor posible su nueva vida.

Aunque el parto termine sin problemas, no han concluido todavía las tareas del ganadero. En efecto, pocas y sencillas atenciones, si se realizan con oportunidad, ponen al potro neonato en las mejores condiciones para afrontar sus primeros instantes de vida. Fundamentalmente hay que asegurarse que el potro absorba el calostro, porque solo de esta forma puede adquirir las propias defensas inmunitarias, dado que en la especie equina el tipo de placenta no permite el paso al feto durante la gestación de la inmunidad materna.

Entre las otras atenciones, que figuran en el cuadro 1, encontramos también la evaluación de los comportamientos neonatales. De este análisis es posible obedecer numerosas indicaciones sobre el estado de salud del potro y se pueden advertir los primeros síntomas de problemas, que si son afrontados a su debido tiempo pueden resolverse o al menos limitarlos.

Comportamientos neonatales normales son los indicados en el cuadro 2. Cualquier distanciamiento de éstos conlleva anormalidades y debe ser interpretado como el aviso de una situación de salud no óptima (cuadro 3). Pero también parámetros como peso al nacimiento, talla, morfología, color de pelo, cascos y datos fisiológicos (cuadros 4 y 5) contribuyen a crear un cuadro de normalidades dentro del cual debe situarse el potro para que el ganadero pueda estar tranquilo.

Cuadro 1 - Potro neonato: primeras atenciones.

1. Asegurarse que el potro absorbe el calostro.
2. Desinfectar con cuidado el cordón umbilical.
3. Suministrar suero antitetánico: 5.000 U.I. intramuscular (suero antitetánico equino ISM).
4. Suministrar suero contra la poliartritis (Serum Trivalent Equine R.M. o Fohlenlahame Serum Graub).
5. Eventual suministro de gammaglobulinas específicas (Equigamma).
6. Eventuales lavativas a base de aceite de vaselina (5-19 ml).
7. Evaluación de comportamientos neonatales.

Cuadro 2 - Comportamientos neonatales normales.

1. En la posición en decúbito: movimientos alternativos de las patas, movimiento de la cabeza, tono muscular precozmente perceptible. El potro reacciona muy pronto a los estímulos tactiles y a las diferentes situaciones ambientales.
2. Intentos de levantarse ya a los 10-20 minutos después del nacimiento. Intentos de equilibrarse apoyándose sobre las patas anteriores.
3. Rápido desarrollo de la coordinación de los movimientos.
4. Precoz orientación hacia la mama materna, con buen desarrollo de los reflejos de succión y de deglución.
5. Breve sueño o adormilamiento después de la primera mamada, a lo cual sigue una fase de movimiento en la nueva búsqueda de la mama.
6. Un potro normal - después de la fase de adaptación inicial - debe mamar de 40 a 60 veces/24 horas, pasa breves periodos de sueño o de adormilamiento alternados con actividades de movimiento, manifiesta tendencia al juego, defecación normal y orina frecuente. El vaciado de la mama es un reflejo de la normalidad del potro.

Cuadro 3 - Comportamientos neonatales anormales.

1. No se levanta 2 horas después del nacimiento.
2. No succiona la leche en las 3 horas que siguen al nacimiento.
3. Grave depresión del aparato sensorial.
4. Manifestaciones convulsivas.
5. Respiración de tipo abdominal.
6. Falta de orientación hacia la mama.

Cuadro 4 - Otros parámetros de un potro neonato normal.

Peso medio al nacimiento: varía en función de la raza, pero generalmente se mueve entre los 35-60 kg para las razas de silla y entre los 70-80 kg para las razas de tiro.
Talla: aproximadamente varía de los 85 cm a los 105 cm.
Morfología: existe una notable desproporción entre la longitud de las patas y el volumen del cuerpo (el neonato presenta una cabeza grande y es alto de patas).
Color de pelo: siempre menos "denso" (aparte del tordo) y menos completo que el que aparecerá después. Recuérdese que frecuentemente un caballo tordo era al nacer bayo o alazán obscuro.
Casco: al nacimiento parece no formado; en el borde inferior de la pared presenta sustancia córnea blanda.

Cuadro 5 - Datos fisiológicos de un potro neonato normal.

Temperatura rectal: 37,2 - 38,3°C durante los 4 primeros días.
Frecuencia cardíaca: 40 - 80 pulsaciones/minuto.
Frecuencia respiratoria: de 70 desciende a 50 respiraciones/minuto en las 24 primeras horas.
Orina: la primera micción sucede en los machos aproximadamente 6 horas después del nacimiento; en las hembras después de 10 horas.