

Menor incidencia de Brucelosis en 2009

A. López.
Redacción

Durante el pasado año se volvió a registrar una mejora en los programas de control y erradicación de enfermedades animales, con una menor incidencia en la positividad a Brucelosis, pero con un ligero aumento de la prevalencia de la Tuberculosis Bovina que, según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), fue debida principalmente a la realización de pruebas de diagnóstico más sensibles.

De acuerdo al informe de evaluación técnica de la situación, el número total de rebaños investigados de esta última enfermedad fue de 119.664 (94,33% de cobertura) con un total de 1.970 positivos (1.984 en 2008), con una pre-

valencia de rebaño del 1,65% (1,58% en 2008).

Del total de rebaños positivos, 1.230 fueron nuevos positivos, con una incidencia de rebaño del 1,03% (0,87% en 2008). No obstante, la prevalencia en animales o número de animales positivos en el año 2009 fue del 0,41%, más bajo que el 0,48% del año anterior.

Para el MARM, el aumento de los rebaños positivos en 2009 refleja tanto un aumento en la sensibilidad del diagnóstico a este nivel, como la aparición de nuevos focos en algunas zonas, posiblemente vinculados a reservorios de fauna silvestre, y algunos problemas de manejo en algunas razas autóctonas a la hora de ejecutar las pruebas diagnósticas.

En la última década se ha registrado una importante de la prevalencia de esta enfermedad animal en España, si bien se ha registrado un ligero aumento en los tres años anteriores.

Nuestro país cuenta con 227 comarcas libres de la incidencia de la Tuberculosis Bovina, aunque en la zona suroeste peninsular persisten un gran número de ellas con prevalencias elevadas. A nivel de CC.AA., las mayores incidencias se registraron en Castilla-La Mancha (10,27%), Andalucía (8,94%), Madrid (5,54%), Extremadura (3,785) y Región de Murcia (3,78%).

En Brucelosis Bovina, se investigó a 118.869 rebaños (93,72% de cobertura, con un total de 379 positivos, con una prevalencia a este nivel del 0,32% (0,40% en 2008). Del total de rebaños positivos, 253 fueron nuevos positivos, lo que supone una incidencia de rebaño del 0,21% (0,27% en 2009). La prevalencia en animales fue del 0,07%, frente al 0,09% en 2008.

El MARM destaca que la mejoría en la lucha frente a la Brucelosis Bovina se debe a que las CC.AA., que en años precedentes habían experimentado una buena evolución, han continuado en esta misma línea, mientras que las que sufrieron un retroceso en 2003 y 2004 y aplicaron a partir de 2005 medidas de vacunación o vaciado sanitario, han logrado reflejar el éxito de sus programas con un moderado avance en 2006, ya más evidente entre 2007 y 2009.

Campaña 2009 de control y erradicación de Brucelosis Ovina y Caprina.

CC.AA.	Nº rebaños controlados	Nº rebaños positivos	(%) Prevalencia
Andalucía	15.930	1.267	7,95
Aragón	4.497	17	0,38
Asturias	6.565	0	0
Baleares	4.383	0	0
Canarias	1.160	0	0
Cantabria	4.424	8	0,18
C.-La Mancha	6.805	134	1,97
C. y León	10.712	38	0,35
Cataluña	3.360	52	1,55
Extremadura	14.790	98	0,66
Galicia	23.379	0	0
La Rioja	429	3	0,70
Madrid	603	17	2,82
Murcia	2.286	114	4,99
Navarra	2.136	0	0
País Vasco	7.259	3	0,04
C. Valenciana	1.422	50	3,52
Total 2009	110.140	1.801	1,64
Total 2008	110.444	2.331	2,11

Fuente: MARM. * En negrita, CC.AA. con una prevalencia de positivos por encima de la media nacional.

Campaña 2009 de control y erradicación de Tuberculosis Bovina.

CC.AA.	Nº rebaños controlados	Nº rebaños positivos	(%) Prevalencia
Andalucía	6.633	593	8,94
Aragón	2.135	15	0,70
Asturias	19.242	40	0,21
Baleares	472	0	0
Canarias	1.188	0	0
Cantabria	8.066	73	0,91
C.-La Mancha	2.161	222	10,27
C. y León	14.588	401	2,75
Cataluña	4.089	34	0,83
Extremadura	9.664	365	3,78
Galicia	41.359	90	0,22
La Rioja	268	2	0,75
Madrid	1.408	78	5,54
Murcia	3123	11	3,51
Navarra	1.666	5	0,30
País Vasco	5.832	33	0,57
C. Valenciana	580	8	1,38
Total 2009	119.664	1.970	1,65
Total 2008	124.956	1.984	1,59

Fuente: MARM. * En negrita, CC.AA. con una prevalencia de positivos por encima de la media nacional.

Campaña 2009 de control y erradicación de Brucelosis Bovina.

CC.AA.	Nº rebaños controlados	Nº rebaños positivos	(%) Prevalencia
Andalucía	6.252	17	0,27
Aragón	1.779	0	0
Asturias	19.242	0	0
Baleares	564	0	0
Canarias	1.075	0	0
Cantabria	8.066	48	0,60
C.-La Mancha	2.098	10	0,48
C. y León	14.588	185	1,27
Cataluña	4.089	18	0,44
Extremadura	9.741	65	0,67
Galicia	41.319	16	0,04
La Rioja	268	0	0
Madrid	1.406	17	1,21
Murcia	560	0	0
Navarra	1.666	2	0,12
País Vasco	5.645	1	0,02
C. Valenciana	511	0	0
Total 2009	118.869	379	0,32
Total 2008	123.584	469	0,38

Fuente: MARM. * En negrita, CC.AA. con una prevalencia de positivos por encima de la media nacional.

Comarcas libres

Nuestro país cuenta ya con 406 comarcas libres de Brucelosis Bovina. Las zonas más afectadas aún son las comarcas de la sierra de Madrid y Segovia, y gran parte de las provincias de Salamanca, Ávila, Cáceres y Badajoz. Por CC.AA. las mayores prevalencias se registraron el pasado año en Castilla y León (1,27%) y Madrid (1,21%).

En Brucelosis Ovina y Caprina, el número total de explotaciones investigadas fue de 110.140, con un total de 1.801 rebaños positivos, lo que supone una prevalencia de rebaño del 1,64% (2,11% en 2008). De éstos, 1.187 fueron nuevos positivos, con una incidencia a este nivel del 1,08% (1,53% en 2008). La prevalencia de animales o número de animales positivos a esta enfermedad en 2009 fue del 0,11% (0,15% en 2008).

El grupo de CC.AA. de prevalencia cero, que en 2008 estaba formado por Asturias, Baleares, Canarias, Navarra y Galicia, se mantiene en 2009. Canarias sigue manteniendo su estatuto de oficialmente indemne, y Baleares, Galicia y Asturias cumplen los criterios para su declaración como oficialmente libres.

El ligero aumento de la prevalencia de la Tuberculosis Bovina fue debido principalmente a la realización de pruebas de diagnóstico más sensibles

Al grupo de CC.AA. de baja prevalencia (igual o inferior al 2,5%), formado en 2008 por Cantabria, Galicia, Aragón, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha y País Vasco, se añadió el pasado año Cataluña (1,55%), anteriormente en el grupo de alta prevalencia, donde la evolución es muy favorable, salvo en La Rioja, que se mantiene en el 0,70% de 2008.

El grupo de CC.AA. de "alta prevalencia" (igual o superior al 2,5% en rebaño), experimenta, según el MARM, un progreso importante en Murcia, Madrid y Valencia, con leves descensos en Andalucía (7,95%, frente al 8,55% de 2008). ■