

Utilización práctica de papillas para lechones destetados

A pesar de los recientes avances en nutrición de lechones, todavía algunos pasan hambre durante los primeros días tras el destete. Por lo general, estos animales se convierten en "saldos" o "retrasados", que no consiguen alcanzar adecuadamente su peso de sacrificio, y necesitan una actuación especial en su alimentación.



I. Mavromichalis
Ariston Nutrition SL

En general, los lechones retrasados en un grupo de destete suponen menos del 2%, pero con dietas de baja calidad y un estado sanitario deficiente, pueden sobrepasar el 5%. Debido a los bruscos cambios que se producen tras el destete en el comportamiento alimentario (de mamar de la cerda a comer voluntariamente) y en la presentación del alimento (leche líquida frente a gránulos secos), algunos cerdos no consiguen arrancar.

Aunque el suministro de alimento en forma líquida y de lactoreemplazantes mejora en gran medida la ingesta de pienso tras el destete, la implementación de estas técnicas rara vez se realiza, especialmente en España, donde escasea la mano de obra en las grandes explotaciones.

Por otro lado, la alimentación en papilla es a la vez práctica y económica, al tiempo que aumenta el consumo de pienso después del destete.

Investigadores suecos demostraron recientemente que la alimentación líquida aumentaba el consumo de pienso en hasta un 30% durante las dos primeras semanas post-destete. Investigadores británicos también mostraron que la alimentación con papilla mantiene la integridad intestinal y mejora el estado metabólico de los cerdos recién destetados. Según lo indicado por estos grupos

de investigación internacionales, la papilla presentada como alimento de iniciación durante la lactancia es otra manera de mejorar el rendimiento post-destete.

Puesta en práctica

La alimentación con papillas requiere una inversión mínima en equipamiento. Los comederos de tipo plato (comederos comerciales rojos y redondos para lechones que se fijan al suelo) normalmente suelen ser suficientes, aunque se puede utilizar cualquier recipiente poco profundo.

Se puede utilizar un pienso pre-estárter de alta calidad típico, tanto para la papilla como para la alimentación en seco. Algunos fabricantes de piensos disponen también de piensos específicos para papilla. El uso de un lactoreemplazante en lugar de agua para mezclar la papilla aumenta notablemente la aceptabilidad de la misma.

Es preferible alojar por separado a los "saldos" y empezar con las papillas inmediatamente tras el destete. Además, para los cerdos retrasados que normalmente aparecen en las primeras semanas post-destete, también debería dedicarse una corralina aparte. Los lechones deben recibir la papilla no más de tres veces al día; si no, no empezarán a comer pienso seco, que debe ofrecerse *ad libitum* en comederos convencionales. Esta papilla durante

Cuadro I. Programa de cinco días para la alimentación post-destete con papilla de los cerdos "saldos" y enfermos.

Día	Proporción (agua:comida)	Tomas al día
1	3:1	3
2	2:2	3
3	2:2	3
4	1:3	2
5	1:3	1

3-5 días es normalmente suficiente para la mayoría de los lechones a recuperar.

Se recomienda un cambio gradual de la alimentación líquida suplementada a la dieta completamente seca. Para ello la consistencia de la papilla debe espesarse gradualmente, para permitir a los cerdos adaptarse a la dieta seca. El Cuadro I muestra un ejemplo práctico de un programa de cinco días para alimentación con papilla. Esta debe prepararse para cada toma en un cubo y luego distribuirse a todos los comederos de plato. Otra alternativa sería, en cada corralina, añadir pienso seco de los comederos automáticos y agua de los bebederos, en un recipiente para la papilla. Los cerdos deben recibir sólo la papilla que sean capaces de consumir en una toma de unos 20 minutos. Para asegurar un consumo suficiente de papilla por parte de todos los cerdos se recomienda al menos un comedero de plato por cada 10 lechones.

En ocasiones, especialmente durante los dos primeros días de alimentación con papilla, los cerdos se beben el líquido



y dejan una pasta de pienso en el fondo del comedero. Esto indica que están especialmente sedientos y debe investigarse una alternativa en la forma de suministrar el agua. En general, rellenar el comedero con más agua se traduce en el consumo de todo el alimento. ■



¿Quieres saber la
cotización
al instante?

www.lonjabinefar.com



¿Y además leer nuestro
boletín semanal?



Informamos
que la **SESIÓN
DE LONJA**
del 16 de marzo de
2011 se celebrará
en el salón de
congresos del
Recinto Ferial
de **ZARAGOZA**
(Fima Ganadera)

Lonja
agropecuaria de Binéfar
la orientación objetiva