



*Datos y novedades en rosas*

## Los problemas de la variedad Versilia



Rubén Fainstein  
sayag@ulo.satnet.net

En la variedad Versilia, distribuida por De Ruiters New Roses, aparecen deformaciones en el crecimiento de las plantas, la producción empieza a bajar rápidamente, las hojas se ven como «cansadas», hay caída de hojas, aparecen quemaduras en las hojas y el tallo se parte. A medida que pasa el tiempo los síntomas se agravan. Estos efectos no tienen



nada que ver con el patrón o la clase de injerto, según la compañía holandesa Etiko, que fue contratada por De Ruiters para averiguar las causas del problema. Esta compañía encontró diferencias entre las plantas enfermas y las sanas, en el sistema de transportación; pero nada que se pueda corregir actualmente.

Al principio se pensó que el problema existía sólo en Holanda, pero van apareciendo también en otros lugares, según fuentes holandesas (Bel 1996, pág. 12).

En total diecinueve floricultores holandeses plantaron esta variedad, en veinte hectáreas; de ellas diez fueron arrancadas.

Según el investigador holandés P.A. van de Pol, en un artículo que escribió en mayo de 1996, asegura que a mediano plazo es conveniente formar la

planta, aún a cambio de un retraso en el comienzo de la producción. De acá la importancia del método de formación de la planta. Según sus investigaciones, que duraron dos años, lo importante no es el número de básales, sino el número de ramificaciones sobre las que se puede construir.

En su investigación también confirmó que reducir el número de plantas por metro cuadrado es nega-

tivo para la producción.

Este mismo investigador, van de Pol, un mes después publicó un artículo en el cual comenta que las posibilidades de influir sobre el desarrollo y la floración de las rosas, guardando reservas (azúcar y almidón), son escasas.

Generalmente tratamos de influir en las reservas de las rosas, utilizando diferentes métodos de manejo, como pueden ser podas, cortes en bajada, agobio, floración libre, desbrotes, etc.

La idea es que por medio de estos sistemas se puedan juntar reservas para utilizarlas en épocas de invierno, durante las cuales hay menos luz. Pero las investigaciones muestran que la posibilidad de utilizar estas reservas son muy pequeñas.

● *En la variedad de rosa Versilia han ido apareciendo deformaciones en el crecimiento de las plantas, bajadas en la producción, «cansancio» de las hojas, caída de las mismas y quemaduras en las hojas y el tallo se parte* ●

● ● ●