



**MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION**  
DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

**caracterización  
agroclimática  
de la  
provincia de  
CORDOBA**

**MADRID, 1989**



CAR-82

T-2848



# caracterización agroclimática de la provincia de **CORDOBA**



**MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

MADRID, 1989

AUTORES:

**ANDRES DE LEON LLAMAZARES (I.A.)**

Toma, ordenación y elaboración de datos:  
ALBERTO ARRIBA BALENCIAGA

Proceso de datos y soporte informático:  
MARIA DEL CARMEN DE LA PLAZA

CARACTERIZACION REALIZADA EN EL **DEPARTAMENTO DE AGRO-CLIMATOLOGIA** DE LA **SECCION DE INVENTARIOS Y ESTUDIOS**. SUPERVISADA POR LOS SERVICIOS PROVINCIALES CORRESPONDIENTES. ESTA OBRA NO PODRA SER REPRODUCIDA, NI EN SU TOTALIDAD NI EN PARTE, POR CUALQUIER METODO O PROCEDIMIENTO, SIN LA AUTORIZACION PREVIA.

EDITA



**MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION**

SECRETARIA GENERAL TECNICA

**Centro de Publicaciones**

Paseo Infanta Isabel, 1 - 28014 MADRID

N.I.P.O.: 251-88-055-6 - I.S.B.N.: 84-7479-749-7 - Dep. leg.: M. 12.425-1989

Imprime: Neografis, S. L. - S. Estévez, 8 -28019 MADRID

## **OTROS TITULOS DE ESTA COLECCION**

- «Caracterización productiva de los pastizales de secano. Aproximación a una Metodología». Madrid, 1972.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Murcia». Madrid, 1974.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Huesca». Madrid, 1976.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Córdoba». Madrid, 1977.
- «Atlas Agroclimático Nacional de España». Madrid, 1979.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Santander». Madrid, 1980.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de León». Madrid, 1980.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Palencia». Madrid, 1980.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Oviedo». Madrid, 1980.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de La Rioja». Madrid, 1981.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Soria». Madrid, 1981.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Guadalajara». Madrid, 1981.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Avila». Madrid, 1984.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Teruel». Madrid, 1985.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Salamanca». Madrid, 1985.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Badajoz». Madrid, 1986.
- «Caracterización Agroclimática de la provincia de Cáceres». Madrid, 1986.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Navarra». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Zaragoza». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Burgos». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Segovia». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Valladolid». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Zamora». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Toledo». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Ciudad Real». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Albacete». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Cuenca». Madrid, 1988.

- «Caracterización agroclimática de la provincia de La Coruña». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Lugo». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Orense». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Pontevedra». Madrid, 1988.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Barcelona». Madrid, 1989.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Tarragona». Madrid, 1989.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Lérida». Madrid, 1989.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Gerona». Madrid, 1989.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Almería». Madrid, 1989.
- «Caracterización agroclimática de la provincia de Cádiz». Madrid, 1989.

## INDICE GENERAL

<b>PROLOGO</b> .....	7
<b>INTRODUCCION</b> .....	9
<b>CAPITULO I. METODOLOGIA Y RESULTADOS OBTENIDOS CON SU APLICACION</b> .....	11
<b>CAPITULO II. ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES</b> .....	23
<b>CAPITULO III. EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS</b> .....	29
<b>CAPITULO IV. LIMITACIONES QUE EL CLIMA IMPONE A LOS CULTIVOS</b> .....	63
<b>SUMMARY</b> .....	77
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	81
<b>ANEJOS</b> .....	95
● <b>CUADROS</b> .....	97
● <b>CARTOGRAFIA</b> .....	147
● <b>GRAFICOS</b> .....	151
● <b>TABLAS</b> .....	167

## **NOTA INTRODUCTORIA**

*Esta publicación es el resultado de la adaptación del primer trabajo sobre Caracterización Agroclimática de la provincia de Córdoba, realizada por don Cristóbal Lovera Prieto, don Gerardo de las Casas Cómez, don Andrés de León Llamazares y don Vicente Forteza del Rey Morales, y publicada por la Dirección General de la Producción Agraria en 1977 al sistema normalizado de Caracterización Agroclimática Provincial, que se está ejecutando para toda España, como complemento a la 2.ª Edición del Atlas Agroclimático Nacional a escala 1:500.000.*

*Esta adaptación ha supuesto una mejora en lo que respecta al período de registros de las Estaciones Meteorológicas seleccionadas entonces, y a la explotación de esa información numérica, en orden a completar cualitativamente el análisis sobre regímenes térmicos y pluviométricos de las estaciones provinciales. Se ha sacrificado, sin embargo, la evaluación zonal, que sustentaba la anterior edición.*

## PROLOGO

En 1974, la Subdirección General de la Producción Vegetal recibió el encargo de abordar un ambicioso programa de trabajo en torno a la valoración de nuestro medio físico, desde un punto de vista estrictamente agrícola, con fines de planificación económica.

Dentro de este programa, y constituyendo una parte esencial del mismo, figuraba el subprograma «Caracterización Agroclimática Nacional».

La tarea emprendida entonces, en relación con este tema, se orientó en un doble sentido:

De una parte, había que elaborar un documento sintético, a nivel nacional, que proporcionara aquella valoración, sobre la base de una metodología previamente contrastada y adecuada a la finalidad perseguida. El resultado de esta línea de trabajo ha sido ya objeto de publicación, en 1979, bajo el título de «Atlas Agroclimático Nacional» a escala 1:500.000 actualizado y ampliado en la segunda edición publicada en 1986.

De otra parte, se convino en la necesidad de elaborar documentos o caracterizaciones agroclimáticas, a nivel provincial, en los que se llevaría a cabo una valoración exhaustiva de las condiciones que los diferentes climas provinciales ofrecían al desarrollo de los cultivos, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Dentro de esta segunda línea de trabajo, se han puesto ya a disposición del lector interesado las Caracterizaciones Agroclimáticas Provinciales correspondientes a las Comunidades Autónomas de Asturias, Murcia, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña y Extremadura. En esta fecha aparecen las de Almería, Cádiz, Córdoba (2.<sup>a</sup> edición), Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, que completan la C. A. de Andalucía, así como Madrid y País Vasco. En todas ellas se han introducido mejoras sustanciales en lo que respecta al análisis de la pluviometría y la temperatura de la red de estaciones meteorológicas provinciales, que suponen un avance en la caracterización y posibilidades de uso de los valores de los factores climáticos al servicio de agricultores, técnicos agrarios y de otras actividades conexas.

La elección del nivel provincial, para estas caracterizaciones, tiene su razón de ser en el propio objeto del trabajo, que no es otro que servir de base a la planificación agrícola a nivel institucional o particular, y en las peculiaridades de la división administrativa del territorio nacional.

Sobre la base de la información que estos trabajos proporcionan, pueden y deben apoyarse numerosas decisiones, tanto a nivel de las Administraciones del Estado, autonómicas o locales, como a nivel de empresario agrario.

Temas como el fomento e introducción de nuevas variedades o especies cultivables; el desarrollo y aplicación de métodos o equipos de trabajo adaptados a las condiciones del medio físico; las previsiones de cosecha; el análisis de los riesgos de pérdidas de cosecha, a efectos del establecimiento de primas de seguros; el análisis económico o financiero, de proyectos de inversión agraria, a medio y largo plazo, que hoy se construye sobre modelos climáticos basados en el año promedio, y cuya inadecuación al propósito perseguido es proverbial, etc., pueden hoy estar sustentados por datos específicos, como los que se recogen en esta publicación.

Es deseo de la Dirección General de la Producción Agraria poder publicar, en plazo breve, el resto de las Caracterizaciones Agroclimáticas provinciales, en la confianza de estar contribuyendo así a un conocimiento más preciso de nuestra realidad agraria, tan varia, cuando se la analiza con detenimiento, y, a su vez, tan uniformada y poco matizada por las descripciones al uso.

Que este conocimiento detallado sirva a los propósitos que inspiraron su recopilación constituirá el mayor motivo de satisfacción para cuantos participamos en esta tarea.

## INTRODUCCION

El trabajo que se presenta, bajo la denominación de «Caracterización Agroclimática de la provincia de **Córdoba**», trata de establecer las limitaciones y posibilidades de la producción agrícola, en esta provincia.

Para ello, y de acuerdo con los fines propuestos, se ha realizado un análisis detallado de la termometría, la pluviometría, y la combinación de éstas, como elementos mayores del clima, así como de la relación clima-vegetación, en sus dos vertientes cualitativa y cuantitativa y en la doble faceta de vegetación cultivada y vegetación natural.

El análisis llevado a cabo tiene carácter mesoclimático y está basado en los datos que proporcionan 14 estaciones completas (C) y termopluiométricas (TP) y 51 estaciones pluviométricas (P). Para su elección, entre las estaciones meteorológicas disponibles en la actualidad en la provincia, se han seguido los criterios espacio - temporales recomendados, para este tipo de estudio, por la Organización Meteorológica Mundial. El período básico de trabajo ha sido el constituido por los años 1940-1980.

La distribución de las estaciones seleccionadas es más bien regular, sin grandes zonas de silencio. En cuanto a la densidad de estaciones es baja, aunque admisible.

No obstante, es aconsejable interpretar con prudencia los mapas en los que se han cartografiado los distintos caracteres climáticos, ya que las limitaciones inherentes a la escala de representación, no han permitido individualizar determinados enclaves con caracteres distintos a los de la zona donde han sido incluidos.

Los resultados obtenidos, al someter a la red termopluviométrica provincial al tipo de análisis anunciado, y cuya descripción se desarrolla más adelante, permiten establecer de manera precisa las limitaciones que el medio físico impone a la vegetación en cada zona, y comparar estas con otras del mundo o de nuestro propio país, que se consideran similares, aprovechando así la experiencia adquirida en ellas para el planteamiento y resolución de problemas tales como la introducción de cultivos, la mejora genética, la lucha contra plagas y enfermedades, etc.

De acuerdo con las ideas expuestas, el estudio realizado y sus conclusiones se han dispuesto de la siguiente forma:

## CAPITULO I.- METODOLOGIA Y RESULTADOS OBTENIDOS CON SU APLICACION

En él se describen los criterios y sistemas de clasificación utilizados para caracterizar las variables y factores climáticos que más influyen en la vida vegetal, y la correlación entre estos y la vegetación, tanto espontánea como cultivada. Así mismo se reseñan los resultados obtenidos con la aplicación de tales criterios y sistemas a la red meteorológica provincial seleccionada.

## CAPITULO II.- ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

Se dan, en forma de cuadro resumen, los valores que alcanzan en las zonas agroclimáticas, resultantes de la aplicación de la metodología descrita, los factores o elementos térmicos y pluviométricos, así como los índices y clasificaciones.

## CAPITULO III.- EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS

En este capítulo se exponen, en forma de cuadro-resumen, las exigencias de los cultivos en términos de los distintos tipos de invierno, de verano y regímenes de humedad definidos por J. Papadakis. Se añaden las observaciones pertinentes, para una mejor valoración de los requisitos.

## CAPITULO IV.- LIMITACIONES QUE EL CLIMA IMPONE A LOS CULTIVOS

Mediante un cuadro-resumen se describen las limitaciones que el clima de las zonas, descritas en el capítulo II, impone a los cultivos por medio de un código de números y letras, con el que se sintetiza la valoración agronómica de las mismas.

**CAPITULO I**  
**METODOLOGIA**



## **METODOLOGIA**

### **CARACTERISTICAS TERMICAS**

1. Temperaturas medias y oscilación térmica
2. Período frío
3. Período cálido

### **CARACTERISTICAS PLUVIOMETRICAS Y DE HUMEDAD**

1. Pluviometría media
2. Evapotranspiración potencial
3. Período seco

### **RELACIONES CLIMA-VEGETACION**

1. Cualitativas
  - 1.1 Vegetación cultivada. Clasificación de J. Papadakis
  - 1.2 Vegetación natural
2. Cuantitativas
  - 2.1 Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc

### **CARTOGRAFIA**



## **CAPITULO I**

### **METODOLOGIA**

Los criterios y métodos seguidos para realizar la Caracterización Agroclimática provincial han sido los siguientes:

#### **CARACTERISTICAS TERMICAS**

Para la caracterización del régimen térmico de un lugar o un área es necesario disponer previamente de las temperaturas medias mensuales (de máximas absolutas, máximas, medias, mínimas y mínimas absolutas) al objeto de calcular las temperaturas estacionales y anuales. Para ello se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por la red termopluviométrica y completa provincial seleccionada. (Véase cuadro nº 1).

El cálculo de las temperaturas estacionales se ha realizado obteniendo la media aritmética de las temperaturas correspondientes a los meses de la estación, considerando, por ejemplo, que el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero.

De igual forma se procede para obtener las temperaturas medias anuales como media aritmética de las temperaturas correspondientes a los doce meses, a excepción de las máximas y mínimas absolutas. Para la obtención de lo que se denomina media de las máximas/mínimas absolutas anuales se obtiene la media aritmética de las máximas/mínimas absolutas correspondientes a cada año de la serie. (Véase cuadros nº 2 al 9).

## 1. Temperaturas medias y oscilación térmica

Se incluyen estos parámetros para facilitar la comparación interzonal, a nivel nacional o internacional, y para posibilitar al lector la realización de otro tipo de estudio con fines distintos a los que aquí se persiguen.

La oscilación térmica se define aquí como la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la media del mes más frío. (Ver cuadros nº 4 y 8; mapas nº 1, 2 y 3).

Asimismo se incluye el análisis estadístico de las temperaturas medias mensuales de máximas absolutas, máximas, medias, mínimas y mínimas absolutas (cuadros 2 a 6 a.i., respectivamente) y las tablas de la distribución Normal para facilitar su uso adecuado.

## 2. Periodo frío

La **duración** del período frío se establece en base al criterio de L. Emberger que considera como tal el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses fríos; entendiéndose por mes frío, aquel en el que la temperatura media de las mínimas es menor de  $7^{\circ}\text{C}$  ( $t < 7^{\circ}\text{C}$ ).

Este criterio ha sido contrastado ya en otros estudios provinciales, pudiéndose llegar a la conclusión de que anteriormente a la fecha de primera helada (otoño) o posteriormente a la de la última helada (primavera), fijadas por este criterio, el riesgo de que se den temperaturas inferiores a cero grados centígrados ( $0^{\circ}\text{C}$ ) es menor del 20%; riesgo admitido por la Organización Meteorológica Mundial en «Guide to Agricultural Meteorological Practices», como aceptable en estudios de este carácter, relacionados con las actividades agrarias.

La **intensidad** de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura media de mínimas del mes más frío. (A veces se toma, para una mejor valoración, la media de las mínimas absolutas del mes más frío, o la media de las mínimas absolutas anuales).

La **variabilidad** con que un mes es frío, se calcula, para todas las estaciones completas y termopluviométricas de la provincia; expresando dicho carácter en forma frecuencial, utilizando como período de retorno el de diez años. (Véanse cuadros nº 5, 6, 9, 10 bis y 11; mapas nº 4 al 8).

## 3. Periodo cálido

Se define aquí el período cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una descompensación en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno de sus tejidos o células. Estos efectos variarán con la especie, la edad del tejido y el tiempo de exposición a las altas temperaturas. También variarán según el valor de otros factores como humedad relativa del aire, humedad edáfica, velocidad del aire, etc.

Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a los  $30^{\circ}\text{C}$  ( $T > 30^{\circ}\text{C}$ ).

Estudios realizados por la Dirección General de la Producción Agraria, no publicados, permiten concluir que, anteriormente a la fecha en que comienza el período cálido o posteriormente a la que termina, fijadas éstas por el criterio antes definido, el riesgo de que se den temperaturas superiores a los  $38^{\circ}\text{C}$ , uno o más días, es inferior al 20%, riesgo que, como ya se ha visto, se ajusta a las normas de la O.M.M. para estudios de este carácter.

La **intensidad** del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura media de las máximas en el mes más cálido. (A veces, para una mejor valoración, se utiliza la media de las máximas absolutas del mes más cálido, o la media de las máximas absolutas anuales).

La **variabilidad** con que un mes forma parte del período cálido, se calcula para todas las estaciones completas y termopluiométricas de la provincia, expresándola de forma frecuencial y utilizando como período de retorno el de diez años. (Véanse cuadros nº 2, 3, 7, 12 y 13).

## **CARACTERISTICAS PLUVIOMETRICAS Y DE HUMEDAD**

### **1. Pluviometría media**

Para la caracterización de un lugar o un área es necesario disponer, previamente, de la pluviometría media mensual, estacional y anual. Para ello se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por la red meteorológica provincial seleccionada.

Para el cálculo de las pluviometrías estacionales, se ha procedido a la suma aritmética de las pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, por ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero.

La pluviometría anual es la suma de la pluviometría mensual en los doce meses. (Véanse cuadros nº 14 y 15; mapas 11 al 15).

Asimismo se incluye el análisis estadístico de la pluviometría media mensual. (Véase cuadro nº 14) y las tablas de la función  $r$ , para facilitar su uso adecuado.

### **2. Evapotranspiración potencial**

Es otro de los elementos a tener en cuenta, junto a la pluviometría, para la caracterización del régimen de humedad.

Se ha calculado la evapotranspiración potencial mensual siguiendo el método de Thornthwaite, que se basa en la temperatura media mensual y en latitud del lugar. Para poder incorporar al estudio del régimen de humedad las estaciones pluviométricas y calcular en ellas la evapotranspiración potencial, es necesario estimar la temperatura media mensual de las mismas.

Este problema se ha resuelto estableciendo, a nivel provincial, la correlación entre la temperatura media y la altitud, para todas las estaciones termopluiométricas y completas, utilizando posteriormente la ecuación de la recta de regresión obtenida para determinar, mes a mes, la temperatura media de las estaciones pluviométricas.

Para el cálculo de las evapotranspiraciones potenciales estacionales y anuales, se ha procedido al igual que con las pluviométricas. (Véanse cuadros nº 16 y 17; mapa nº 16).

### **3. Período seco**

Para un lugar o área dados se considera período seco al constituido por el conjunto de meses secos. Se entiende como mes seco aquel en que el balance

$(P+R) - ETP$  es menor que cero, siendo P la pluviometría mensual, ETP la evapotranspiración potencial mensual y R la reserva de agua almacenada en el suelo, en los meses anteriores, y que pueden utilizar las plantas.

Se introduce una variante en esta definición al considerar dos tipos de meses secos: aquellos en que el balance  $ETP - (P+R) < 50$  mm. y aquellos en que dicho balance es mayor de 50 mm.

Los meses en que  $ETP - (P+R)$  es menor de 50 mm., figuran con el signo  $\frac{1}{2}$  (véase cuadro nº 18) y se valoran como «relativamente secos». (Coincide, sólo en parte, con el concepto de mes «intermedio», de J. Papadakis).

Los meses en que  $ETP - (P+R)$  es mayor de 50 mm., figuran en el cuadro citado con un asterisco y se valoran como «seco».

El valor que se asigna a R, para este estudio, es el de 100 mm.; valor adecuado al nivel mesoclimático propio del mismo.

La **intensidad** de la sequía mensual se determina considerando tres intervalos para el déficit: entre 0 y 50 mm., entre 50 y 100 mm. y más de 100 mm. (A diferencia de otras publicaciones anteriores, de esta colección, al déficit de un mes, no se le acumula el de los anteriores).

La **variabilidad** del déficit, para los tres intervalos considerados, se calcula para todos los meses de todas las estaciones de la red. Se expresa de forma frecuencial, en tanto por ciento. (Véanse cuadros nº 18 y 19; mapas nº 18 y 19).

## RELACIONES CLIMA-VEGETACION

### 1. Cualitativas

#### 1.1 Vegetación cultivada. Clasificación de J. Papadakis

Este sistema de clasificación, basado en la ecología de los cultivos, ha sido incorporado al presente trabajo por las razones expuestas en la publicación «Caracterización Agroclimática de España. Metodología y Normas» (Madrid 1974). De entre ellas, merece destacarse la que se refiere al hecho de que permite establecer el espectro cultural de un área dada y, en consecuencia, fundamentar la utilización agraria de la misma, en base a parámetros meteorológicos relativamente sencillos.

Para ello, J. Papadakis, ordena los cultivos en función de sus **requisitos térmicos**, de invierno y verano, y su **resistencia a las heladas y a la sequía**, expresando tales características en forma cuantitativa. Hecho esto, caracteriza a cada lugar a través de sus condiciones térmicas, de invierno y verano, los períodos de helada y de sequía, con lo que, a partir de esta caracterización, y merced al orden inicial establecido para los cultivos, se puede elaborar el espectro cultural de un lugar o un área determinada con relativa sencillez.

J. Papadakis considera que las características fundamentales de un clima son dos: el régimen térmico, como síntesis de un tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de humedad.

La definición del **tipo de invierno** se apoya en tres parámetros meteorológicos básicos: la temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío, la temperatura media de las mínimas del mes más frío, y la temperatura media de las máximas del mes más frío. A veces esta definición se precisa utilizando un

cuarto parámetro, la temperatura media de las mínimas absolutas anuales. De esta forma define seis tipos de invierno fundamentales: Ecuatorial, Tropical, Citrus, Avena, Triticum y Primavera, ordenados en sentido de rigor invernal creciente.

El **tipo de verano** es función de la duración del período libre de heladas. A su vez, éste se valora a través de la temperatura media de las medias de las máximas de los meses más cálidos. Se añaden además las temperaturas medias de las máximas y de las mínimas del mes más cálido y, en algún caso, la temperatura media de las medias de las mínimas de los dos meses más cálidos. Así define ocho tipos de verano fundamentales, que son los siguientes: Algodón, Cafeto, Arroz, Maíz, Trigo, Polar, Frígido y Andino-Alpino, ordenados en sentido de rigor estival decreciente.

Es de resaltar que al definir los tipos de invierno y verano, se emplean valores extremos de temperatura, que poseen, sin duda alguna, mayor poder de definición, de cara a los fines perseguidos, que los valores medios empleados en la mayor parte de los sistemas de clasificación tradicionales.

La combinación de los tipos de invierno y verano de un área, define su **régimen térmico anual**. Estos regímenes térmicos se designan mediante el nombre del área geográfica donde se presentan con mayor extensión. Así, por ejemplo, aparecen los regímenes, Ecuatorial, Tropical, Andino, Subtropical, Marítimo, Templado, Continental, Polar, etc., denominaciones tradicionales en Agroclimatología, pero definidos con más precisión y objetividad, aun cuando cada régimen térmico pueda comprender varias de estas combinaciones.

El **régimen de humedad** se define, fundamentalmente, por los períodos de sequía, su duración, intensidad y situación en el ciclo anual. Para establecer los períodos de sequía se utiliza el balance de agua anual y mensual. Este último se realiza, mes a mes, comparando la evapotranspiración mensual con la pluviometría, incrementada en las disponibilidades de agua del suelo, procedentes del mes anterior, y que las plantas pueden utilizar. Papadakis distingue, basándose en el «índice de humedad mensual» **Ihm**, tres situaciones: mes húmedo, mes seco y mes intermedio. Este último concepto, introducido por el citado autor, es de gran importancia en la valoración agronómica del área o lugar considerados.

El cálculo de la evapotranspiración que el autor utiliza para el desarrollo de su sistema, está basado en el déficit de saturación. Este método da origen a grandes desviaciones al ser aplicado en España; en especial en la zona semiárida, durante todo el año, y, en los meses de verano, en las zonas húmedas. Por ello se ha sustituido en el presente trabajo por el sistema de Thornthwaite, considerando una reserva de agua del suelo equivalente a 100 mm.

Además del período seco, el autor utiliza para establecer el régimen de humedad de un lugar o área dados, el índice **Ln** «lluvia de lavado», resultando de la acumulación de las diferencias entre la pluviometría y evapotranspiración de los meses húmedos, y el índice **Iha** «de humedad anual», que se obtiene dividiendo la pluviometría anual por la evapotranspiración anual.

La combinación de estos tres criterios, permite definir los seis regímenes de humedad fundamentales siguientes: Húmedo, Desértico, Mediterráneo, Monzónico, Estepario e Isohigro-Semiárido. A su vez estos regímenes se subdividen en varios tipos según las características de sus períodos secos y su distribución en el ciclo anual.

La combinación del régimen térmico y de humedad de un área, permite establecer el gran **tipo climático o ecoclima** al que pertenece. Estos grandes tipos climáticos también admiten subdivisiones en función de la variación de los regímenes térmicos y de humedad que los definen. Los diez fundamentales son los siguientes: Tropical, Tierra Fría, Desértico, Subtropical, Pampeano, Mediterráneo, Marítimo, Continental húmedo, Estepa y Polar.

La aplicación del método considerado a las estaciones de la red termopluviométrica provincial que se ha seleccionado, ha permitido establecer las características de cada una de ellas; características que se recogen en el cuadro nº 20.

En cuanto a la cartografía, se presenta únicamente la correspondiente a los tipos de invierno y verano, y los regímenes de humedad (véanse mapas nº 20, 21 y 22), prescindiendo de los correspondientes a los regímenes térmicos y a los ecoclimas por considerar que estos caracteres integrados, ofrece un poder de definición no acorde con el objetivo y nivel de detalle de este estudio.

## **1.2 Vegetación natural**

Para la determinación de la vegetación natural potencial, se han calculado dos índices fitoclimáticos: el índice de aridez, de De Martonne, y el de higro-continentalidad, de Gams, que permiten obtener gráficamente las formaciones fisionómicas que corresponden a cada zona.

Los índices fitoclimáticos se han elaborado para toda la red provincial seleccionada, ya que se basan en la temperatura media anual, la precipitación media anual y la altitud de cada estación, datos que son conocidos, bien directamente o por extrapolación.

Al objeto de establecer los fitoclimas provinciales con más precisión se han confeccionado también los climodiagramas de Walter y Lieth, introduciendo alguna modificación. Los gráficos se han elaborado sólo para las estaciones de la red termopluviométrica y completa de la provincia. Otra razón que justifica su elaboración es que tal sistema de análisis y representación, ha sido utilizado por sus autores para el único estudio mundial del Clima que existe y por otros autores para estudios sobre áreas geográficas más restringidas. Por todo ello, se ha constituido en una especie de código climático internacional, que permite comparaciones bastante precisas entre las distintas regiones del globo y facilita la labor de ecólogos, genéticos, agrónomos, fisiólogos, etc. (Véase cuadro nº 25 y Gráficos).

## **2. Cuantitativas**

### **2.1 Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc**

Así como con la clasificación de J. Papadakis se puede determinar el espectro cultural de un área, con el Índice climático de potencialidad agrícola es posible establecer el potencial productivo de la misma.

El autor ha demostrado que existe una correlación entre los valores de

determinados elementos climáticos, a lo largo de un período dado (un mes, una estación, un año), y la producción, expresada en toneladas métricas de materia seca por hectárea, de una planta adaptada y cultivada en condiciones técnicas actuales normales; es decir, sobre suelo bien labrado y fertilizado.

Los valores de los elementos climáticos elegidos, —temperatura, humedad, radiación, etc.—, se integran en una fórmula factorial que puede establecerse mes a mes, año a año, etc., y que da el índice de potencialidad (C.A.) de un lugar para los períodos considerados. Disponiendo de los valores que alcanza la producción de las distintas plantas en esos mismos períodos de tiempo, puede establecerse la relación producción-índice, que permitirá predecir, posteriormente, la producción esperable de ese cultivo en cualquier otro período, siempre que se disponga del valor que toma el índice en el mismo.

Aunque la relación producción-índice sea diferente para los distintos cultivos, es evidente que el solo valor numérico del índice permite jerarquizar zonas por su mayor o menor capacidad productiva. De aquí su gran interés.

La aplicación de este método de cálculo a la red meteorológica seleccionada arroja los resultados que se reflejan en los cuadros nº 21, 22, 23 y 24. Antes de extenderse en consideraciones sobre dichos resultados y sus posibilidades de utilización conviene indicar, aunque sea brevemente, la problemática que ha planteado la elaboración de este índice y la forma en que estos problemas se han resuelto.

Como se ve, el cálculo se ha efectuado mes a mes, siendo el índice anual la suma de los índices mensuales y el estacional la suma de los índices mensuales correspondientes. Para obtener estos índices se precisan unos datos que son suministrados en su totalidad, únicamente, por las estaciones meteorológicas completas. En el caso de estaciones termopluviométricas y pluviométricas es preciso deducir, a través de métodos matemáticos y empíricos, los datos no disponibles. En concreto, los relativos a radiación incidente y humedad relativa en las estaciones termopluviométricas, y estos mismos aspectos más las temperaturas medias mensuales y las medias de las mínimas mensuales en las estaciones pluviométricas, han debido ser estimados mediante correlación, o asignados, en función de los valores adoptados por estas variables en estaciones situadas en posiciones fisiográficas similares.

Hechas estas operaciones se ha procedido a efectuar los cálculos de acuerdo con lo expuesto anteriormente. En los cuadros citados se recogen los resultados figurando, en primer lugar, los que corresponden a las estaciones meteorológicas completas y termopluviométricas y en segundo lugar, los que corresponden a las estaciones pluviométricas. Se trata así de separar tales resultados en función de la naturaleza de la red de información, a la que va ligada estrechamente la bondad y fiabilidad de la información meteorológica suministrada.

Dentro de esta disposición se han distinguido los resultados obtenidos en condiciones de secano (cuadros nº 21 y 22) de los que se obtienen al calcular el índice de potencialidad, partiendo de la base de que el suministro de agua no va a obrar como factor limitante (índice de Turc para el regadío. Cuadros nº 23 y 24).

En uno y otro caso las posibilidades de utilización del índice son muy diversas. Algunas de las más significativas se refieren a continuación. En primer lugar, la comparación del índice anual en secano y regadío, para un mismo

lugar, permite estimar el salto global que, desde el punto de vista productivo, supone la transformación en regadío en el área considerada. Esta comparación puede hacerse igualmente respecto de índices estacionales (por adición exclusiva de los meses integrantes de las estaciones o de los períodos de ocupación del suelo por los cultivos), precisando así la estimación global antes aludida, que sólo cobra verdadero sentido para cultivos que ocupan el suelo durante todo el año (caso concreto de los cultivos forrajeros plurianuales).

En segundo lugar, fijadas las condiciones de cultivo, sea secano o regadío, el índice facilita la comparación de potencialidades productivas interzonales respecto de un cultivo determinado, expresando las diferencias atribuibles a cualquiera de los elementos climáticos integrados en su elaboración, en términos estrictamente productivos.

Los índices anuales obtenidos para todas las estaciones de la red, en secano y regadío, han sido objeto de representación cartográfica. (Ver mapas números 24 y 25).

Por último, se llama la atención sobre el hecho de que cuando el índice toma el valor cero en una localidad, ello no significa que la producción de materia seca sea **nula**.

## **CARTOGRAFIA**

Para la ejecución de la cartografía básica, se han seguido las normas internacionales de representación, utilizando como base la cartografía nacional a escala 1:200.000.

**CAPITULO II**  
**ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES**



## **CAPITULO II**

### **ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES**

La aplicación de la Metodología expuesta a la red termopluviométrica provincial permite la delimitación de tres grupos de zonas agroclimáticas que se diferencian entre sí en algunos o varios de los caracteres utilizados para su definición y cuyas características más relevantes se presentan en el cuadro adjunto.

Las zonas definidas han sido objeto de representación cartográfica en el mapa nº 23.

## ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

ZONAS	REGIMEN TERMICO													
	Tm	PERIODO FRIO						PERIODO CALIDO						
		tmf	tf	Duración	Var. NOV	Var. DIC	Var. MAR	Var. ABR	Tmc	Tc	Duración	Var. JUN	Var. SEP	
I	15 a 16°C	7 a 8°C	3 a 4°C	5 meses	5/10	9/10	8/10	2/10	26 a 27°C	33 a 34°C	2 meses	1/10	3/10	
II	15 a 17°C	7 a 9°C	2 a 4°C	5 a 6 meses	7/10 9/10	9/10 10/10	8/10 10/10	3/10 6/10	26 a 29°C	34 a 38°C	2 a 4 meses	3/10 7/10	5/10 6/10	
II	16 a 19°C	8 a 11°C	3 a 5°C	3 a 6 meses	3/10 9/10	8/10 10/10	4/10 9/10	1/10 8/10	26 a 29°C	34 a 38°C	2 a 4 meses	3/10 9/10	6/10 9/10	

Nota: Tm = temperatura media anual.  
 tmf = temperatura media del mes más frío.  
 tf = temperatura media de las mínimas del mes más frío.  
 tmc = temperatura media del mes más cálido.  
 Tc = temperatura media de las máximas del mes más cálido.

### ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

ZONAS	REGIMEN DE HUMEDAD						VEGETACION CULTIVADA						VEGETACION ESPONTANEA	
	P anual	ETP anual	Duración	PERIODO SECO		Inv.	CLASIFICACION J. PAPADAKIS			INDICE DE TURC.				Form. fision.
				Var. JUN	Var. OCT		Ver.	R. Ter.	R. Hum.	Tipo climát.	Secano	Regadio		
I	400 a 500 mm.	800 a 900 mm.	4 meses	50%	90%	avo Av	O	TE o CO	Me	Medit. Cont. Templ.	10 a 15	45 a 50	Durilignosa	
II	400 a 800 mm.	800 a 900 mm.	3 a 5 meses	40 al 90%	70 al 90%	Av o Ci	g	Su	Me	Mediterr. Subtro.	10 a 20	45 a 55	Durilignosa	
III	400 a 700 mm.	800 a 1.000 mm.	3 a 5 meses	40 al 90%	70 al 90%	Ci	G	Su	Me	Mediterr. Subtro.	10 a 20	45 a 55	Durilignosa	



**CAPITULO III**  
**EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS**



### **CAPITULO III**

#### **EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS**

Se incluye este capítulo al objeto de ofrecer al lector la base sobre la que se apoya la valoración agronómica de las zonas agroclimáticas resultantes.

De este modo, al presentar los cuadros-resúmenes que se adjuntan, se facilitan al estudioso los criterios con los que poder juzgar mejor las interpretaciones efectuadas, y se da pie para que pueda, a su vez, realizar su propia valoración, al tener en cuenta estas «exigencias» objetivas que se resumen y sus propios conocimientos.

De otra parte, se trata de ofrecer, de una forma resumida y bajo una misma óptica (tipo de invierno, tipo de verano y régimen de humedad), una información que hasta ahora aparecía dispersa o inédita ya que, aunque básicamente procede de los trabajos de J. Papadakis, también se han utilizado las aportaciones de otros autores en relación con el comportamiento de los cultivos en áreas del mundo similares a las nuestras, así como la experiencia agronómica directa de nuestras instituciones agrarias y agricultores.

A continuación se dan referencias relativas a 121 cultivos, agrupados de la siguiente forma:

- **Cereales Grano** (8): De invierno (4), De primavera (4).
- **Leguminosas Grano** (8): De consumo humano (5), De consumo animal (3).
- **Tubérculos de consumo humano** (3).
- **Cultivos Industriales** (15): Azucareros (2), Textiles (3), Oleaginosos (6), Condimentos (2), Varios (2).
- **Cultivos Forrajeros** (27): Gramíneas (12), Leguminosas (9), Raíces (4), Varios (2).
- **Hortalizas** (35): De hoja o tallo (12), De fruto (10), De flor (2), Raíces y Bulbos (8), Leguminosas (3).
- **Cítricos** (5).
- **No Cítricos** (16): De pepita (3), De hueso (5), Otros de frutos carnosos (5), De fruto seco (3).
- **Otros cultivos** (4): Vid, Olivo, Cafeto y Té.

# INDICE DE CULTIVOS

## CEREALES GRANO

### — De invierno

Trigo	1
Cebada	1
Avena	1
Centeno	1

### — De primavera

Arroz	2
Maíz	2
Sorgo	2
Mijo	3

## LEGUMINOSAS GRANO

Judías secas	3
Habas secas	3
Lentejas	4
Garbanzos	4
Guisantes secos	4
Veza	4
Almortas	4
Altramuz	5

## TUBERCULOS CONSUMO HUMANO

Patata	5
Batata	5
Boniato	5

## CULTIVOS INDUSTRIALES

### — Azucareras

Caña de azúcar	6
Remolacha azucarera	6

### — Textiles

Algodón	6
Lino textil	7
Cáñamo textil	7

### — Oleaginosas

Lino oleaginoso	7
Cáñamo semilla	7
Cacahuete	7
Girasol	7
Colza	7
Soja	8

### — Condimentos

Pimiento pimentón	8
Mostaza	8

### — Varios

Tabaco	8
Achicoria	8

## CULTIVOS FORRAJEROS

### — Gramineas

Cereales invierno para forraje	8
Maíz forrajero	8
Sorgo forrajero	8
Lolium	9
Fleo	9
Agrostis	9
Poa	9
Dactylis	9
Festuca	9
Bromus	9
Phalaris	9
Paspalum dilatatum	9

### — Leguminosas

Alfalfa	9
Veza para forraje	9
Tréboles	10

### — Raíces

Nabo forrajero	10
Remolacha forrajera	10
Zanahoria forrajera	10
Chirivía	11

### — Varios

Col forrajera	11
Calabaza	11

## HORTALIZAS

### — De hoja o tallo

Col	11
Berza	11
Espárrago	11
Apio	11
Lechuga	12
Escarola	12
Espinaca	12
Acelga	12
Cardo	13
Achicoria verde	13
Endibia	13
Borraja	13

### — De fruto

Sandía	13
Melón	13
Calabaza	14
Calabacín	14
Pepino	14
Pepinillo	14
Berenjena	14
Tomate	14
Pimiento	15
Fresa	15
Fresón	15

### — De flor

Alcachofa	15
Coliflor	15

### — Raíces y bulbos

Ajo	16
Cebolla	16
Cebolleta	16
Puerro	16
Remolacha de mesa	16
Zanahoria	17
Rábano	17
Nabo	17

### — Leguminosas

Judías verdes	17
Guisantes verdes	18
Habas verdes	18

## CITRICOS

Naranja	18
Mandarino	18
Limonero	18
Pomelo	18
Limero	18

## FRUTALES NO CITRICOS

### — De pepita

Manzano	18
Peral	18
Membrillero	19

### — De hueso

Albaricoquero	19
Cerezo	19
Guindo	19
Melocotonero	19
Ciruelo	20

### — Otros de frutos carnosos

Higuera	20
Granado	20
Platanera	20
Palmera datilera	21
Piña	21

### — De fruto seco

Almendro	21
Nogal	21
Avellano	21

## OTROS CULTIVOS

Vid	22
Olivo	22
Cafeto	22
Té	22



## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
<b>CEREALES GRANO</b> — De invierno Trigo	ti, o más suaves	t, o más cálidos	Me, o más húmedos, o bien riego.	Para su siembra en otoño exige inviernos <b>ti</b> (MAM > -29°C) o más suaves. Cuando es más frío ( <b>Pr</b> o <b>pr</b> ) se siembra en primavera. Se cultiva en climas con inviernos <b>Ct</b> (Citrus tropical) o <b>tP</b> (Tropical medio), pero en estos casos los rendimientos son bajos y requiere alta fertilización. Necesita humedad abundante durante el mes que precede y los días que siguen a su espigazón.
Cebada	Tv, o más suaves	t, o más cálidos, e in- cluso <b>P</b> , o <b>A</b>	Me, o más húmedos, o bien riego.	En su resistencia al invierno, es intermedia entre el trigo y la avena. Exigencias en calor más bajas que las del trigo, por lo que penetra un poco en climas con verano <b>P</b> (Polar cálido-taiga) o <b>A</b> (alpino bajo). Un poco más resistente a la sequía que el trigo y la avena.
Avena	av, o más suaves	t, o más cálidos, e in- cluso <b>P</b> , o <b>A</b>	Me, o más húmedos, o bien riego.	Cuando el invierno es <b>Ti</b> , <b>ti</b> o <b>Pr</b> se siembra en primavera. Exigencias en calor más bajas que las del trigo, por lo que penetra un poco en climas con veranos <b>P</b> (Polar cálido-taiga) o <b>A</b> (alpino bajo). Un poco menos resistente a la sequía que el trigo. Avanza menos hacia el ecuador que el trigo.
Centeno	ti, o más suaves e in- cluso <b>Pr</b>	t, o más cálidos	Me, o más húmedos, o bien riego.	Avanza un poco en climas con inviernos <b>Pr</b> (Primavera más cálida). Avanza menos hacia el ecuador que el trigo, por sus mayores exigencias en frío. Más resistente que el trigo a la sequía.

1

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
<p>CEREALES GRANO (Cont.) — De primavera Arroz</p>		<p>O, o más cálidos</p>		<p>Suelos continuamente saturados de agua y con mal drenaje, ligeramente ácidos. Lluvia de lavado alta. Termófila, requiere tiempo soleado y buena iluminación para un buen desarrollo. Temperaturas por debajo de 0°C producen daños que dependen de la intensidad y duración de la helada. Soporta temperaturas del orden de 35 a 40°C con humedad suficiente. Rinde mejor cuando las noches son frescas (media de las mínimas de todos los meses &lt;20°C), por lo que da sus más altos rendimientos cerca de su límite polar o en ciertas zonas altas de los trópicos.</p>
<p>Maíz</p>		<p>M, o más cálidos e incluso T</p>		<p>El período de crecimiento no debe ser seco. En caso contrario el rendimiento disminuye, en particular durante la formación del penacho y granazón. Días largos y noches frescas, son favorables, por ello da sus más altos rendimientos en su límite polar y en tierras altas de los trópicos. Un verano G permite su cultivo, pero los rendimientos son más bajos. Temperaturas &gt;35°C destruyen el polen. Con período crítico en el mes que precede a la formación del grano.</p>
<p>Sorgo</p>		<p>O, o más cálidos (O, es suficiente)</p>		<p>Termófilo, exige más calor que el maíz. Las bajas temperaturas en la siembra dan lugar a una mala germinación. Mucho más resistente a la sequía que el maíz y demás cultivos anuales. Reemplaza al maíz en climas <b>Esteparios</b> y penetra un poco en climas continentales semiáridos.</p>

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Mijo común (Panicum milliaceum)		T, o más cálidos		<p>Planta de día corto, termófila, exige temperaturas más altas que el maíz para la siembra, pero su período de crecimiento es más corto, de 80 a 120 días, por lo que penetra un poco en climas con verano <b>Trigo más cálido</b>. No es resistente a la helada. Temperaturas de <math>-1^{\circ}</math> a <math>-3^{\circ}</math>C dañan a las hojas jóvenes.</p> <p>Resistente a la sequía.</p> <p>Se cultiva a lo largo del límite polar del maíz. En climas más cálidos se prefiere el sorgo a los «mijos» ELEUSINE CORACANA, PENNISETUM TYPHOIDUM, PASPALUM SCROBICULATUM, que se asemejan al sorgo en sus exigencias ecológicas.</p> <p>Con período crítico en la floración.</p> <p>Tolera bien temperaturas del orden de <math>35^{\circ}</math> a <math>40^{\circ}</math>C.</p>
Mijo (Pennisetum cinereum)		T, o más cálidos		<p>Más resistente a la sequía que el sorgo; por lo que avanza más en climas áridos.</p> <p>Un período húmedo de 2 meses parece suficiente, pero baja el rendimiento.</p> <p>Las lluvias durante la recolección son perjudiciales.</p>
<b>LEGUMINOSAS GRANO</b> Alubias (Phaseolus vulgaris)		O, M, T	HU, Hu (sin riego) ME, Me, SL. (con riego)	<p>A <math>0^{\circ}</math>C el daño es parcial y a <math>-1^{\circ}</math>C la planta muere en cualquier fase de desarrollo.</p> <p>Menos resistente a la sequía que el maíz.</p> <p>Las noches deben ser frescas.</p> <p>Un verano seco y fresco, con riego, es lo mejor, para evitar muchas enfermedades.</p>
Judía (Vigna sinensis)		O, o más cálidos		<p>Con exigencias climáticas análogas a las del sorgo, pero menos resistente a la sequía.</p>
Haba	Casi Ci, o más suaves	t, o más cálidos	Me, o más húmedos, o bien riego.	<p>Soporta heladas de hasta <math>-4^{\circ}</math>C.</p> <p>Exigencias en frío comparables a las de las variedades de trigo con menos exigencias.</p> <p>Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno.</p>

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Lenteja	Ci, o más suaves	t, o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos, o bien riego.	Exigencias en frío comparables a las de las variedades del trigo con menos exigencias. Algunas variedades son tan resistentes a heladas como las variedades más resistentes de avena. Elevadas temperaturas y aire seco afectan negativamente al rendimiento. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno.
Garbanzo	Ci, o más suaves (o próximos a Ci)	t, o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos	Exigencias en frío comparables a las de las variedades de trigo con menos exigencias. Más resistente a la sequía que el trigo.
Guisante	Ti, o más suaves	t, o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos, o bien riego	Su resistencia a los inviernos depende de variedades exigiendo algunas de ellas inviernos <b>Ci</b> (citrus) o próximos a él. Las flores se hielan a $-1^{\circ}\text{C}$ . Temperaturas de $-4^{\circ}\text{C}$ durante media hora dañan a la planta. Requiere cantidades moderadas de calor. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno. Las temperaturas altas provocan el amarilleamiento de la planta y detiene el crecimiento.
Veza	Ti, o más suaves	t, o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos	Tiene altas exigencias en frío. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno (P. anual $\geq 400$ mm. y P. primaveral $\geq 33$ por ciento). Tampoco tolera el exceso de humedad. No le afectan las altas temperaturas.
Almortas (Lathyrus)	Ti, o más suaves	t, o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos, o bien riego.	Menos resistente al invierno que los cereales en general. Los inviernos <b>Ci</b> son suficientemente suaves, pero pueden resistir inviernos <b>Ti</b> . Exigencias en calor próximas a las del trigo. Exigente en frío, pero sólo igual que las variedades menos exigentes de trigo. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Altramuz (Lupinus)	Ti, o más suaves	t, o más cálidos	Me, o más húmedos, o bien riego.	Su resistencia a los inviernos depende de variedades. Exigencias en frío comparables a las de las variedades de trigo menos exigentes. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno
<b>TUBERCULOS CONSUMO HUMANO</b> Patata	Ci, o más suaves	P, o más cálidos		Climas con inviernos <b>Tp</b> o <b>Ec</b> , son marginales para el cultivo de la patata. Cuando el verano es <b>t</b> o <b>T</b> , la patata se siembra en primavera y se recoge en otoño. Cuando el régimen térmico es <b>SU (Ci-Av, G)</b> , <b>Su (Ci, g)</b> o <b>TF (Ct</b> o más frío, <b>g)</b> hay dos cosechas, una que se siembra a principio de primavera y otra a final del verano. No resiste ligeras heladas. Cuando el clima está libre de heladas, la patata vegeta en el periodo más fresco del año. Entre $-0,5^{\circ}$ y $-1^{\circ}\text{C}$ se producen daños ligeros en la parte aérea y a $-2^{\circ}$ la planta muere. Requiere noches frescas, pero no demasiado frías. Temperaturas del orden de $29^{\circ}\text{C}$ detienen la tuberización. Sensible a la sequía, requiere un periodo de crecimiento húmedo, casi húmedo o riego (Estación húmeda $> 4$ meses).
Batata Boniato		O, o más cálidos		Se puede comparar al maíz en su resistencia a la sequía

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
<b>CULTIVOS INDUSTRIALES</b> — Azucareras Caña de azúcar	Casi sin heladas <b>Ci, Av</b>	<b>G</b>	Desde DESERTICO ( <b>de, de, di, do</b> ) con riego, hasta HUMEDO ( <b>Hu</b> ) sin riego	Climas sin heladas (MAM > 7°C), o los anteriormente reñados. Rinde mejor con noches frescas y días despejados y luminosos.
Remolacha azucarera		<b>T</b> , o más cálidos		Resiste un poco más las heladas y las altas temperaturas que la patata. Las hojas ennegrecen a temperaturas entre -4° y -5° si bien las raíces no son afectadas. Período de crecimiento casi húmedo con alternancias de días largos y despejados con noches frescas. Da sus mejores rendimientos con veranos <b>T</b> (trigo más cálido). Cuando el verano es más cálido, no se adapta bien y baja el rendimiento cuando las noches son cálidas. Cuando el invierno es <b>Ci</b> o más suave, se puede sembrar en otoño. Poco resistente a la sequía.
— <b>Textiles</b> Algodón		<b>c, g o G</b>		Necesita una abundante insolación, para florecer bien. Termófilo: su desarrollo máximo 15° a 25-30°C. Temperaturas > 38°C, en largos periodos, disminuyen el rendimiento. Resiste a la sequía. Si durante la maduración y recolección el tiempo es lluvioso, surgen grandes dificultades. Peor calidad de la fibra o su deterioro e imposibilidad de realizar la recolección.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Lino	Ci, o próximos a él	t, o más cálidos	ME, o riego	<p>Quando el invierno es más frío que Ci, se siembra en primavera.</p> <p>Menos resistente a la sequía que los cereales, debiendo ser húmedo el período de crecimiento. Con riego puede cultivarse incluso en el desierto.</p> <p>El lino para fibra requiere un clima muy húmedo y marítimo (estación fresca amplia).</p>
Cáñamo		M, o más cálido	ME, o riego	<p>Exigencias en calor ligeramente más bajas que las del maíz; penetra un poco, muy poco, en climas con veranos <b>Trigo más cálido.</b></p> <p>Exige días largos y condiciones muy buenas de humedad. Es cerca del límite polar del maíz, donde se cultiva esta planta.</p> <p>Muy sensible a la sequía.</p>
— Oleaginosas Lino				Véase lo dicho anteriormente para este cultivo.
Cáñamo				Véase lo dicho anteriormente para este cultivo.
Cacahuete (Arachis hipogea)		c, g o G		<p>Mismas exigencias en calor, aproximadamente que el algodón.</p> <p>Resistencia a la sequía, similar a la del sorgo.</p> <p>Exige suelos arenosos.</p>
Girasol		M, o más cálido		<p>Semejante al maíz en exigencias climáticas, pero más resistente a la sequía, aunque menos que el sorgo.</p> <p>No está bien adaptado a los climas tropicales.</p> <p>Bastante resistente a la helada. Temperaturas de <math>-1^{\circ}</math> ó <math>-2^{\circ}</math> C destruyen las flores.</p>
Colza	Av, o más suaves e incluso av	t, o más cálidos		<p>Exigencias en frío un poco más bajas que las de las variedades de trigo con menores exigencias.</p> <p>Menos resistentes que el trigo a la sequía.</p> <p>El período de crecimiento debe ser húmedo o casi húmedo; en cualquier caso no seco.</p>

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Soja		M, o más cálido		Exigencias climáticas similares a las del maíz, pero los rendimientos son más bajos. Está mejor adaptada, al ser leguminosa, a suelos más pobres que el maíz. Misma resistencia a la sequía que el maíz.
— <b>Condimentos</b> Pimiento para pimentón				Véase requisitos en Hortalizas.
Mostaza				Véase Colza.
— <b>Varios</b> Tabaco		t, o más cálidos		Se cultiva bajo todos los climas excepto los que tienen un verano P (Polar cálido-taiga), pero la calidad varía mucho con el clima y el suelo. Los mejores rendimientos se obtienen en un suelo con un contenido moderado de humedad. Las siembras se perjudican con una cantidad de humedad excesiva o deficiente. Temperatura óptima de desarrollo: 20 a 25°C.
Achicoria				Véase requisitos en Hortalizas.
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b> — <b>Gramíneas</b> Cereales de inv. para forr.				Véase cereales inv. para grano.
Maíz forrajero				Véase Maíz para grano.
Sorgo forrajero				Véase Sorgo para grano.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Lolium	av, o más suaves	Sin limitaciones (hasta ALPINO ALTO (a))	<b>HU, Hu, MO</b> o con riego.	Exigencias en frío relativamente altas. Sólo en climas húmedos o con riego, da alto rendimiento.
Fleó Agrostis Poa Dactylis Festuca Bromus Phalaris	Hasta <b>ti</b> o más fríos, incluso <b>pr</b>	Sin limitaciones (hasta ALPINO ALTO (a))	<b>HU, Hu, MO</b> o con riego.	Como Lolium.
Paspalum dilatatum	<b>Av</b> , o más suaves	<b>T</b> , o más cálidos	<b>HU, Hu, MO</b> o con riego.	No resiste las heladas. No hay referencias de exigencias en frío; se puede cultivar en climas con invierno <b>Ci</b> o <b>tp</b> . La alternancia de noches frescas con días largos (luminosos) favorece el ahijamiento.
— Leguminosas Alfalfa	<b>Ti</b> o más suaves			Exigencias en frío, comparables a las del trigo. Más exigente en calor que el trébol. Preferible al trébol en climas estepa, pampeano, mediterráneo y desértico. En climas mediterráneo, cuando el período seco es mayor de 1-2 meses exige riego. Soporta temperaturas superiores a los 40°C.
Veza para forraje				Véase Veza para grano.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Trébol híbrido ( <i>T. hybridum</i> ) Trébol blanco ( <i>T. repens</i> ) Trébol rojo ( <i>T. pratense</i> )				Aproximadamente las mismas exigencias climáticas que las gramíneas perennes ya citadas. Con frecuencia se cultivan mezcladas. El trébol híbrido es el mejor adaptado a climas fríos. Por el contrario ciertos ecotipos de trébol blanco vegetan en invierno en climas subtropical o mediterráneo, demasiado cálido o seco para otros tréboles.
Trébol subterráneo ( <i>T. subterraneum</i> )	<b>av</b> , o más suaves	<b>T</b> , o más cálidos	<b>ME, Me, St</b> (o más húmedos)	Es anual, pero se siembra por sí mismo. Vegeta bien en climas con régimen de humedad mediterráneo o estepa.
Trébol de Alejandría ( <i>Trifolium alexandrinum</i> )	<b>Cl</b> , o próximos a él	<b>t</b> , o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos	Exigencias en frío comparables a las de las variedades de trigo con menos exigencias. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno. Es el menos tolerante en frío de todos los verdaderos tréboles.
Trébol encarnado ( <i>Trifolium incarnatum</i> )	<b>Ti</b> , o más suaves	<b>t</b> , o más cálidos	<b>Me</b> , o más húmedos	Altas exigencias en frío. Menos resistente a la sequía que los cereales de invierno.
— <b>Raíces</b> Nabo forrajero				Véase Nabo.
Remolacha forrajera				Véase Remolacha azucarera.
Zanahoria forrajera				Véase Zanahoria.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Chirivía				La siembra se hace de asiento, a partir de febrero en nuevas zonas de clima templado y ya en abril en el interior, pudiendo continuar durante el invierno.
— <b>Varios</b> Col forrajera				Véase Col en Hortalizas.
Calabaza				Véase Calabaza en Hortalizas.
<b>HORTALIZAS</b> — <b>De hoja o tallo</b> Col	av, o más suaves	P, o más cálidos		Las bajas temperaturas activan la floración, por ello se siembra al final del verano y se recoge en invierno. En clima con verano <b>T</b> (trigo más cálido) se siembra en primavera y se recoge en otoño. Muy resistente a las bajas temperaturas.
Berza				Véase Col.
Espárrago				Véase Alcachofa. Se desarrolla bajo climas muy variados por lo que su área geográfica es muy extensa. Resiste tanto los fuertes calores, como las fuertes heladas invernales, que sólo influyen en el momento de la recolección, retrasándola más o menos.
Apio	Cl, o más suaves	P, o más cálidos		Con exigencias climáticas análogas a las de la patata. Requiere tiempo fresco y húmedo. Para producción temprana o tardía exige climas <b>(Ci, G), (Ci, M), (Tp, M)</b> . No se adapta a los climas <b>(Ec, G)</b> o <b>(Tp, G)</b> . A temperaturas entre $-4^{\circ}$ y $-5^{\circ}$ C, el daño es parcial y por debajo de $-7^{\circ}$ C, severo.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Lechuga	CI, o más suaves	T, o más cálidos		Bajas exigencias en frío, por lo que florece rápidamente cuando las temperaturas son altas. La estación de crecimiento debe ser, pues, fresca. Las hojas exteriores se hielan a unos $-4^{\circ}\text{C}$ (durante media hora). Es mejor que la estación de crecimiento sea seca y regar. Las variedades cultivadas responden a una gama de condiciones climáticas muy diversas.
Escarola				Aunque existen variedades más o menos sensibles a las bajas temperaturas, en general es poco exigente en clima, pudiéndose cultivar en casi toda España. Siembra a lo largo de todo el año, en semillero (meses de invierno) o directamente en campo (s. de asiento).
Espinaca	av, o más suaves	P, o más cálidos		Tan resistente a heladas como las variedades más resistentes de avena. Soporta heladas de hasta $-7^{\circ}\text{C}$ , e incluso más en estado joven. Véase lo dicho para Apio en cuanto a climas. Los excesos de humedad no son buenos en la recolección.
Acelga				Un clima templado y húmedo es el más favorable. Las plantas jóvenes soportan el invierno siempre que no sea muy riguroso, pero en la época de recolección se hielan fácilmente. No resiste la sequía. Combinando las fechas de siembra y las variedades se pueden producir durante la mayor parte del año.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Cardo				Planta herbácea perenne, muy afín a la alcachofa. En zonas templadas se hace la siembra de asiento antes de marzo, haciéndose en este mes o en abril, normalmente, en zonas más frías. A veces se hace también en mayo o junio.
Achicoría				Con requisitos similares a la Lechuga. Se suele sembrar de abril a julio inclusive, según variedades.
Endibia				Como la Achicoria tiene requisitos similares a la Lechuga. Sensible a la vernalización, como la Escarola. En otoño resiste heladas de $-4^{\circ}$ a $-5^{\circ}\text{C}$ .
Borraja				Con alta propensión a la subida al someterse a bajas temperaturas. Siembra de asiento principalmente durante el verano.
De fruto Sandía		M o más cálidos	Desde Hu a di	Rinde mejor cuando los veranos son g (algodón menos cálido) o G (algodón más cálido). Una combinación de humedad alta y temperaturas altas no dañan el fruto.
Melón		Casi T o más cálidos		Exigencias en calor análogas a las del maíz, extendiéndose un poco en climas con veranos T. Es preferible una estación seca y regar. Resistente a la sequía cuando la distancia entre plantas es grande y se controlan las malas hierbas. La luz es un factor esencial de la precocidad y la calidad.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Calabaza		Casi <b>T</b> , o más cálidos		Con requisitos similares al Melón. Cultivo de origen tropical o subtropical. Tienen un crecimiento muy rápido, que solamente se puede llevar a cabo en periodos suficientemente cálidos y con mucha luz. Temperaturas óptimas entre 22 a 23°C.
Calabacín				Con los requisitos vistos para Calabaza.
Pepino y Pepinillo		Casi <b>T</b> , o más cálidos		Similar al tomate y melón en sus exigencias térmicas, menores que las del maíz. Temperatura óptima de crecimiento de unos 25°C. Requiere una elevada humedad relativa y un suelo bastante húmedo. Cuando la temperatura del aire cae por debajo de 13 a 15°C la planta se vuelve amarilla.
Berenjena		<b>M</b> , o más cálidos		Tan exigente en calor como el pimiento, no la dañan las altas temperaturas. A -1°C el daño es severo. Exige mucha humedad edáfica. Para producción muy temprana o muy tardía exige inviernos <b>Ci</b> o <b>Tp</b> .
Tomate		Casi <b>T</b> , o más cálidos		Con altas temperaturas, de 30 a 35°C, acompañadas de excesiva humedad, surgen problemas. En climas sin heladas vegeta incluso en invierno. Las plantas bien desarrolladas soportan temperaturas de -1,5°C. Exige noches frescas. Es preferible tiempo seco, y regar.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Pimiento		<b>M</b> , o más cálidos		Es más exigente en calor que el tomate. A $-1,5^{\circ}\text{C}$ , el daño es parcial, a $-2^{\circ}\text{C}$ , severo y a $-3^{\circ}\text{C}$ , muy intenso. Fuertes temperaturas ( $>35^{\circ}\text{C}$ ) comprometen la fructificación. Exige una humedad regular del suelo durante toda la vegetación.
Fresa y Fresón	<b>ti</b> , o más suaves	<b>T</b> , o más cálidos		Es resistente al invierno; con la adecuada protección puede cultivarse incluso con inviernos <b>ti</b> . El fruto se hiela a temperaturas entre $0$ y $-2^{\circ}\text{C}$ y las flores sufren daños entre $0$ y $-1^{\circ}\text{C}$ . En climas con regímenes térmicos ( <b>Ci</b> , <b>Av-G</b> ) o ( <b>Ci</b> , <b>g</b> ) se producen fresas en primavera. En climas con regímenes térmicos ( <b>av - T</b> ) o ( <b>Ti</b> , <b>ti-T</b> ) se producen entre final del verano y otoño.
— De flor Alcachofa	<b>Ci</b> , <b>Av</b> , <b>av</b>	<b>g</b> , <b>O</b> , <b>M</b> , <b>T</b>		Tiene aproximadamente la misma resistencia al invierno que el Olivo. Exige un clima marítimo con una larga estación fresca (una primavera larga, un otoño largo, o un verano largo y fresco). Los mejores regímenes térmicos son los que resultan de la combinación de inviernos <b>Ci</b> y los veranos que se indican. Es resistente a la sequía, pero el riego permite obtener una segunda cosecha en otoño.
Coliflor	<b>av</b> , o más suaves	<b>T</b> , o más cálidos		En zonas donde el invierno es severo debe cosecharse antes de invierno; además el peligro de no florecer es más grande que en el caso de la col, por lo que se cultiva en regiones con inviernos largos y templados o veranos largos y frescos (las altas temperaturas $>25^{\circ}\text{C}$ , también limitan la producción). Se decolora cuando las temperaturas alcanzan $-3^{\circ}\text{C}$ . No resiste a la sequía.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
— Raíces y bulbos Ajo				Con requisitos muy similares a la cebolla y a las hortalizas de media estación en general (Apio, Zanahoria, etc.).
Cebolla y Cebolleta	av	t, o más cálidos		Tiene altas exigencias en frío. Cuando las temperaturas son continuamente altas se tiene o retrasa la floración. El cultivo vegeta, pero los rendimientos bajan (1). En altas latitudes (verano M, o más fresco) el período de crecimiento debe coincidir con la parte más cálida del año. Es preferible una estación de crecimiento seca con riego. La alternancia de días luminosos con noches frescas le es favorable. (1) <i>Temperatura óptima de crecimiento de 19 a 20° C.</i>
Puerro				Con requisitos muy similares a la cebolla, es capaz de resistir a las fuertes heladas invernales. Muy exigente en humedad.
Remolacha de mesa				Véase Apio u Hortalizas de media estación en general.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Zanahoria	Ci, o más suaves	P, o más cálidos		Resiste heladas de hasta $-4^{\circ}\text{C}$ . A unos $-7^{\circ}\text{C}$ se producen daños y a $-8$ o $-9^{\circ}\text{C}$ la planta muere. Temperatura óptima de crecimiento de 16 a $18^{\circ}\text{C}$ . Exigencias climáticas análogas a las de la Patata. Requiere tiempo fresco y húmedo no debiendo sufrir de sequía. Para producción temprana o tardía exige climas (Ci, G), (Ci, M), (Tp, M). No se adapta bien a los climas (Ec, G) o (Tp, G).
Rábano				Los brotes pueden resistir hasta $-4^{\circ}\text{C}$ y las plantas adultas hasta $-6^{\circ}\text{C}$ . Cuando el calor es insuficiente se desarrolla mal y se lignifica. La excesiva humedad lo agrieta, pero exige frecuentes riegos. Con requisitos similares a los de la Zanahoria.
Nabo	Av, o más suaves e incluso av	t, o más cálidos		Exigencias en frío un poco más bajas que las de las variedades de trigo con menores exigencias. Menos resistentes que el trigo a la sequía. El período de crecimiento debe ser húmedo o casi húmedo; en cualquier caso no seco.
— Leguminosas Judías verdes		T, o más cálidos		Exige una estación sin heladas, fresca y húmeda o con riego. Cuando el verano es T o M se siembra en primavera y se recoge en otoño. Cuando el verano es g o G se siembra al principio de la estación libre de heladas y se recoge en verano; o se siembra en el verano y se recoge antes de que acabe la estación libre de heladas. En climas sin heladas, vegeta en invierno.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Guisantes verdes				Véase Guisantes para grano.
Habas verdes				Véase Habas para grano.
— <b>CITRICOS</b> Naranja Mandarino Pomelo	<b>Ci</b> , o más suaves	<b>g, c</b> o más cálidos		La calidad es mayor cuando el invierno es <b>Ci</b> o <b>tp</b> . Un clima húmedo es favorable, y responde bien a los riegos. Resisten una estación seca corta con S < 500 mm. cuando el suelo tiene capacidad de retención y la lluvia durante la estación húmeda puede dar lugar a una reserva. El intervalo 27 a 32°C es el óptimo para el crecimiento.
Limonero	<b>Ci</b> , o más suaves	<b>O</b> , o más cálidos		
Limero				Véase requisitos del Naranja.
<b>FRUTALES NO CITRICOS</b> — De pepita Manzano	<b>ti</b> , o más suaves	<b>t</b> , o más cálidos <b>T</b> , o casi <b>T</b> , es suficiente	<b>HU, Hu</b> , o riego	Altas exigencias en frío. Media de las máximas del mes más frío < 15°C, por lo que no vegeta bien con inviernos <b>Ec, Tp, tp</b> o <b>Ct</b> . En plena floración puede soportar como máximo una temperatura de -2,5°C. Más resistente a la helada que el melocotnero, albaricoquero y cerezo. Requiere noches frescas (media de las mínimas de todos los meses < 20°C). Temperaturas máximas superiores a 38°C dañan la calidad del fruto. Temperaturas altas antes de la recolección pueden ocasionar la caída del fruto. Requiere un clima húmedo ( <b>HU, Hu</b> ), pero rinde mejor en climas secos o desérticos con riego.
Peral	Casi <b>ti</b> , o más suaves	Casi <b>M</b> , o más cálidos	<b>ME</b> , o riego	Poco menos resistente que el manzano a los inviernos y un poco menos exigente en frío. Le favorece un verano no lluvioso, pero hay que regarlo. Menos tolerante a la sequía que el manzano.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Membrillero	ti, o más suaves	t, o más cálidos	Hu, o riego	Menos exigente en frío que Prunus salicina.
— De hueso Albaricoquero	Casi Av, o más suaves	Casi M, o más cálidos	Hu, o riego	Aproximadamente las mismas exigencias climáticas que el Melocotonero. Las heladas tardías lo dañan más que al Melocotonero. Resistente a la sequía, pero menos que el Almendro. Temperaturas altas en verano del orden de 40°C, ocasionan daños en el fruto.
Cerezo	Más suaves que ti	T, o más cálidos	Me, o riego	Un poco menos resistente al invierno que el Manzano. Sus exigencias en frío son relativamente altas, quizás tan altas como las del Manzano. Exige un verano fresco, extendiéndose muy poco en climas con verano algodón menos cálido (g). Lo dañan más las heladas tardías que al manzano por florecer antes. Por esta razón, es más resistente a la sequía.
Guindo	Más suaves que ti	t, o más cálidos		Exige menos calor que el cerezo, por lo que puede cultivarse en climas con veranos más frescos. Pero soporta también veranos más cálidos que el cerezo.
Melocotonero	av, o más suaves	Casi M, o más cálidos	Hu, o riego	Se extiende un poco en climas con inviernos Ti (trigo cálido). Exigencias en frío más bajas que las del manzano. En plena floración puede soportar durante media hora, como máximo, temperaturas de -2,5°C. Media de las máximas del mes más frío ≤ 18°C. Se introduce un poco en climas con veranos T (trigo más cálido). Es sensible a las heladas tardías. No es resistente a la sequía, por lo que cuando el clima no es húmedo, hay que regarlo. Epoca más crítica: desde el endurecimiento del hueso hasta la maduración.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Ciruelo	ti, o más suaves	t, o más cálidos	Hu, o riego	Prunus Doméstica tiene aproximadamente la misma resistencia a los inviernos que el Manzano. Prunus Salicina tiene bajos requerimientos en frío y puede cultivarse en regiones con inviernos relativamente cálidos. Un clima que es bueno para el melocotonero, es también bueno para ciruelo; pero utilizando las variedades apropiadas, puede cultivarse en climas con inviernos muy fríos o muy cálidos para el melocotonero. Cuando se quiere producir ciruela-pasa se exige el mismo clima, pero con veranos secos (mediterráneos o desérticos).
— Otros de frutos carnosos Higuera	av, o más suaves	g, o más cálido	Sin riego, con Me, o más húmedos Con riego, me o desértico	Más resistente al invierno que el Olivo. El verano debe ser seco. Es resistente a la sequía.
Granado	Ci, o más suaves			Tan resistente a heladas como los Citricos. Muy poco exigente en frío. Menos que Prunus Salicina. Se cultiva en toda la cuenca mediterránea. En secano es poco productivo y los frutos son de baja calidad. No lo perjudican los climas más cálidos. Es más, los frutos mejoran en calidad.
Platanera	Ec, Tp, tp, tp	g, c, O	HU, Hu, MO, Mo, mo	Siete o más meses húmedos. Incluso en climas Hu, responde bien al riego. Con riego se puede cultivar incluso en el desierto.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Palmera dáttilera	<b>Ec, Tp, tP, Ct, Ci</b>	<b>G</b> (casi sin lluvias)	<b>da, de, di</b>	Es el más resistente a la sequía de todos los cultivos.
Piña (Ananás)	<b>Ec, Tp, tP, tp</b>	<b>g, c, O</b>	<b>HU, Hu, MO, Mo</b>	Clima casi sin heladas. Debe ser húmedo. El fruto es dañado por fuerte insolación.
<b>De fruto seco</b> Almendro	<b>Av, o más suaves</b>	<b>M, o más cálidos</b>	<b>Me, o riego</b>	Menos resistente al invierno que el Melocotonero. Sus exigencias en frío parecen también más bajas. Florece muy temprano y lo dañan las heladas tardías. Es resistente a la sequía, por lo que se puede cultivar en climas con régimen Mediterráneo seco, sin riego.
Nogal	<b>av, o más suave</b>	Casi <b>M</b> , o más cálidos	<b>Hu, o riego</b>	Menos resistente al frío que el manzano (MAM > -7°C). Exigencias en frío altas, quizás las mismas que las del manzano. Exige un verano fresco. No es resistente a la sequía.
Avellano	<b>av, o más suaves</b>	<b>M, o más cálidos</b>	<b>Hu, o riego</b>	Con menos exigencias en frío que el Manzano, pero más que el Melocotonero. Cuando se cultiva para el fruto exige inviernos suaves (MAM > -7°C). Los veranos deben ser frescos (Maiz).

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
<b>OTROS CULTIVOS</b> Vid	Ti, o más suaves	M, o más cálidos	Me, o riego	Exigencias en frío análogas a las del trigo. Las heladas tardías le causan daños. El verano no debe ser húmedo. Cuando el clima no es semiárido no necesita riego, pero éste incrementa la cosecha.
Olivo	av, o más suaves	O, es suficiente	Sin riego con <b>Me</b> , o más húmedos. Con riego, <b>me</b> o desérticos.	Más resistente al invierno que los Cítricos, pero menos que la avena, exige una MAM > -7°C. Exigencias en frío bajas, pero inviernos Citrus tropical ( <b>Ct</b> ) o Tropical cálido ( <b>Tp</b> ) son demasiado cálidos. Un verano Arroz ( <b>O</b> ) es suficientemente cálido para cubrir sus exigencias en calor. Resistente a la sequía.
Cafeto	Ec, Tp, tp, tp	g, c, O	<b>HU, Hu, MO, Mo</b>	Requiere noches frescas (media de las mínimas de todos los meses < 20°C). Climas sin heladas o casi. Periodo seco ≤ 4 meses si S < 500 mm y Ln ≥ 500 mm. En climas <b>HU</b> , surgen problemas.
Té	Ec, Tp, Ci, Av, av	G, g, O, M, T, t	<b>HU, Hu</b>	MAM > -7°C. Los mejores climas son ( <b>Ci, av; T, t; Hu</b> ) con media de las mínimas de todos los meses menor de 20°C y el mes con ETP más elevada es el anterior o el de solsticio de verano (Tierra fría alta húmeda). Humedad relativa alta. Exige una estación de crecimiento fresca y muy húmeda.

## APENDICE

### CULTIVOS TROPICALES

Henequén	23
Sisal	23

### CULTIVOS DE VERANO

— <b>Raíz</b>	
Ñame	23
Mandioca-Yuca	23
— <b>Textil</b>	
Yute	23
— <b>Oleaginosos</b>	
Ricino	24
Sésamo	24

### HORTALIZAS DE MEDIA ESTACION

Brecol	24
--------	----

### HORTALIZAS DE VERANO

#### FRUTALES CRIOFILOS

Castaño	24
Caqui	25

#### LEGUMINOSAS CRIOFILAS

Onobrychis	25
------------	----

#### GRAMINEAS TROPICALES NO CRIOFILAS

Hyparrhemia	25
Brachicaria	25
Pennisetum clandestinum	25
Chloris gayana	25

#### LEGUMINOSAS TROPICALES

Centrosema	25
Stylosanthes	25



## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
<b>CULTIVOS TROPICALES</b> Henequén	Casi Ci, Tp, Ec	G		Resiste heladas ligeras. Soporta una estación seca larga, pero para la recolección exige una estación húmeda de 4 o más meses, o riego.
Sisal	<b>Más suaves que Ci</b>	G		Exige climas casi sin heladas. Mismas exigencias en humedad que henequén.
<b>CULTIVOS DE VERANO</b> — Raíz Ñame (Dioscorea batata)		G, g, c, O		Período de crecimiento muy largo. Climas sin heladas. Tan resistente a la sequía como el Maiz. Exige suelos ricos.
Mandioca Yuca	<b>Ec, Tp, tP, tp</b>	G, g, c, O, T		Período de crecimiento más largo de un año, por lo que se cultiva en climas sin heladas. Tan resistente a la sequía como el algodón.
— Textil Yute		g, G		Exigencias en calor, quizás más altas que las del algodón. Una estación húmeda de 5 meses o más. Lluvia de lavado mayor de 600 mm. Latitud mayor de 20° (días largos). Planta de día corto, por lo que días largos retrasan la floración y permiten un mejor cultivo.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
— Oleaginosos Ricino		<b>c, g, G</b>		Muy semejante al algodón en sus exigencias climáticas. El ricino dura más de un año en climas tropicales. La lluvia de lavado debe ser baja, o el suelo muy permeable, pues lo daña la excesiva humedad del suelo.
Sésamo (Sesamum indicum)		<b>c, g, G</b>		Exigencias climáticas comparables a las del cacahuete. Exige suelos arenosos.
<b>HORTALIZAS DE MEDIA ESTACION</b>				
Brécol	<b>Ci</b> , o más suaves	<b>P</b> , o más cálidos		Con exigencias climáticas análogas a las de la Patata. Exigen una estación casi sin heladas, con noches que tengan bajas temperaturas.
	<b>av</b> , o más suaves	<b>T</b> , o más cálidos		Con menos exigencias que la Coliflor pues la no floración es menos de temer.
<b>HORTALIZAS DE VERANO</b>				
<b>FRUTALES CRIOFILOS</b> Castaño	<b>av</b> , o más suaves	<b>T</b> , o más cálidos	<b>Hu</b> , o riego	No son resistentes a las heladas. Exigencias en calor más bajas que las del Maíz; se extienden un poco en climas con veranos <b>T</b> . Se desarrollan mal a temperaturas inferiores a 15-20°C.

## EXIGENCIAS CLIMATICAS DE LOS CULTIVOS (Cont.)

CULTIVOS	Tipo Invierno	Tipo Verano	Régimen Humedad	OBSERVACIONES
Caqui (Diospyros)	av, o más suaves	g, o más cálidos	HU, Hu o MO	Exigencias en frío, relativamente bajas, pero más altas que las del trigo; no está bien adaptado a climas con invierno <b>Ct</b> . Soporta los veranos lluviosos.
<b>LEGUMINOSAS CRIOFILAS</b> Onobrychis	Hasta <b>ti</b>	Sin limitaciones		Más resistente que la alfalfa a la sequía. Se adapta mejor, en secano, en climas mediterráneo continental y mediterráneo templado que la alfalfa.
<b>GRAMINEAS TROPICALES</b> (no criófilas)				En general tienen un óptimo entre 30-35°C dejando de crecer con temperaturas menores de 15°C.
Hyparrhemia Brachiaria				Son resistentes a la sequía.
Pennisetum clandestinum (kikuyu grass)	<b>Ci</b> , o más cálidos			Exige noches frías. Resiste inviernos <b>Ci</b> . Vegeta en tierra templada y tierra fría.
Chloris gayana	<b>Ci</b> , o más cálidos			Resistente a la sequía. Vegeta bien en climas tropical y subtropical, monzónico húmedo y seco. Resiste inviernos <b>Ci</b> .
<b>LEGUMINOSAS TROPICALES</b> Centrosema				Exige climas húmedos ( <b>HU, Hu</b> ).
Stylosanthes				Soporta una S de 700 mm o más.



**CAPITULO IV**  
LIMITACIONES QUE EL CLIMA IMPONE A LOS CULTIVOS



## **CAPITULO IV**

### **LIMITACIONES QUE EL CLIMA IMPONE A LOS CULTIVOS**

Sobre la base de la delimitación zonal, que se recoge en el Capítulo II, y la información que proporciona el Capítulo III, en torno a las exigencias de los cultivos, se puede proceder a efectuar la valoración agronómica de aquellas zonas, desde el punto de vista del espectro de cultivos que en cada una de ellas puede vegetar.

Este tipo de valoración es factible, casi de forma automática, gracias a que previamente, el marco geográfico se ha traducido al mismo lenguaje que las exigencias de los cultivos; traducción que se materializa merced al sistema de clasificación ideado por J. Papadakis.

Desde un punto de vista agronómico, pues, este sistema se revela enormemente útil y justifica cualquier esfuerzo para lograr su difusión, perfeccionamiento y ajuste a las condiciones de nuestro país.

La forma en que se ha desarrollado la valoración se recoge en los cuadros que siguen. En ellos, para una zona y un cultivo dados, se evalúan los siguientes aspectos:

1. Las posibilidades o limitaciones de la zona para satisfacer las exigencias del cultivo en cuestión, estableciendo tres grados de adaptación.
2. Las posibilidades de siembra del cultivo en relación con las cuatro estaciones del año (otoño, invierno, primavera y verano).
3. Las posibilidades de conducir el cultivo en secano o en regadío.

De este modo, cada «tripleta», representativa de una zona geográfica, lleva debajo una relación de cultivos mejor o peor adaptados a las condiciones que la zona ofrece, desde los tres puntos de vista antes mencionados. Esa lista es lo que se viene denominando el espectro cultural de la zona, cuya mayor amplitud y calidad dará tanta mejor idea de las posibilidades que, desde una perspectiva estrictamente agroclimática, ofrece la zona para la producción agrícola.

# INDICE DE CULTIVOS OBJETO DE VALORACION

## CEREALES GRANO

- **De invierno**
  - Trigo
  - Cebada
  - Avena
  - Centeno
- **De primavera**
  - Arroz
  - Maíz
  - Sorgo
  - Mijo

## LEGUMINOSAS GRANO

- Judías secas
- Habas secas
- Lentejas
- Garbanzos
- Guisantes secos
- Veza
- Almortas
- Altramuz

## TUBERCULOS CONSUMO HUMANO

- Patata
- Batata
- Boniato

## CULTIVOS INDUSTRIALES

- **Azucareras**
  - Caña de azúcar
  - Remolacha azucarera
- **Textiles**
  - Algodón
  - Lino textil
  - Cáñamo textil
- **Oleaginosas**
  - Lino oleaginoso
  - Cáñamo semilla
  - Cacahuete
  - Girasol
  - Colza
  - Soja
- **Condimentos**
  - Pimiento pimentón
  - Mostaza
- **Varios**
  - Tabaco
  - Achicoria

## CULTIVOS FORRAJEROS

- **Gramineas**
  - Cereales invierno para forraje
  - Maíz forrajero
  - Sorgo forrajero
  - Lolium
  - Fleo
  - Agrostis
  - Poa
  - Dactylis
  - Festuca
  - Bromus
  - Phalaris
  - Paspalum dilatatum
- **Leguminosas**
  - Alfalfa
  - Veza para forraje
  - Tréboles
- **Raíces**
  - Nabo forrajero
  - Remolacha forrajera
  - Zanahoria forrajera
  - Chirivía
- **Varios**
  - Col forrajera
  - Calabaza

## HORTALIZAS

- **De hoja o tallo**
  - Col
  - Berza
  - Espárrago
  - Apio
  - Lechuga
  - Escarola
  - Espinaca
  - Acelga
  - Cardo
  - Achicoria verde
  - Endibia
  - Borraja
- **De fruto**
  - Sandía
  - Melón
  - Calabaza
  - Calabacín
  - Pepino
  - Pepinillo
  - Berenjena
  - Tomate
  - Pimiento
  - Fresa
  - Fresón

- **De flor**
  - Alcachofa
  - Coliflor
- **Raíces y bulbos**
  - Ajo
  - Cebolla
  - Cebolleta
  - Puerro
  - Remolacha de mesa
  - Zanahoria
  - Rábano
  - Nabo
- **Leguminosas**
  - Judías verdes
  - Guisantes verdes
  - Habas verdes

## CITRICOS

- Naranja
- Mandarino
- Limonero
- Pomelo
- Limero

## FRUTALES NO CITRICOS

- **De pepita**
  - Manzano
  - Peral
  - Membrillero
- **De hueso**
  - Albaricoquero
  - Cerezo
  - Guindo
  - Melocotonero
  - Ciruelo
- **Otros de frutos carnosos**
  - Higuera
  - Granado
  - Platanera
  - Palmera datilera
  - Piña
- **De fruto seco**
  - Almendro
  - Nogal
  - Avellano

## OTROS CULTIVOS

- Vid
- Olivo
- Cafeto
- Té



## INDICE DE ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

---

**I - av, O; Me**  
**Av, O; Me**

**II - Av, g, Me**  
**Ci, g, Me**

**III - Ci, G, Me**

### ABREVIATURAS EMPLEADAS

#### — TIPOS DE INVIERNO

**Ec** : Ecuatorial  
**Tp** : Tropical cálido  
**tP** : Tropical medio  
**tp** : Tropical fresco  
**Ct** : Citrus tropical  
**Ci** : Citrus  
**Av** : Avena cálido  
**av** : Avena fresco  
**Tv** : Trigo-avena  
**Ti** : Trigo cálido  
**ti** : Trigo fresco  
**Pr** : Primavera más cálida  
**pr** : Primavera más fresca

#### — TIPOS DE VERANO

**G** : Algodón más cálido  
**g** : Algodón menos cálido  
**c** : Cafeto  
**O** : Arroz  
**M** : Maíz  
**T** : Trigo más cálido  
**t** : Trigo menos cálido  
**P** : Polar cálido  
**p** : Polar frío  
**F** : Frígido (desér. subgl.)  
**f** : Frígido (helada perm.)  
**A** : Alpino bajo  
**a** : Alpino alto

#### — REGIMENES DE HUMEDAD

**HU** : Siempre húmedo  
**Hu** : Húmedo  
**ME** : Mediterráneo húmedo  
**Me** : Mediterráneo seco  
**me** : Mediterráneo semiárido  
**MO** : Monzónico húmedo  
**Mo** : Monzónico seco  
**mo** : Monzónico semiárido  
**St** : Estepario  
**da** : Desértico absoluto  
**de** : Desértico mediterráneo  
**di** : Desértico isohigro  
**do** : Desértico monzónico

#### — OTRAS SIGLAS

**MAM** : Temperatura media de las mínimas absolutas anuales.  
**S** : Déficit de humedad ( $R = O$ )  
**Ln** : Exceso de humedad ( $R = O$ )  
**ETP** : Evapotranspiración potencial.

## CODIGOS EMPLEADOS EN LA VALORACION AGRONOMICA

- 2 Cumple con los requisitos exigidos por el cultivo
- 1 Cumple con los requisitos, pero con limitaciones
- 0 No se cumplen los requisitos exigidos por el cultivo
- p Siembra en primavera
- v Siembra en verano
- o Siembra en otoño
- i Siembra en invierno
- T Siembra en las cuatro estaciones del año, optativo
- s Cultivo en seco
- r Cultivo en regadío

\* Cuando aparecen las siglas **p, v, o, i** combinadas entre sí, quiere decir que la época de siembra es optativa.

\* Cuando aparecen las siglas **s, r** combinadas entre sí, quiere decir que la forma de cultivo es optativa bien porque se puedan dar las dos posibilidades, bien porque dependa de la época de siembra.

## OBSERVACIONES

- c) Temperaturas  $> 29^{\circ}\text{C}$ , detienen la tuberización
- d) "  $> 38^{\circ}\text{C}$ , disminuyen el rendimiento
- e) "  $> 35^{\circ}\text{C}$ , destruyen el polen
- f) "  $> 25^{\circ}\text{C}$ , limitan la producción
- h) "  $> 35^{\circ}\text{C}$ , limitan la producción
- k) Con temperaturas media de las mínimas absolutas anuales (MAM)  $> -7^{\circ}\text{C}$ , en siembra otoñal.
- m) Con MAM  $> -7^{\circ}\text{C}$ .
- n) Con MAM  $\geq -4^{\circ}\text{C}$ , en siembra otoñal.
- l) 1 en siembra otoñal.
- u) Cuando la media de las mínimas del mes más cálido sea  $> 20^{\circ}\text{C}$ , será 1.

## VALORACION AGRONOMICA DE LAS ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

ZONAS	av,O;Me	Av,O;Me	Av,g;Me	Cl,g;Me	Cl,G;Me
CULTIVOS	I		II		III
<b>CEREALES GRANO</b>					
<b>-- De invierno</b>					
Trigo	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Cebada	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Avena	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Centeno	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
<b>-- De primavera</b>					
Arroz	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	1,p,r	1,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r
Maiz	2 <sup>eu</sup> ,p,r	2 <sup>eu</sup> ,p,r	1,p,r	1,p,r	1,p,r
Sorgo	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr
Mijo	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr
<b>LEGUMINOSAS GRANO</b>					
Judías secas	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	1,p,r	1,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r
Habas secas	2 <sup>n</sup> ,op,sr	2 <sup>n</sup> ,op,sr	2 <sup>n</sup> ,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Lentejas	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,o,sr	2,o,sr
Garbanzos	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,op,sr	2,o,sr
Guisantes secos	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Veza	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Almortas	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Altramuz	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
<b>TUBERCULOS CONSUM. HUM.</b>					
Patata	2 <sup>cu</sup> ,p,r	2 <sup>cu</sup> ,p,r	2 <sup>cu</sup> ,pv,r	2 <sup>cu</sup> ,pv,r	2 <sup>cu</sup> ,pv,r
Batata	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r
Boniato	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r
<b>CULTIVOS INDUSTRIALES</b>					
<b>-- Azucareras</b>					
Caña de azúcar	0	0	0	1,r	2 <sup>u</sup> ,r
Remolacha azucarera	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	1,p,r	2 <sup>u</sup> ,op,r	2 <sup>u</sup> ,op,r
<b>-- Textiles</b>					
Algodón	0	0	2,p,sr	2,p,sr	2 <sup>d</sup> ,p,sr
Lino textil	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	1,p,r	1,op,r	2 <sup>u</sup> ,op,r
Cáñamo textil	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r
<b>-- Oleaginosas</b>					
Lino oleaginoso	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,op,r	2,op,r
Cáñamo semilla	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r
Cacahuete	0	0	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr

## VALORACION AGRONOMICA DE LAS ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

ZONAS	av,O;Me	Av,O;Me	Av,g;Me	Cl,g;Me	Cl,G;Me
<b>CULTIVOS</b>	<b>I</b>		<b>II</b>		<b>III</b>
Girasol	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr
Soja	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	1,p,r	1,p,r	1,p,r
<b>— Condimentos</b>					
Pimiento pimentón	2 <sup>h</sup> ,pv,r	2 <sup>h</sup> ,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2 <sup>h</sup> ,pv,r
<b>— Varios</b>					
Tabaco	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r
Achicoria	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>					
<b>— Gramíneas</b>					
Cereales invierno forrajeros	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Maíz forrajero	2 <sup>eu</sup> ,p,r	2 <sup>eu</sup> ,p,r	1,p,r	1,p,r	1,p,r
Sorgo forrajero	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr
Lolium	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Fleo	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Agrostis	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Poa	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Dactylis	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Festuca	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Bromus	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Phalaris	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Paspalum dilatatum	2,p,r	2,op,r	1,op,r	1,op,r	2,op,r
<b>— Leguminosas</b>					
Alfalfa	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Veza para forraje	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Trébol	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Trifolium hybridum	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Trifolium repens	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Trifolium pratense	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
Trifolium subterraneum	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,r	2,op,sr
Trifolium alexandrinum	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,op,r	2,op,r
Trifolium incarnatum	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
<b>— Raíces</b>					
Nabo forrajero	1,o,r	2,o,r	2,o,r	2,o,r	2,o,r
Remolacha forrajera	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	1,p,r	2 <sup>u</sup> ,op,r	2 <sup>u</sup> ,op,r
Zanahoria forrajera	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2,opv,r	2,opv,r
Chirivía	2,ipv,r	2,ipv,r	2,ipv,r	2,ipv,r	2,ipv,r

**VALORACION AGRONOMICA  
DE LAS ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES**

ZONAS	av,O;Me	Av,O;Me	Av,g;Me	Cl,g;Me	Cl,G;Me
CULTIVOS	I		II		III
<b>-- Varios</b>					
Col forrajera	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Calabaza	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,op,sr	2,op,sr
<b>HORTALIZAS</b>					
<b>-- De hoja o tallo</b>					
Col	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Berza	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Espárrago	2,r	2,r	2,r	2,r	1,r
Apio	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Lechuga	2,pv,r	2,pv,sr	2,pv,r	2,opv,r	2,opv,r
Escarola	2,T,r	2,T,r	2,T,r	2,T,r	2,T,r
Espinaca	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2,opv,r	2,opv,r
Acelga	2,opv,r	2,opv,r	2,opv,r	2,opv,r	2,opv,r
Cardo	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r	2,p,r
Achicoria verde	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Endibia	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Borraja	2,v,r	2,v,r	2,v,r	2,v,r	2,v,r
<b>-- De fruto</b>					
Sandía	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr
Melón	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,op,sr	2,op,sr
Calabaza	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,op,sr	2,op,sr
Calabacín	2,p,sr	2,p,sr	2,p,sr	2,op,sr	2,op,sr
Pepino	2 <sup>f</sup> ,p,r	2 <sup>f</sup> ,p,r	2 <sup>f</sup> ,p,r	2 <sup>f</sup> ,op,sr	2 <sup>f</sup> ,op,sr
Pepinillo	2 <sup>f</sup> ,p,r	2 <sup>f</sup> ,p,r	2 <sup>f</sup> ,p,r	2 <sup>f</sup> ,op,sr	2 <sup>f</sup> ,op,sr
Berenjena	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Tomate	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Pimiento	2 <sup>h</sup> ,pv,r	2 <sup>h</sup> ,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2 <sup>h</sup> ,pv,r
Fresa	2,r	2,r	2,r	2,r	2,r
Fresón	2,r	2,r	2,r	2,r	2,r
<b>-- De flor</b>					
Alcachofa	2 <sup>m</sup> ,r	2 <sup>m</sup> ,r	2 <sup>m</sup> ,r	2,r	1,r
Coliflor	2 <sup>f</sup> ,pv,r	2 <sup>f</sup> ,pv,r	2 <sup>f</sup> ,pv,r	2 <sup>f</sup> ,pv,r	2 <sup>f</sup> ,pv,r
<b>-- Raíces y bulbos</b>					
Ajo	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr
Cebolla	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr
Cebolleta	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr

## VALORACION AGRONOMICA DE LAS ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES

ZONAS	av,O;Me	Av,O;Me	Av,g;Me	Cl,g;Me	Cl,G;Me
<b>CULTIVOS</b>	I		II		III
Puerro	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr	2 <sup>u</sup> ,op,sr
Remolacha de mesa	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r	2,pv,r
Zanahoria	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2 <sup>k</sup> ,opv,r	2,opv,r	2,opv,r
Rábano	2,opv,r	2,opv,r	2,opv,r	2,opv,r	2,opv,r
Nabo	2 <sup>l</sup> ,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r	2,op,r
<b>— Leguminosas</b>					
Judías verdes	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,p,r	2 <sup>u</sup> ,pv,r	2 <sup>u</sup> ,pv,r	2 <sup>u</sup> ,pv,sr
Guisantes verdes	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
Habas verdes	2 <sup>n</sup> ,op,sr	2 <sup>n</sup> ,op,sr	2 <sup>n</sup> ,op,sr	2,op,sr	2,op,sr
<b>CITRICOS</b>					
Naranja	0	0	0	2,r	2,r
Mandarino	0	0	0	2,r	2,r
Limonero	0	0	0	2,r	2,r
Pomelo	0	0	0	2,r	2,r
Limero	0	0	0	2,r	2,r
<b>FRUTALES NO CITRICOS</b>					
<b>— De pepita</b>					
Manzano	2 <sup>du</sup> ,r	2 <sup>adu</sup> ,r	1,r	1,r	2 <sup>adu</sup> ,r
Peral	2,r	2,r	2,r	2,r	2,r
Membrillero	2,r	2,r	2,r	2,r	2,r
<b>— De hueso</b>					
Albaricoquero	2,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r
Cerezo	2 <sup>u</sup> ,r	2 <sup>u</sup> ,r	1,r	1,r	2 <sup>u</sup> ,r
Guindo	2,r	2,r	2,r	2,r	2,r
Melocotonero	2,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r
Ciruelo	2,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r	2 <sup>b</sup> ,r
<b>— Otros de frutos carnosos</b>					
Higuera	1,sr	1,sr	2,sr	2,sr	2,sr
Granado	0	0	0	2,sr	2,sr
Platanera	0	0	0	0	0
Palmera datilera	0	0	0	1,sr	2,sr
Piña	0	0	0	0	0
<b>— De fruto seco</b>					
Almendra	2,sr	2,sr	2,sr	2,sr	2,sr
Nogal	2 <sup>mu</sup> ,r	2 <sup>mu</sup> ,r	1 <sup>m</sup> ,r	1,r	2 <sup>u</sup> ,r
Avellano	2 <sup>mu</sup> ,r	2 <sup>mu</sup> ,r	1 <sup>m</sup> ,r	1,r	2 <sup>u</sup> ,r





**SUMMARY**



## SUMMARY

The present publication, entitled «An Agroclimatic Characterization of the province of Cordoba», sets out to establish the limitations and possibilities of, and the prospects for, agricultural production.

In the preparation of this study, a most exhaustive analysis has been carried out of the two most important climatic elements —temperature and rainfall— both separately and in combination. An analysis has also been made of the relationship between climate and vegetation in both its qualitative and quantitative aspects, referring both to natural and cultivated vegetation.

The final analysis has a mesoclimatic character and is based on the selected provincial meteorological network (14 TP and C stations and 51 P stations). The basic period of study has been that of the forty years between 1940-80.

The study and its conclusions have been presented in the following way:

— In the first chapter, there is a description of the climatic elements which, in accordance with the adopted criteria, have most influence upon vegetable life (average temperatures, statistical analysis of temperatures, cold period, warm period, average rainfall, statistical analysis of rainfall, potential evapotranspiration, dry period) and the classification systems used for agroclimatic characterization (the classification of the J. Papadakis; the index of agricultural potentiality C.A. of L. Turc; phytoclimatic indices of De Martonne and Gams; and graphs of Walter and Lieth).

— In chapter two, there is, in a summarised form, an exposition of some characteristics of the temperature and humidity patterns, and of the classifications employed.

— In the third chapter, there is an explanation, in the form of a synopsis, of cultivation requirements for the different types of winter and summer conditions and humidity patterns, as defined by J. Papadakis. In addition, the chapter contains relevant observations for a better assessments.

In the chapter four, there is an outline of the limitations which the climate of the zones impose upon cultivation. This is presented by means of a code of numbers and letters which evaluate these limitations from an agronomic viewpoint:

1. Its possibilities of meeting the demands of each crop, according to three degrees of adaption.
2. The sowing possibilities for each crop, determined in relation to the four seasons of the year (autumm, winter, spring and summer).
3. The possibility or need for raising the crop on irrigated or unirrigated land.

The support of this evaluation is mainly found in the agricultural experience of the different regions of Spain. This experience has been unpublished or highly dispersed until now, even when the general guidelines established by the author of the classification system have been followed. One hundred and twenty-one crops are considered in each zone, and grouped in the following way:

- **Grain cereals** (8): winter types (4), spring types (4).
- **Grain legumes** (8): for human consumption (5), for animal consumption (3).
- **Tubers for human consumption** (3).
- **Industrial crops** (15): sugar products (20), textile products (3), oleaginous products (6), seasoning products (92), miscellaneous (2).
- **Forage crops** (27): gramineae (12), leguminosae (9), root crops (4), miscellaneous (2).
- **Vegetables** (35): leaf or stem products (12), fruit products (10), flower products (2), roots and bulbs (8), leguminosae (3).
- **Citric fruits** (5).
- **Non-citric fruits** (16): pip fruits (3), stone fruits (5), other pulpy fruits (5), nuts (3).
- **Other crops** (4): grapes, olives, coffee and tea.

## **BIBLIOGRAFIA**



## BIBLIOGRAFIA

**ALDRICH (Samuel R.) y LENG (Earl R.) (1969)**

«Modern Corn Production». The Farm Quarterly, Cincinnati, Ohio.

**ALLUE, (J.L.) (1961)**

«Subregiones Fitoclimáticas de España». I.F.I.E. - Madrid.

**ANDERLINI, (R.) (1970)**

«El cultivo del tomate». Mundi Prensa - Madrid.

**ANGLADETTE, (André) (1969)**

«El arroz. Técnicas agrícolas y Producciones tropicales». Ed. Blume - Barcelona.

**ANONIMO (1958)**

«Plantas Forrajeras y Pratenses». Ministerio de Agricultura.  
Dirección Generalde Agricultura - Madrid.

**ARLERY, (R.), GRISOLLET, (H.) y GUIMET, (B.) (1973)**

«Climatologie. Méthodes et Pratiques».  
Gauthier - Villars - Paris.

- ARNON, (I.) (1958)**  
«The improvement of natural pasture in the mediterranean region».  
Herbage Abstracts 28 - 4. Review article.
- ARNON, (I.) (1972)**  
«Crop production in dry regions».  
Leonard Hill - London.
- AZZI, (G.) (1969)**  
«Ecología Agraria». Salvat - Barcelona.
- BLACK, (J.N.)**  
«The distribution of solar radiation over the Earth's Surface».
- BOLTON, (J.L.) (1962)**  
«Alfalfa. Botany, Cultivation and Utilization».  
Nueva York - Londres.
- BONANAD, (S.) y ESCRIVA, (A.) (1969)**  
«El nispero».  
Hoja divulgadora nº 5-6/69 H. - Ministerio de Agricultura.
- CABANEL, (H.) (1969)**  
«Noix et noyers».  
Pierre Fanlac - Périgueux.
- CALAMBERT, (J.) (1972)**  
«L'amélioration des parcours dans les pays méditerranéens en voie de développement».  
Semaine d'étude des problèmes méditerranéens. Gembloux.
- CARTTER, (J.L.) y HATWIG, (E.E.) (1962)**  
«The management of soybeans».  
Adv. Agron., 14.
- CASALLO, (A.) y SOBRINO, (E.) (1965)**  
«Variedades de hortalizas cultivadas en España».  
Publicaciones del Ministerio de Agricultura - Madrid.
- CENTRE D'ETUDE DE L'AZOTE (1962)**  
«Maize Production and the Manuring of Maize».  
Ginebra.
- CERVANTES, (M.) (1968)**  
«El chirimoyo».  
Serie Técnica nº 31 - Ministerio de Agricultura.
- CERVERO, (V.) (1970)**  
«Cultivo del pistachero».  
Levante Agrícola nº 101.
- CLEMENT-GRANCOURT, (M.) y PRATS, (J.) (1969)**  
«Los cereales».  
Ed. Mundi-Prensa - Madrid.
- COOPER, (J.P.) y TANTON, (N.M.) (1968)**  
«Light and Temperature requirements for the growth of tropical and temperate grasses».  
Herbage Abstracts 38 - 3.

- COOPER, (J.P.) (1970)**  
«Potential Production and energy conversion in temperate and tropical grasses».  
Herbage Abstracts 40-1.
- CORNEJO, (J.) (1965)**  
«Cultivo de la berengena».  
Hoja divulgadora nº 2-75 H. - Ministerio de Agricultura.
- CORNELIUS, (D.R.) y BURMA, (G.D.)**  
«Seeding and seedbed ridging to improve dry grazing land in central California».  
Proc. XI Int. Grassl. Cong.
- CHANG, (Jen-Hu) (1974)**  
«Climate and Agriculture».  
Aldine Publishing Company - Chicago.
- CHAUX, (Claude) (1972)**  
«Productions Légumières».  
Editions J.-B. Baillière - Paris.
- DE LAS CASAS, (G.) y LOVERA, (C.) (1973)**  
«Precisiones sobre el criterio temporal de selección de estaciones meteorológicas».  
Doc. Técnica Interna de la D.G.P.A. - Ministerio de Agricultura - Madrid.
- DE LEON, (A.), FORTEZA DEL REY, (V. y M.), DE LAS CASAS, (G.) y LOVERA, (C.) (1974)**  
«Caracterización Agroclimática de la Provincia de Murcia».  
Ministerio de Agricultura - Madrid.
- DE LEON, (A.), FORTEZA DEL REY, (V. y M.), LATORRE, (S.) y MAZA, (E.) (1976)**  
«Caracterización Agroclimática de la Provincia de Huesca».  
Ministerio de Agricultura - Madrid.
- DE LEON, (A.), FORTEZA DEL REY, (V. y M.), (1979)**  
«Atlas Agroclimático Nacional de España».  
Ministerio de Agricultura - Madrid.
- DE MARTONNE, (E.) (1964)**  
«Tratado de geografía física». Tomo I.  
Juventud, S. A. - Barcelona.
- DE TERAN, (M.), SOLE SABARIS, (L.) y otros (1968)**  
«Geografía Regional de España».  
Edic. Ariel - Barcelona.
- DEL POZO, (M.) (1971)**  
«La Alfalfa. Su cultivo y aprovechamiento».  
Ed. Mundi-Prensa - Madrid.
- DUNCAN, (W.G.) (1976)**  
«Maize». Crop Physiology. Ed. by T. Evans. Cambridge University. Press.
- DUTHIL, (J.) (1967)**  
«Producción de Forrajes».  
Ed. Mundi-Prensa - Madrid.
- ELIAS, (F.) y GIMENEZ, (R.) (1965)**  
«Evapotranspiraciones y Balances de agua en España».  
Ministerio de Agricultura - Madrid.

- ELIAS, (F.) y GIMENEZ, (R.) (1966)**  
 «Introducción al estudio climático del algodónero».  
 I.N.I.A. Cuadernos nº 397.
- ELIAS, (F.) (1968)**  
 «El clima como factor ecológico».  
 Conclusiones del Curso-seminario de Ecología Vegetal de la E.T.S.I.A. de Madrid. (Sin publicar).
- ELIAS, (F.) (1973)**  
 «Apuntes de Meteorología Agrícola». Fascículo I.  
 E.T.S.I. Agrónomos - Madrid.
- ELIAS, (F.) (1973)**  
 «Estudio Agroclimático de la Cuenca del Duero».  
 I.N.I.A. - Madrid.
- ELIAS, (F.) y RUIZ, (L.) (1973)**  
 «Clasificación Agroclimático de España, basada en la clasificación ecológica de J. Papadakis».  
 I.M.N. - Madrid.
- ELIAS, (F.) (1973 y 1974)**  
 «Sobre el período frío y criterios para su definición de España. Sobre el balance de agua y su ejecución en España».  
 (Comunicaciones personales ) - Madrid.
- ELIAS, (F.), GARCIA (L.) y RUIZ, (L.) (1977)**  
 «Estudio de heladas en España».  
 I.M.N. - Madrid.
- ELIAS, (F.) y otros (1986)**  
 «Caracterización Agroclimática de Navarra».  
 Consejería de Agricultura de Navarra y MAPA. Madrid.
- EMBERGER, (L.) (1930)**  
 «Sur une formule climatique applicable en géographie botanique».  
 C.R. Acad. des Sciences, 191.
- EMBERGER, (L.) (1942)**  
 «Un projet d'une classification des climats du point de vue phytogéographique».  
 Bull. Soc. Hist. Nat. - Toulouse.
- EMBERGER, (L.), GAUSSEN, (H.), KASSAS, (M.) y DE PHILIPPS, (A.) (1963)**  
 «Carte bioclimatique de la zone méditerranéenne; notice explicative».  
 UNESCO-FAO
- EMBERGER, (L.) (1970)**  
 «Travaux de botanique et d'écologie».  
 Masson et Cie. - Paris.
- EUVERTE, (G.) (1967)**  
 «Les climats et l'Agriculture».  
 P.U.F. - Paris.
- FORTEZA DEL REY, (M.) (1973)**  
 «Estudio, para España, de la variación en el régimen de humedad de J. Papadakis, al introducir la evapotranspiración de Thornthwaite».  
 Docum. técn. int. de la D.G.P.A. - Ministerio de Agricultura - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) (1979)**

«Estudio del período cálido de España».  
Docum. técn. int. de la D.G.P.A. - Ministerio de Agricultura - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1980)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Santander».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1980)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de León».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1980)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Palencia».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1980)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Oviedo».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1981)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Guadalajara».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1981)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de La Rioja».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1981)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Soria».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1984)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Avila».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1985)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Teruel».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1985)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Salamanca».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1985)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Cáceres».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (M.) y otros (1985)**

«Caracterización Agroclimática de la provincia de Badajoz».  
Departamento de Agroclimatología. Sección de Inventarios y Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Madrid.

**FORTEZA DEL REY, (V.),LOVERA, (C.), DE LAS CASAS, (G.), DE LEON, (A.) y FLORES, (V.) (1972)**

«Caracterización productiva de los pastizales de secano. Aproximación a una metodología».  
Ministerio de Agricultura - Madrid.

**FROMENT, (D.) (1972)**

«Etablissement des cultures fourragères d'Atriplex en Tunisie centrale».  
Semaine d'étude des problèmes méditerranéens. Gembloux.

**FROMENT, (D.) (1972)**

«L'exploitation pastorale des steppes tunisiennes».  
Semaine d'étude des problèmes méditerranéens. Gembloux.

**GARCIA, (M.) (1969)**

«Cultivo del tomate de invierno en el S.E. español».  
Serie Técnica nº 40 - Ministerio de Agricultura.

**GARCIA FERNANDEZ, (J.) (1958)**

«Cereales de invierno».  
Ed. Dossat, S. A. - Madrid.

**GIL-ALBERT, (F.) (1969)**

«Consideraciones sobre los factores limitativos en fruticultura: Horas-frío acumuladas en diversos observatorios españoles».  
I.N.I.A. - Madrid.

**GISCARD, (R.) (1952)**

«Les prairies permanentes au Maroc».  
Editions R.I.P. Sale (Maroc).

**GONZALEZ-SICILIA, (E.) (1968)**

«El cultivo de los agrios».  
I.N.I.A. - Madrid.

**GORINI, (F.) (1970)**

«El cultivo de la espinaca».  
Acribia - Zaragoza.

**HAVARD, (B.) (1969)**

«Las plantas forrajeras tropicales».  
Ed. Blume - Barcelona.

**HUGHES, HEATH y METCALFE (1966)**

«Forrajes».  
C.E.C.S.A. - México.

**HUTTON, (E.M.) (1970)**

«Australian research in pasture plant introduction and breeding».  
Proc. XI Int. Grassl. Congr.

**HYCKA, (M.) (1961)**

«Eragrostis cúrvara como pasto de otoño e invierno».  
II Reunión S.E.E.P.

- HYCKA, (M.) (1964)**  
«Praderas de secano».  
C.E. Aula Dei. - Zaragoza.
- HYCKA, (M.) (1970)**  
«Veza común, su cultivo y utilización».  
E.E.A.D. (2.ª edición) - Zaragoza.
- I.N.V.U.F.L.E.C. (1969)**  
«El Melón».  
Ed. Acribia - Zaragoza.
- I.N.V.U.F.L.E.C. (1970)**  
«La judía verde».  
Ed. Acribia - Zaragoza.
- I.N.V.U.F.L.E.C. (1970)**  
«El pimiento».  
Ed. Acribia - Zaragoza.
- KARPER, (R.) y JONES, (D.L.) (1931)**  
«Grain Sorghum date planting and spacing experiments».  
Bull. Tex. Agric. Exp. Stn. 424.
- LAUMONNIER, (R.) (1960)**  
«Cultures fruitières méditerranéennes».  
J.-B. Baillière et fils - Paris.
- LAUMONNIER, (R.) (1963)**  
«Cultures Maraichères».  
J.-B. Baillière et fils - Paris.
- LAUTENSACH, (H.) (1967)**  
«Geografía de España y Portugal».  
Ed. Vicens Vives.
- LAZENBY, (A.) y SWAIN, (F.G.) (1972)**  
«Pasture Species in intensive pasture Production».  
Angus and Robertson.
- LEVITT, (J.) (1972)**  
«Responses of plants to environmental stresses».  
Academic Press. New-York and London.
- LOVERA, (C.) y DE LAS CASAS, (G.) (1973)**  
«Número de días con temperaturas superiores a un umbral».  
Docum. técnica interna de la D.G. de la P.A. - Ministerio de Agricultura - Madrid.
- LOVERA, (C.), DE LEON, (A.), DE LAS CASAS, (G.) y FOTEZA DEL REY, (V.) (1977)**  
«Caracterización Agroclimática de la Provincia de Córdoba».  
Ministerio de Agricultura - Madrid.
- MATZ, (Samuel A.), PH. D. (1969)**  
«Cereal Science».  
Westport, Connecticut. The Avi Publishing Company, Inc.
- MIRO-GRANADA, (L.) (1962)**  
«Comportamiento de algunas especies forrajeras ensayadas en diversos medios áridos y semiáridos de España».  
Proc. of the Madrid Symposium.  
ARID ZONE RESEARCH UNESCO.

**MIRO-GRANADA, (L.) (1963)**

«Mejora de praderas por siembra en el Oeste español, en condiciones de clima semiárido y seco-subhúmedo».

IV Reunión Científica de la S.E.E.P., Dirección General de Agricultura - Madrid.

**MIRO-GRANADA, (L.) (1964)**

«Mejora de praderas y pastizales».

VII Reunión del Grupo de Trabajo de la FAO para el desarrollo de pastos y forrajes en la Cuenca Mediterránea - Madrid.

**MONTERRAT, (P.) (1960)**

«Plant ecology and pasture problems in the Mediterranean provinces of Spain».

Proc. 8th. Int. Grassl. Congr.

**NORMAN, (A.G.) (1963)**

«The soybean».

Nueva York - Londres.

**ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL**

«Resolución 111 del Congreso de Varsovia (1935)» y «Notas técnicas».

Ginebra - Suiza.

**ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL**

«Guide to Agricultural Meteorological Practices».

Ginebra - Suiza.

**ORTIZ, (J.L.) (1972)**

«La Colza (colzas de invierno y primavera)».

Rev. Agricultura XLI - 178.

**PAPADAKIS, (J.) (1960)**

«Geografía Agrícola Mundial».

Salvat Editores, S.A. - Barcelona - Madrid.

**PAPADAKIS, (J.) (1966)**

«Climates of the world and their agricultural potentialities».

Buenos Aires.

**PEDELABORDE, (P.) (1970)**

«Introduction à l'étude scientifique du climat».

S.E.D.E.S. - París.

**PEGUY, (Ch. P.) (1970)**

«Précis de Climatologie».

Masson et Cie. - París.

**PETERS, (D.B.), PENDLETON, (J.W.), HAGEMAN, (R.H.) y BROWN, (C.M.) (1971)**

«Effect of night air temperature on grain yield of corn, wheat and soybean».

Agr. J. 63, 809.

**PIRE, (J.M.) (1964)**

«El trébol subterráneo».

I.N.P.S.S. - Madrid.

**PITA CARPENTER, (A.) (1968)**

«Clima y Vegetación Arbórea. Aplicaciones a la Península Ibérica».

Servicio Meteorológico Nacional - Madrid.

**REBOUR, (H.) (1968)**

«Fruits Méditerranéens, autres que les agrumes».  
La Maison Rustique - Paris.

**REBOUR, (H.) (1970)**

El Pacano o de pacana «Nogal de los países cálidos».  
Levante Agrícola nº 101.

**REBOUR, (H.) (1971)**

«Frutales Mediterráneos».  
Ed. Mundi-Prensa - Madrid.

**REINOSO, (D.) (1972)**

«El pistachero o alfonsigo».  
Hoja divulgadora 14-72 H - Ministerio de Agricultura.

**REMY, (P.) (1961)**

«Facteurs écologiques déterminants dans le choix des variétés de pommier».  
Bull. Inst. Agrom. Gx. Hors Serie 3.

**RIVAS, (S.) y ALVARES, (S.) (1944)**

«Acerca del índice de higrocontinentalidad de Gams».  
Anales Farmacognosia nº 5 - Madrid.

**RIVAS, (S.) y ALVARES, (S.) (1945)**

«La higrocontinentalidad como factor fitoclimático».  
Far. nuev. nº 104 - Madrid.

**RIVAS, (S.) y FERNANDEZ-GALIANO, (E.) (1948)**

«Representación gráfica del índice fitoclimático de higrocontinentalidad, de sus formaciones y plantas indicadoras».  
Anales Farmacognosia nº 13 - Madrid.

**RIVAS, (S.) (1949)**

«La aridez e hidrocontinentalidad en las provincias de España y su relación con las comunidades vegetales climáticas (climax)».  
Anales de Jardín Botánico de Madrid.

**RIVAS GODAY, (S.) (1960)**

«Prontuario de Ecología Vegetal».  
Ministerio de Educación Nacional - Madrid.

**RIVAS GODAY, (S.) y RIVAS MARTINEZ, (S.) (1963)**

«Estudio y Clasificación de los pastizales Españoles».  
Ministerio de Agricultura.

**RIVAS GODAY, (S.) (1966)**

«Vegetación y Flórula de la Cuenca Extremeña del Guadiana».  
Excma. Diputación de Badajoz.

**ROQUERO, (C.) (1964)**

«El medio natural como factor limitativo y condicionantes de la Agricultura Española».  
Boletín de Estudios Económicos. Deusto.

**ROSSITER, (R.C.) (1956)**

«Ecology of the mediterranean annualtype pasture».  
Adv. in Agronomy 18.

- RUEDA, (F.) (1966)**  
 «El aguacate».  
 Hoja divulgadora n° 19 66H - Ministerio de Agricultura.
- SPEDDING, (C.R.W.) (1971)**  
 «Grassland Ecology» - Oxford.
- PUTT, (E.D.) (1963)**  
 «Sunflowers» Fld. Crop Abstr. 16.
- SALA, (F.) y CARPINTERO, (C.) (1967)**  
 «La alcachofa».  
 Serie A - Manuales Técnicos n° 40 - Ministerio de Agricultura.
- SANCHEZ-CAPUCHINO, (J.A.) (1966-67)**  
 «Contribución al conocimiento de necesidades en frío invernal de variedades frutícolas».  
 Levante Agrícola n° 59, 60 y 62.
- SEMPLE, (A.T.) (1970)**  
 «Grassland Improvement».  
 Leonard Hill.
- SERRANO, (Z.) (1973)**  
 «Cultivo del calabacín».  
 Hoja divulgadora n° 7-73 H - Ministerio de Agricultura.
- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL**  
 «Indicativo de estaciones» - «Boletines mensuales climatológicos» - «Calendarios Meteorológico-Fenológicos».
- SHORT, (B.F.) (1973)**  
 «Especies para praderas de secano en el Suroeste I. Tréboles Subterráneos».  
 A.D.G. Sevilla.
- SIKKA, (S.M.) y DASTUR, (R.H.) (1960)**  
 «Climate and soils in cotton in India».
- TABUENCA, (M.C.) (1964-1972)**  
 «Anales de la Estación Experimental de Aula Dei».  
 Vol. 7 (3-4). Vol. 9 (1). Vol. 10 (4). Vol. 11 (3-4).
- TABUENCA, (M.C.) (1965)**  
 «Influencia del clima en plantaciones frutales».  
 Boletín número 8. Aula Dei.
- TABUENCA, (M.C.) (1973)**  
 «Factores limitantes del clima en el cultivo frutal».  
 I.T.E.A. 4:10.
- TAMES, (C.) (1949)**  
 «Bosquejo del Clima de la Península Ibérica, según la clasificación de Thornthwaite».  
 Ministerio de Agricultura.
- THARP, (W.H.) (1960)**  
 «The Cotton plant how it grows and why its growth varies».  
 U.S. Dept. Agric. Handbook 178.
- THORNTHWAITE, (C.W.) (1948)**  
 «An approach towards a rational classification of climate».  
 Geogr.Rev. vol. 38.

**THORNTHWAITE, (C.W.) y MATHER, (J.R.) (1954)**

«Climate in relation to crops».  
Meteorol. Monographs, t. 2, nº 8.

**THRAN, (P.) y BROEKHUIZEN, (S.) (1965)**

«Agroclimatic Atlas of Europe». (Volum. I).  
Elsevier Publishing Company - Amsterdam, Londres, Nueva York.

**TURC, (L.) (1967)**

«Incidence des facteurs macroclimatiques sur les productions végétales».  
Fourrages nº 31.

**TURC, (L.) (1967)**

«Calcul du bilan de L'eau. Evaluation en fonction des précipitations et des températures».  
Assoc. Internat. d'Hydrologie nº 38.

**TURC, (L.) y LECERF, (H.) (1972)**

«Indice climatique de potentialité agricole».  
Science du sol. nº 2.

**UNESCO (1958)**

«Climatology and microclimatology, Proceedings of the Canberra Symposium».  
Arid zone research, XI - Paris.

**UNESCO (1961)**

«Echanges hydriques des plantes en milieu aride ou semi-aride. Compte-rendu des recherches».  
Recherches sur la zone aride, XV - Paris.

**UNESCO (1968)**

«Agroclimatological methods, Proceedings of the Reading Symposium».  
Natural resources research, VII - Paris.

**UNESCO (1973)**

«Plant response to climatic factors».  
Proceedings of the Uppsala Symposium. Edited by R.O. Slatyer - Paris.

**VARIOS (1967)**

«La lechuga: Cultivo y comercialización».  
Oikos-tau, S. A. - Barcelona.

**VILLAX, (E.J.) (1963)**

«La culture des plantes fourragères dans la région méditerranéenne occidentale».  
Cahiers de la Recherche Agronomique. nº 17 - Rabat.

**WALTER, (H.) y LIETH, (H.) (1960)**

«Klimadiagramm-Weltatlas».  
Ved. Gustav Fischer Verlag. Jena.

**WEELER, (W.A.) (1960)**

«Forage and pasture crops».  
D. Van Nostrand. Princenton.

**WHITE, (R.O.), NILSSON-LEISSNER, (G.) y TRUMBLE, (H.C.) (1955)**

«Las leguminosas en la Agricultura».  
FAO. nº 21.

**WILSIE, (Carroll P. ) (1965)**

«Cultivos: Aclimatación y Distribución».  
Edt. Acribia - Zaragoza.



## **ANEJOS**

- CUADROS
- CARTOGRAFIA
- GRAFICOS
- TABLAS



**CUADROS**



## INDICE DE CUADROS

- Nº 1.— Índice general de estaciones.
- Nº 2.— Media y desviación típica de las temperaturas máximas absolutas mensuales.
- Nº 3.— Media y desviación típica de las medias de las temperaturas máximas mensuales.
- Nº 4.— Temperatura media mensual de medias.
- Nº 5.— Media y desviación típica de las medias de las temperaturas mínimas mensuales.
- Nº 6.— Media y desviación típica de las temperaturas mínimas absolutas mensuales.
- Nº 7.— Temperatura media estacional de máximas.
- Nº 8.— Temperatura media estacional de medias.
- Nº 9.— Temperatura media estacional de mínimas.
- Nº 10.— Duración media del período frío ( $t \leq 7^\circ \text{C}$ ).
- Nº 10 (bis).— Fechas primera y última helada ( $t \leq 7^\circ \text{C}$ ).
- Nº 11.— Variabilidad con que un mes es frío.
- Nº 12.— Duración media del período cálido ( $T \geq 30^\circ \text{C}$ ).
- Nº 13.— Variabilidad con que un mes es cálido.
- Nº 14.— Pluviometría media y coeficientes  $\alpha$ ,  $\beta$ , Q y R mensuales.
- Nº 15.— Pluviometría media estacional.
- Nº 16.— Evapotranspiración potencial media mensual.
- Nº 17.— Evapotranspiración potencial media estacional.
- Nº 18.— Duración media del período seco ( $R=100$ ).
- Nº 19.— Variabilidad del déficit (D) mensual.
- Nº 20.— Clasificación agroclimática de J. Papadakis.
- Nº 21.— Índice de Turc mensual para el secano.
- Nº 22.— Índice de Turc estacional para el secano.
- Nº 23.— Índice de Turc mensual para el regadío.
- Nº 24.— Índice de Turc estacional para el regadío.
- Nº 25.— Formaciones fisiognómicas.
  - Tablas de la distribución normal y la distribución gamma. Normas para su uso.



## CUADRO Nº 1.—INDICE GENERAL DE ESTACIONES

ESTACION	CLAVE	CARAC.		N. AÑOS		PERIODO		COORDENADAS		
		T	P	T	P	T	P	LAT.	LONG.	ALT.
ALDEA DE CUENCA	GA-258	+	+	20	30	1954-80	1951-80	38-19	01-52 W	0571
BELALCAZAR	GA-268	+	+	7	28	1951-57	1947-75	38-35	01-29 W	0490
CURJUBA 'AEROPUERTO'	GQ-402	+	+	49	50	1931-80	1931-80	37-51	01-10 W	0110
HORNACHUELOS	GQ-491	+	+	25	31	1931-80	1931-80	37-50	01-33 W	0184
LUCENA	GQ-678	+	+	28	38	1931-77	1931-80	37-25	00-48 W	0483
MONTORO	GQ-366	+	+	24	36	1955-80	1945-80	38-01	00-42 W	0195
PANTANO DE GUADALMELLATO	GQ-393	+	+	19	32	1931-80	1946-80	38-02	00-59 W	0217
PANTANO DE IZNAJAR	GQ-590	+	+	11	40	1965-80	1932-80	37-15	00-37 W	0538
PANTANO PUENTE NUEVO	GQ-461	+	+	19	19	1961-79	1961-79	38-05	01-14 W	0410
PEDROCHE	GA-286	+	+	28	25	1953-80	1951-80	38-26	01-04 W	0621
PENARROYA-PUEBLONUEVO	GJ-452	+	+	26	39	1954-79	1931-79	38-18	01-34 W	0588
POSADAS	GQ-469	+	+	34	35	1931-75	1944-80	37-48	01-25 W	0088
POZOBLANCO	GA-275	+	+	36	38	1936-80	1943-80	38-23	01-10 W	0649
VILLARALTO	GA-274	+	+	28	25	1953-80	1951-80	38-27	01-18 W	0583
ADAMUZ	GQ-375		+		36		1944-80	38-02	00-50 W	0238
AGUILAR DE LA FRONTERA	GQ-624		+		37		1944-80	37-31	00-58 W	0380
ALBENDIN 'C.H.G.'	GQ-423A		+		37		1944-80	37-40	00-33 W	0290
ALCARACEJOS	GA-276		+		35		1944-80	38-23	01-17 W	0608
ALCOLEA	GQ-394		+		27		1947-73	37-56	00-59 W	0110
ALMODOVAR DEL RIO	GQ-443		+		37		1944-80	37-48	01-20 W	0123
ANDRA	GA-277		+		31		1945-75	38-25	01-13 W	0630
JAENA 'C.H.G.'	GQ-426		+		37		1944-80	37-37	00-38 W	0463
BELMEZ	GJ-453		+		32		1944-75	38-16	01-31 W	0599
BELMEZ 'JAVALINA'	GQ-457		+		21		1945-65	38-14	01-25 W	0480
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	GQ-598		+		36		1944-80	37-14	00-52 W	0460
BUJALANCE	GQ-372		+		35		1944-74	37-54	00-42 W	0348
CABRA 'SALINERO'	GJ-621		+		32		1947-78	37-29	00-49 W	0410
CARCABUEY	GQ-411		+		37		1944-80	37-27	00-35 W	0639
CASTIL DEL CAMPO	GQ-415		+		37		1944-80	37-29	00-27 W	0666
CASTRO DEL RIO	GQ-428		+		36		1944-80	37-41	00-48 W	0236
DONA MENCIA	GQ-427		+		37		1944-80	37-33	00-40 W	0585
DONA RAMA	GQ-455		+		36		1945-80	38-13	01-35 W	0584
EL ESPARRAGAL	GQ-413		+		37		1944-80	37-30	00-37 W	0600
ENCINAS REALES	GQ-594		+		29		1944-72	37-16	00-48 W	0439
ESPEJO	GQ-429		+		37		1944-80	37-41	00-52 W	0418
FERNAN NUÑEZ	GQ-439		+		31		1948-79	37-40	01-02 W	0300
FUENTE-OBEJUNA	GQ-450		+		36		1945-80	38-16	01-44 W	0629
HINOJOSA DEL DUQUE	GA-267		+		26		1950-80	38-30	01-28 W	0550
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	GQ-487		+		32		1949-80	37-58	01-34 W	0300
LA CARLOTA	GQ-446		+		37		1944-80	37-40	01-15 W	0214
LUQUE	GJ-417		+		37		1944-80	37-33	00-36 W	0663
MONTILLA	GQ-623		+		37		1944-80	37-35	00-57 W	0402
MONTORO 'VEGA DE ARMIJO'	GQ-361		+		37		1944-80	38-01	00-38 W	0180
MORENTE	GQ-373		+		36		1944-80	37-56	00-43 W	0222

## CUADRO N° 1.—INDICE GENERAL DE ESTACIONES (cont.)

ESTACION	CLAVE	CARAC.		N. AÑOS		PERIODO		COORDENADAS		
		T	P	T	P	T	P	LAT.	LONG.	ALT.
NUEVA CARTEYA	GQ-432	+		37		1944-80		37-35	00-47 W	0480
QUEJUD	GQ-366	+		35		1945-80		38-08	01-07 W	0702
PALMA DEL RIO	GQ-646	+		29		1951-80		37-42	01-36 W	0055
PRIEGO DE CORDOBA	GQ-469	+		31		1944-79		37-26	00-30 W	0650
PUENTE GENIL *AFOROS*	GQ-615	+		32		1944-80		37-23	01-05 W	0231
RUTE	GQ-656	+		36		1944-80		37-20	00-41 W	0639
SAN CALIXTO	GQ-492	+		36		1944-80		37-57	01-38 W	0484
SANTAELLA	GQ-627	+		37		1944-80		37-34	01-10 W	0186
TORRECAMPO	GA-284	+		28		1951-78		38-28	00-59 W	0572
TORRES CABRERA	GQ-441	+		36		1944-80		37-47	01-00 W	0200
VALENZUELA	GQ-355	+		35		1946-80		37-46	00-31 W	0344
VENTA AZUEL	GQ-342	+		34		1945-80		38-19	00-38 W	0602
VENTA DE CARDEÑA	GQ-345	+		34		1945-80		38-16	00-38 W	0750
V. DE CARDEÑA *V. DEL CHARCO*	GQ-363	+		37		1944-80		38-12	00-35 W	0730
VILLA DEL RIO	GQ-360	+		34		1945-78		37-59	00-35 W	0183
VILLAFRANCA DE CORDOBA	GQ-378	+		37		1944-80		37-58	00-51 W	0150
VILLAHAKIA	GQ-460	+		35		1945-80		38-08	01-13 W	0579
VILLANUEVA DE CORDOBA	GQ-391	+		37		1944-80		38-19	00-56 W	0710
VILLANUEVA DEL REY	GQ-458	+		37		1944-80		38-12	01-28 W	0600
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	GQ-465	+		35		1946-80		38-04	01-20 W	0693
ZAMBRA	GQ-635	+		37		1944-80		37-23	00-42 W	0620

**CUADRO Nº 2.—MEDIA Y DESVIACION TIPICA DE LAS TEMPERATURAS  
MAXIMAS ABSOLUTAS MENSUALES**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA	M	17,5	19,6	23,4	25,6	31,4	36,2	39,6	39,4	35,4	29,6	23,2	18,9	40,3
	D	2,2	2,1	2,5	3,9	3,2	2,7	2,4	2,2	2,2	4,0	4,4	2,6	2,1
BELALCAZAR	M	15,5	19,9	25,6	27,9	34,1	39,2	42,9	40,8	35,7	29,3	21,4	17,2	42,5
	D	2,1	3,3	2,8	3,1	2,8	3,7	1,2	1,8	1,6	3,0	2,5	1,0	2,0
CORDOBA 'AEROPUERTO'	M	19,1	22,0	25,8	29,4	33,9	38,6	41,5	40,7	37,3	31,6	24,3	19,1	41,9
	D	1,7	2,3	2,4	2,6	3,1	2,3	1,8	1,6	2,1	2,6	2,2	1,5	2,0
HORNACHUELOS	M	20,3	24,2	28,5	31,4	37,0	40,5	42,3	42,4	39,3	34,3	27,4	21,9	43,0
	D	3,3	4,3	3,1	3,7	4,0	3,6	2,5	2,3	2,9	3,7	4,1	3,9	2,7
LUCENA	M	19,8	23,6	25,4	29,1	33,7	37,1	40,3	39,6	36,3	30,7	23,8	19,3	40,8
	D	3,1	4,0	2,9	2,7	3,1	2,0	1,6	2,1	2,8	3,4	3,5	3,4	2,0
MONTORO	M	20,4	21,3	25,1	28,0	32,1	36,4	39,5	39,1	35,0	30,6	24,1	20,4	40,1
	D	2,8	1,9	2,0	2,1	3,1	2,1	2,1	1,8	2,6	2,8	3,2	2,2	1,9
PANTANO DE GUADALMELLAT	M	19,1	21,1	25,3	28,7	32,9	38,9	42,3	41,8	38,2	32,4	25,7	20,0	42,4
	D	2,1	2,2	2,3	2,6	4,4	2,3	2,1	1,5	2,8	3,1	2,4	1,7	2,1
PANTANO DE IZNAJAR	M	19,8	21,8	25,4	27,5	32,5	35,9	40,6	38,8	34,9	30,4	24,0	19,8	39,5
	D	2,0	2,6	2,2	2,2	1,5	3,2	2,8	1,5	2,8	2,5	2,2	1,7	4,3
PANTANO PUENTE NUEVO	M	19,6	20,9	25,1	28,1	34,1	38,4	41,9	40,8	36,9	31,6	26,1	21,0	42,2
	D	2,7	2,6	2,9	4,0	4,0	2,2	2,3	2,0	2,9	2,9	3,3	2,6	2,2
PEUROCHE	M	16,8	18,1	22,3	25,0	30,5	34,7	38,5	38,1	34,1	27,6	21,2	16,8	38,9
	D	3,2	3,5	3,8	3,5	2,9	2,9	2,0	2,0	4,1	4,1	4,1	3,9	2,1
PERARROYA-PUEBLONUEVO	M	17,3	19,9	24,7	28,5	34,8	38,3	41,0	40,1	35,9	30,1	22,6	17,1	40,5
	D	1,7	2,6	2,6	2,6	2,9	2,2	2,2	1,9	2,5	3,2	2,7	2,0	4,8
POSADAS	M	17,6	20,3	25,2	28,7	33,0	38,2	41,4	40,8	36,8	29,9	23,7	18,1	40,3
	D	2,7	3,5	2,8	2,9	3,9	3,1	3,0	1,8	2,8	3,9	3,3	2,7	5,1
POZOBLANCO	M	17,0	19,7	24,6	25,8	31,0	36,4	39,2	39,1	35,7	29,7	21,8	17,1	39,8
	D	2,9	3,2	3,5	3,2	3,2	1,9	1,5	1,4	2,5	2,8	3,2	3,0	1,6
VILLARALTO	M	18,3	19,6	24,2	27,3	33,3	37,1	40,4	39,7	36,6	30,2	22,9	18,3	40,7
	D	3,6	4,3	2,9	2,4	3,1	2,1	2,1	2,0	2,6	3,6	4,2	4,2	2,1

**CUADRO Nº 3.—MEDIA Y DESVIACION TIPICA DE LAS MEDIAS DE LAS TEMPERATURAS MAXIMAS MENSUALES**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA	M	12,4	13,6	15,9	19,6	23,7	28,6	34,2	34,0	29,9	22,4	16,3	12,6	21,9
	D	1,6	1,5	1,6	2,2	2,1	1,9	2,3	2,1	2,1	2,9	2,2	1,5	7,6
BELALCAZAR	M	10,7	13,1	18,5	22,2	28,1	32,7	37,7	36,5	30,1	23,0	16,1	12,5	23,4
	D	2,1	2,8	2,0	2,0	2,3	2,4	1,7	1,3	2,1	1,6	1,6	1,6	4,1
CORDOBA 'AEROPUERTO'	M	14,2	16,3	19,1	22,5	26,5	31,7	36,2	35,7	31,3	24,7	18,5	14,5	24,3
	D	1,3	1,6	1,9	2,2	2,7	2,1	1,3	1,2	1,9	2,0	1,6	1,3	7,7
HORNACHUELOS	M	15,8	18,3	21,3	24,6	29,8	33,8	37,6	37,7	34,6	27,0	21,3	16,4	26,3
	D	2,5	3,5	2,9	3,2	4,0	4,0	2,4	2,6	3,1	3,5	3,5	2,9	7,7
LUCENA	M	14,0	15,8	18,0	21,2	25,9	30,2	35,2	34,5	30,0	23,8	17,0	13,3	23,2
	D	2,1	2,9	2,2	2,1	3,2	1,6	1,6	1,6	2,4	2,9	2,8	2,8	7,3
MONTORO	M	15,1	16,6	19,4	22,5	26,7	30,5	35,1	34,3	30,6	24,6	19,3	15,4	24,2
	D	1,2	1,9	1,7	1,6	2,2	2,1	1,2	2,0	2,7	1,7	1,8	1,8	6,9
PANTANO DE GUADALMELLAT	M	14,1	15,8	17,7	21,4	25,0	31,0	36,2	36,1	32,1	25,0	19,2	14,6	24,0
	D	1,2	1,7	2,6	2,4	3,3	2,5	1,5	1,6	2,7	2,7	1,9	1,1	7,6
PANTANO DE IZNAJAR	M	14,3	15,1	17,6	19,7	24,3	28,6	34,2	33,7	29,2	23,1	17,2	13,5	22,5
	D	1,2	1,6	1,7	1,7	1,8	2,0	1,7	1,2	2,5	2,5	1,2	1,4	7,1
PANTANO PUENTE NUEVO	M	14,2	14,8	17,8	20,5	25,5	30,2	35,5	34,9	29,5	23,8	18,4	14,7	23,3
	D	2,1	2,1	2,0	2,6	3,0	2,3	3,2	2,9	3,6	2,3	1,9	2,2	7,3
PEDROCHE	M	11,4	12,6	15,1	18,1	23,0	27,2	33,2	33,2	28,1	20,6	15,3	11,6	20,8
	D	2,2	2,3	2,8	2,7	2,6	2,6	2,4	2,1	3,7	3,1	3,2	2,9	7,7
PERARROYA-PUEBLONUEVO	M	13,1	14,7	18,0	22,1	27,5	31,8	36,6	35,6	30,7	23,9	16,9	13,2	23,7
	D	1,7	1,9	2,3	2,1	2,4	1,8	1,3	1,7	2,8	2,6	2,1	1,7	6,3
POSADAS	M	12,9	15,3	18,6	22,6	25,8	31,4	35,8	35,2	31,0	24,2	18,2	13,6	23,7
	D	2,4	2,9	2,4	2,3	3,1	2,8	2,3	1,9	2,7	3,2	2,6	2,4	7,9
POZOBLANCO	M	11,2	13,4	16,1	19,5	24,0	29,1	34,1	33,9	29,6	22,6	15,4	11,2	21,7
	D	2,0	2,6	2,9	2,2	3,0	2,1	1,5	1,3	2,5	2,9	1,9	1,8	8,1
VILLARALTO	M	12,6	13,3	16,7	20,0	25,3	29,5	34,9	34,6	30,3	22,6	16,1	12,6	22,4
	D	3,1	3,3	2,6	2,5	2,8	2,3	2,2	2,6	3,6	3,5	3,5	2,5	8,1

## CUADRO Nº 4.—TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE MEDIAS

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGUSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA	7.6	8.6	10.1	13.0	17.0	21.7	26.2	26.0	22.8	16.8	10.8	7.6	15.7
BELALCAZAR	5.9	7.2	11.6	14.7	19.8	24.2	28.6	27.8	22.5	16.7	10.8	7.4	16.5
CORDOBA *AEROPUERTO*	9.3	10.6	13.1	15.9	19.3	23.8	27.4	27.2	23.9	18.5	13.0	9.5	17.7
HORNACHUELOS	9.8	11.6	14.0	16.5	21.1	24.4	28.0	28.1	24.9	15.6	14.4	10.5	18.6
LUCENA	8.5	9.8	11.8	14.3	18.4	22.1	26.3	25.9	22.1	17.3	11.6	8.4	16.4
MONTORO	9.3	10.5	12.9	15.4	19.3	23.2	27.1	26.8	23.3	18.2	12.9	9.4	17.4
PANTANO DE GUADALMELLATO	9.2	10.0	11.8	14.9	18.3	22.5	26.9	26.7	23.4	18.3	13.2	9.6	17.1
PANTANO DE IZNAJAR	9.3	10.1	11.8	13.8	17.5	21.3	25.9	25.5	22.2	17.3	12.1	8.8	16.3
PANTANO PUENTE NUEVO	8.3	8.8	11.0	13.5	17.4	21.5	26.0	25.3	21.4	16.8	11.5	8.3	15.8
PEDROCHE	7.4	8.3	10.4	13.1	17.6	21.4	26.5	26.4	22.4	16.2	11.0	7.8	15.7
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	9.1	10.1	12.5	15.7	20.4	24.5	28.8	28.3	24.3	18.3	12.3	9.1	17.8
POSADAS	8.3	9.9	13.0	16.2	19.3	23.9	27.6	27.1	23.8	18.1	13.2	9.0	17.5
POZOBLANCO	6.9	8.5	10.7	13.6	17.3	21.8	26.6	26.6	22.8	16.8	10.6	6.9	15.8
VILLAR ALTO	7.5	8.0	10.4	13.1	17.5	21.4	26.0	25.8	22.1	16.0	10.3	7.8	15.5
ADAMUZ	9.3	10.3	13.0	16.0	20.0	23.8	27.8	27.0	23.2	17.8	12.7	9.3	17.3
AGUILAR DE LA FRONTERA	8.6	9.6	12.2	15.1	19.4	23.2	27.5	26.8	22.9	17.5	12.0	8.5	16.9
ALBENDIN *C.H.G.*	8.9	9.9	12.5	15.5	19.7	23.4	27.6	26.9	23.0	17.6	12.3	8.9	17.2
ALCARACEJOS	7.5	8.4	10.8	13.7	18.3	22.1	26.8	26.5	22.4	17.0	10.9	7.3	16.0
ALCOLEA	9.9	11.0	13.6	16.8	20.6	24.4	28.2	27.2	23.5	18.1	13.3	10.0	18.1
ALMODOVAR DEL RIO	9.8	10.9	13.7	16.7	20.6	24.3	28.2	27.1	23.5	18.0	13.2	9.9	18.0
ARORA	7.4	8.3	10.7	13.6	18.2	22.0	26.8	26.5	22.4	17.0	10.8	7.2	15.9
BAENA *C.H.G.*	8.2	9.2	11.7	14.6	19.0	22.8	27.2	26.7	22.7	17.3	11.6	8.1	16.6
BELMEZ	7.8	8.8	11.3	14.2	16.7	22.5	27.1	26.6	22.6	17.1	11.3	7.7	16.1
BELMEZ *JAVALINA*	8.1	9.1	11.6	14.5	18.9	22.7	27.2	26.7	22.7	17.3	11.5	8.0	16.5
BENAMEJI *ALCACHUFARES B.*	8.2	9.2	11.7	14.6	19.0	22.8	27.2	26.7	22.7	17.3	11.6	8.1	16.6
BUJALANCE	7.8	8.8	11.3	14.2	16.7	22.5	27.1	26.6	22.6	17.1	11.3	7.7	16.1
CABRA *SALINERO*	8.4	9.4	12.0	14.9	19.2	23.0	27.4	26.8	22.8	17.4	11.9	8.4	16.8
CARCABUEY	7.3	8.2	10.6	13.6	18.2	22.0	26.8	26.5	22.4	17.0	10.8	7.1	15.9
CASTIL DEL CAMPO	7.2	8.1	10.5	13.4	18.1	21.8	26.7	26.4	22.3	16.9	10.6	7.0	15.7
CASTRO DEL RIO	9.3	10.3	13.1	16.0	20.0	23.8	27.9	27.0	23.2	17.8	12.7	9.3	17.5
JORA MENCIA	7.6	8.5	11.0	13.9	18.4	22.2	26.9	26.5	22.5	17.1	11.0	7.4	16.1
ODRA RAMA	7.6	8.5	11.0	13.9	18.4	22.2	26.9	26.5	22.5	17.1	11.0	7.4	16.1
EL ESPARRAGAL	7.5	8.4	10.9	13.8	18.4	22.1	26.9	26.5	22.4	17.0	10.9	7.3	16.0
ENCINAS REALES	8.3	9.3	11.8	14.8	19.1	22.9	27.3	26.7	22.8	17.4	11.7	8.2	16.7
ESPEJO	8.4	9.4	12.0	14.9	19.2	23.0	27.4	26.8	22.8	17.4	11.8	8.3	16.8
FERNAN NUNEZ	9.0	10.0	12.7	15.6	19.7	23.5	27.7	26.9	23.1	17.7	12.4	9.0	17.3
FUENTE-OBEJUNA	7.4	8.3	10.7	13.6	18.2	22.0	26.8	26.5	22.4	17.0	10.8	7.2	15.9
HINOJOSA DEL DUQUE	7.8	8.7	11.2	14.1	18.6	22.4	27.0	26.6	22.6	17.1	11.2	7.6	16.2
HORNACHUELOS *LAS MESAS*	9.0	10.0	12.7	15.6	19.7	23.5	27.7	26.9	23.1	17.7	12.4	9.0	17.3
LA CARLOTA	9.4	10.5	13.2	16.1	20.1	23.9	27.9	27.0	23.3	17.9	12.8	9.4	17.6
LUQUE	7.2	8.1	10.5	13.4	18.1	21.9	26.7	26.4	22.3	16.9	10.6	7.0	15.8
MONTILLA	8.5	9.5	12.1	15.0	19.3	23.1	27.4	26.8	22.9	17.0	11.9	8.4	16.8
MONTORO *VEGA DE ARMIJO*	9.0	10.6	13.4	16.4	20.3	24.1	28.0	27.1	23.3	17.9	13.0	9.6	17.8
MORENTE	9.4	10.4	13.1	16.1	20.1	23.9	27.9	27.0	23.2	17.8	12.8	9.4	17.6

## CUADRO Nº 4.—TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE MEDIAS (cont.)

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZJ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGUSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	ARO
NUEVA CARTEYA	8.1	9.1	11.5	14.5	18.9	22.7	27.2	26.7	22.7	17.3	11.5	8.0	16.5
DBEJO	7.0	7.5	10.2	13.2	17.9	21.7	26.6	26.4	22.2	16.8	10.5	6.7	15.6
PALMA DEL RIO	10.2	11.5	14.1	17.1	20.9	24.7	28.3	27.2	23.6	18.2	13.0	10.3	18.3
PRIEGO DE CORDOBA	7.3	8.2	10.0	13.5	18.1	21.9	26.7	26.4	22.3	16.9	10.7	7.0	15.8
PUENTE GENIL 'AFORDOS'	9.6	10.7	13.4	16.4	20.3	24.1	28.0	27.1	23.4	17.9	13.0	9.7	17.8
RUTE	7.3	8.2	10.0	13.5	18.2	22.0	26.8	26.5	22.4	17.0	10.8	7.1	15.9
SAN CALIXTO	8.1	9.1	11.6	14.5	18.9	22.7	27.2	26.7	22.7	17.3	11.5	8.0	16.5
SANTAELLA	9.2	10.3	13.0	16.0	20.0	23.8	27.8	27.0	23.2	17.8	12.7	9.3	17.5
TORRECAMPO	7.6	8.6	11.0	14.0	18.5	22.3	26.9	26.6	22.5	17.1	11.1	7.5	16.1
TORRES CADRERA	9.5	10.5	13.3	16.2	20.2	24.0	27.9	27.0	23.3	17.9	12.9	9.5	17.7
VALENZUELA	8.8	9.8	12.4	15.4	19.5	23.3	27.6	26.9	23.0	17.6	12.2	8.7	17.1
VENTA AZUEL	7.2	8.1	10.5	13.4	18.1	21.9	26.7	26.4	22.3	16.9	10.7	7.0	15.8
VENTA DE CARDERA	6.8	7.7	10.0	12.9	17.7	21.4	26.5	26.3	22.1	16.7	10.2	6.5	15.4
V. DE CARDERA 'V. DEL CHARCO	6.4	7.8	10.1	13.1	17.8	21.6	26.5	26.4	22.2	16.8	10.4	6.7	15.5
VILLA DEL RIO	9.6	10.6	13.4	16.3	20.3	24.1	28.0	27.1	23.3	17.9	13.9	9.6	17.8
VILLAFRANCA DE CORDOBA	9.7	10.8	13.6	16.5	20.4	24.5	28.1	27.1	23.4	18.0	13.1	9.8	17.9
VILLAHARTA	7.6	8.6	11.0	13.9	18.5	22.2	26.9	26.5	22.5	17.1	11.1	7.4	16.1
VILLANUEVA DE CORDOBA	7.0	7.9	10.2	13.1	17.9	21.6	26.6	26.4	22.2	16.8	10.4	6.7	15.6
VILLANUEVA DEL REY	7.5	8.4	10.9	13.8	18.4	22.1	26.9	26.5	22.4	17.0	10.9	7.3	16.0
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	7.1	8.0	10.3	13.2	17.9	21.7	26.6	26.4	22.3	16.8	10.5	6.8	15.6
ZAMBRA	7.4	8.3	10.7	13.7	18.3	22.1	26.8	26.5	22.4	17.0	10.9	7.2	15.9

## CUADRO Nº 5.—MEDIA Y DESVIACION TIPICA DE LAS MEDIAS DE LAS TEMPERATURAS MINIMAS MENSUALES

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CULNCA	M	2,9	3,7	4,3	6,4	10,3	14,8	18,2	18,1	15,6	11,2	5,3	2,0	9,5
	D	2,1	1,9	1,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,7	2,9	2,4	1,6	2,5	5,8
BELALCAZAR	M	1,1	1,3	4,7	7,2	11,6	15,7	19,6	19,2	15,0	10,4	5,5	2,4	9,5
	D	3,0	2,2	1,0	1,1	1,8	1,1	1,0	1,3	1,3	1,4	2,1	2,2	6,5
CORDOBA *AEROPUERTO*	M	4,5	5,3	7,2	9,3	12,2	15,9	18,6	18,7	16,5	12,3	7,6	4,6	11,1
	D	2,2	2,0	1,7	1,4	1,3	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,9	2,3	5,2
HORNACHUELOS	M	3,7	4,9	6,8	8,4	12,5	15,1	18,4	18,5	15,8	12,3	7,6	4,6	10,7
	D	1,7	1,3	2,3	2,4	3,2	3,0	3,0	2,6	2,3	2,2	2,2	2,6	5,2
LUCENA	M	3,0	3,9	5,7	7,4	11,0	14,1	17,4	17,4	14,3	10,9	6,2	3,6	9,6
	D	1,5	1,9	1,4	1,8	3,1	2,6	2,5	2,6	1,9	1,8	1,6	1,4	5,1
MONTEJO	M	3,5	4,4	6,5	8,4	12,0	15,9	19,1	19,2	16,1	11,8	6,5	3,5	10,0
	D	2,2	1,8	1,9	1,0	1,5	1,5	1,2	1,7	1,5	1,5	1,5	2,2	5,7
PANTANO DE GUADALMELLAT	M	4,3	4,3	5,9	8,5	11,5	14,1	17,6	17,3	14,7	11,5	7,2	4,6	10,1
	D	3,5	2,3	1,8	2,2	2,8	2,2	3,2	3,5	3,2	3,4	2,8	3,2	4,8
PANTANO DE IZNAJAR	M	4,2	5,2	5,9	7,9	10,7	14,1	17,7	17,3	15,2	11,5	7,0	4,1	10,1
	U	2,2	1,0	1,1	0,6	0,6	1,2	1,0	1,0	1,6	1,1	1,9	2,2	4,8
PANTANO PUENTE NUEVO	M	2,5	2,9	4,3	6,5	9,4	12,8	16,6	15,8	13,4	9,8	4,6	1,8	8,4
	D	2,0	1,7	2,3	1,8	1,7	1,6	2,4	2,7	2,2	2,3	1,8	2,5	5,1
PEDRUQUE	M	3,5	4,1	5,7	8,1	12,2	15,6	19,8	19,7	16,7	11,8	6,8	3,9	10,7
	U	1,7	1,9	1,5	1,6	2,0	1,9	1,6	2,4	2,7	1,5	1,9	2,1	5,9
PERARROYA-PUEBLO NUEVO	M	5,1	5,5	7,1	9,3	13,4	17,2	21,0	20,9	17,9	12,8	7,7	5,0	11,9
	U	2,3	2,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,4	1,7	1,7	1,6	1,9	2,2	5,9
POSADAS	M	3,6	4,5	7,5	9,8	12,8	16,4	19,5	19,1	16,5	12,1	8,2	4,5	11,2
	D	1,9	1,9	1,5	1,3	2,1	1,6	1,7	2,1	2,2	2,6	2,0	2,1	5,5
POZOBLANCO	M	2,6	3,6	5,3	7,8	10,7	14,5	19,2	19,3	16,1	11,1	5,8	2,7	9,4
	D	1,9	2,2	1,4	1,6	2,1	2,1	1,8	1,6	2,0	2,2	2,0	2,9	5,4
VILLARALTO	M	2,5	2,7	4,1	6,2	9,8	13,4	17,1	17,1	13,9	9,4	4,5	2,9	8,0
	D	1,8	2,0	1,0	2,1	2,3	2,4	2,4	2,3	3,1	3,0	2,3	1,8	5,4

**CUADRO Nº 6.—MEDIA Y DESVIACION TIPICA DE LAS TEMPERATURAS  
MINIMAS ABSOLUTAS MENSUALES**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA	M	-1,5	-0,9	-0,5	1,8	5,3	9,7	13,9	13,6	10,2	5,6	0,5	-1,8	-3,5
	D	2,7	2,6	2,3	2,9	3,2	3,0	2,5	3,3	3,9	3,3	2,4	2,9	2,3
BELALCAZAR	M	-4,4	-4,7	-0,4	2,3	5,4	10,1	15,3	14,5	10,1	3,1	0,0	-1,7	-3,0
	D	2,3	2,7	2,2	1,5	2,4	1,5	1,5	2,3	2,0	1,8	1,6	2,2	3,4
CURDIBA 'AEROPUERTO'	M	-1,6	-0,2	2,1	4,5	7,1	11,4	14,5	14,6	11,5	6,2	2,2	-0,9	-2,9
	D	2,4	2,7	2,4	2,1	2,1	2,0	1,9	2,0	2,2	2,5	2,7	2,5	2,0
HORNACHUELOS	M	-0,6	0,1	2,0	3,9	7,2	10,0	13,6	14,2	11,1	7,1	2,0	0,1	-1,5
	D	2,1	2,0	2,6	2,5	2,6	3,5	4,2	3,2	2,9	3,0	2,8	2,7	2,0
LUCENA	M	-2,1	-0,6	0,7	2,5	5,6	9,1	12,9	12,8	9,7	5,1	1,4	-0,7	-3,1
	D	2,2	3,0	2,2	2,2	3,7	2,7	3,1	2,1	2,4	3,0	1,7	2,0	2,2
MONTORO	M	-1,1	-0,5	1,5	4,1	7,4	10,7	15,1	14,5	11,3	6,0	1,3	-1,4	-3,1
	D	2,0	2,4	1,7	1,4	1,7	1,6	2,1	2,1	2,5	2,1	2,3	2,9	2,3
PANTANO DE GUADALMELLAT	M	-0,3	0,3	1,7	5,0	6,5	9,6	13,8	13,5	10,5	6,4	2,9	0,6	-1,4
	D	3,8	1,9	1,8	2,9	2,2	2,0	3,0	3,7	3,5	3,6	3,5	3,4	3,0
PANTANO DE IZNAJAR	M	-0,9	-0,2	0,7	3,4	5,8	10,3	13,8	13,2	10,5	5,9	2,1	-1,4	-2,0
	D	2,5	2,2	0,9	1,6	1,7	1,7	1,2	1,6	2,3	2,6	2,4	3,1	2,1
PANTANO PUENTE NUEVO	M	-3,2	-2,7	-1,3	1,2	4,3	8,0	12,0	11,0	8,8	4,0	-0,1	-3,2	-5,0
	D	2,7	2,7	2,1	2,2	1,6	1,7	2,3	2,0	2,2	2,5	2,6	2,4	1,9
PEDROCHE	M	-1,1	-0,4	1,2	3,2	6,5	9,8	14,7	15,3	11,6	6,6	2,1	-0,3	-2,7
	D	2,2	2,8	1,8	1,8	2,3	2,4	2,0	2,6	2,9	2,2	2,1	2,4	1,9
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	M	0,7	1,0	2,6	4,7	8,1	11,8	16,4	15,6	13,3	8,5	3,5	1,1	-0,9
	D	2,9	3,4	2,1	2,1	1,8	2,3	2,6	4,1	2,3	3,2	2,6	2,3	2,7
POSADAS	M	-1,5	-0,5	2,7	5,3	7,8	11,9	15,1	15,0	12,2	7,1	3,2	-0,7	-2,5
	D	1,9	2,3	2,0	2,0	2,1	2,2	1,6	1,8	2,2	2,7	2,8	2,6	1,8
PUZOSLANCU	M	-2,5	-1,0	0,8	3,7	5,5	9,6	14,2	13,8	10,9	6,0	1,0	-2,0	-3,6
	D	2,2	2,9	1,7	2,1	2,1	2,7	3,1	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	1,9
VILLARALTO	M	-2,5	-2,1	-0,8	1,9	4,3	7,6	12,0	12,2	8,7	4,7	0,0	-2,2	-4,7
	D	2,2	2,8	2,2	2,0	1,8	2,6	2,7	3,2	3,1	3,3	3,0	2,6	1,8

## CUADRO Nº 7.—TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL DE MAXIMAS

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTONO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	12.9	19.7	32.5	22.9	21.9
BICALCAZAR	12.1	22.9	35.6	23.1	23.4
CORDOBA "AEROPUERTO"	13.0	22.7	34.5	24.8	24.3
HORNACHUELOS	16.3	23.2	36.4	27.4	26.5
LUCENA	14.4	21.7	33.5	23.6	23.2
MONTORO	15.7	22.9	33.5	24.8	24.2
PANTANO DE GUADALMELLATO	14.8	21.4	34.4	25.4	24.0
PANTANO DE IZAJAR	14.5	20.5	32.2	23.2	22.5
PANTANO PUENTE NUEVO	14.6	21.3	33.5	23.9	23.3
PEÑACOCHE	11.9	18.7	31.2	21.3	20.8
PEÑARROYA-PUEBLENUEVO	13.7	22.5	34.7	23.8	23.7
POSADAS	13.9	22.3	34.1	24.5	23.7
POZUBLANCO	11.9	19.9	32.4	22.5	21.7
VILLAFALTO	12.8	20.7	33.0	23.0	22.4

## CUADRO Nº 8.—TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL DE MEDIAS

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTONO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	7.9	13.4	24.6	16.6	15.7
DELALCAZAR	6.8	15.4	26.9	16.7	16.5
CORDOBA 'AEROPUERTO'	9.9	16.1	26.1	18.5	17.7
HORNACHUELOS	10.6	17.2	26.0	19.6	18.6
LUCENA	8.9	14.4	24.0	17.0	16.4
MONTURO	9.7	15.9	25.7	18.1	17.4
PANTANO DE GUADALMELLATO	9.6	15.0	25.9	16.3	17.1
PANTANO DE IZNAJAK	9.4	14.4	24.2	17.2	16.3
PANTANO PUENTE NUEVO	8.5	14.0	24.3	16.6	15.8
PEUROCHE	7.8	13.7	24.3	16.5	15.7
PENARROYA-PUEBLO NUEVO	9.4	16.2	27.2	18.3	17.0
POSADAS	9.1	15.2	26.2	16.4	17.5
POZOBLANCO	7.4	13.9	25.0	16.7	15.6
VILLARALTO	7.8	13.7	24.4	16.1	15.5
ADAMUZ	9.6	16.3	26.2	17.9	17.5
AGUILAR DE LA FRONTERA	8.9	15.6	25.0	17.5	16.9
ALBENDIN 'C.H.G.'	9.2	15.9	26.0	17.6	17.2
ALCARACEJOS	7.7	14.3	25.1	16.8	16.0
ALCOLEA	10.3	17.1	26.0	18.3	18.1
ALMODOVAR DEL RIO	10.2	17.0	26.5	18.2	18.0
ANDRA	7.6	14.2	25.1	16.7	15.9
BAENA 'C.H.G.'	8.5	15.1	25.6	17.2	16.6
BELMEZ	8.1	14.1	25.4	17.0	16.1
BELMEZ 'JAVALINA'	8.4	15.0	25.5	17.2	16.5
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	8.5	15.1	25.6	17.2	16.6
BUJALANCE	8.1	14.1	25.4	17.0	16.1
CABRA 'SALINERO'	8.7	15.4	25.7	17.4	16.8
CARLABUEY	7.5	14.1	25.1	16.7	15.9
CASTIL DEL CAMPO	7.4	14.0	25.0	16.6	15.7
CASTRO DEL RIO	9.6	16.4	26.2	17.9	17.5
DONA MENCIA	7.8	14.4	25.2	16.9	16.1
DORA RAMA	7.8	14.4	25.2	16.9	16.1
EL ESPARRAGAL	7.7	14.4	25.2	16.8	16.0
ENCINAS REALES	8.6	15.2	25.6	17.3	16.7
ESPEJO	8.7	15.4	25.7	17.3	16.8
FERNAN NUÑEZ	9.3	16.0	26.0	17.7	17.3
FUENTE-UBEJUNA	7.6	14.2	25.1	16.7	15.9
HINOJOSA DEL DUQUE	8.0	14.6	25.3	17.0	16.2
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	9.3	16.0	26.0	17.7	17.3
LA CARLUTA	9.8	16.5	26.3	18.0	17.6
LUQUE	7.4	14.0	25.0	16.6	15.8
MONTILLA	8.8	15.5	25.8	17.3	16.8
MONTORO 'VEGA DE ARMIJO'	9.9	16.7	26.4	18.1	17.8
MORENTE	9.7	16.4	26.3	17.9	17.6

## CUADRO Nº 8.—TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL DE MEDIAS (cont.)

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	ANUAL
NUEVA CARTEYA	8.4	15.0	25.5	17.2	16.5
OBEJG	7.2	13.8	24.9	16.5	15.6
PALMA DEL RIO	10.6	17.4	26.7	16.5	18.3
PRIEGO DE CORDOBA	7.5	14.1	25.0	16.6	15.8
PUNTE GENIL 'AFUROS'	10.0	16.7	26.4	18.1	17.8
KUTE	7.5	14.1	25.1	16.7	15.9
SAN CALIXTO	8.4	15.0	25.5	17.2	16.5
SANTAELLA	9.6	16.3	26.2	17.9	17.5
TORRECAMPO	7.9	14.5	25.3	16.9	16.1
TORRES CABRERA	9.8	16.6	26.3	18.0	17.7
VALENZUELA	9.1	15.8	25.9	17.6	17.1
VENTA AZUEL	7.4	14.0	25.0	16.6	15.8
VENTA DE CARDENA	7.0	13.5	24.7	16.3	15.4
V. DE CARDENA 'V. DEL CHARCO'	7.1	13.7	24.8	16.5	15.5
VILLA DEL RIO	9.9	16.7	26.4	18.4	17.8
VILLAFRANCA DE CORDOBA	10.1	16.8	26.6	18.2	17.9
VILLAHARTA	7.9	14.5	25.2	16.9	16.1
VILLANUEVA DE CORDOBA	7.2	13.7	24.9	16.5	15.6
VILLANUEVA DEL REY	7.7	14.4	25.2	16.8	16.0
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	7.3	13.8	24.9	16.5	15.6
ZAMBRA	7.6	14.2	25.1	16.8	15.9

## CUADRO N<sup>o</sup> 9.—TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL DE MINIMAS

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTONO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	3.1	7.0	17.0	10.7	9.4
BELALCAZAR	1.6	7.8	18.2	10.3	9.5
CORDOBA 'AEROPUERTO'	4.8	9.6	17.7	12.1	11.1
MUKNACHUELOS	4.4	9.2	17.3	11.9	10.7
LUCENA	3.5	8.0	16.3	10.5	9.6
MONTORO	3.8	9.0	18.1	11.5	10.6
PANTANO DE GUADALMELLATO	4.4	8.6	16.3	11.1	10.1
PANTANO DE IZNAJAR	4.5	8.2	16.4	11.2	10.1
PANTANO PUENTE NUEVO	2.4	6.7	15.1	9.3	8.4
PEDROCHE	3.8	8.7	18.4	11.6	10.7
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	5.2	9.9	19.7	12.0	11.9
POSADAS	4.2	10.0	18.3	12.3	11.2
POZOBLANCO	3.0	7.9	17.7	11.0	9.9
VILLARALTO	2.7	6.7	15.4	9.3	6.6

## CUADRO N<sup>o</sup> 10.—DURACION MEDIA DEL PERIODO FRIO ( $t \leq 7^{\circ}\text{C}$ )

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	ANO
ALDEA DE CUENCA	*	*	*	*							*	*	6
BELALCAZAR	*	*	*								*	*	5
CORDOBA 'AEROPUERTO'	*	*										*	3
HORNACHUELOS	*	*	*									*	4
LUCENA	*	*	*								*	*	5
MONTURO	*	*	*								*	*	5
PANTANO DE GJADALMELLATO	*	*	*									*	4
PANTANO DE IZNAJAR	*	*	*								*	*	5
PANTANO PUENTE NUEVO	*	*	*	*							*	*	6
PEDROCHE	*	*	*								*	*	5
PERARROYA--PUEBLONUEVO	*	*										*	3
POSAVAS	*	*										*	3
POZOBLANCO	*	*	*								*	*	5
VILLARALTO	*	*	*	*							*	*	6

## CUADRO N° 10 bis.—FECHAS PRIMERA Y ULTIMA HELADA ( $t \leq 7^{\circ}\text{C}$ )

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OTUB.	NOVIE.	DICIE.	ANO
ALDEA DE CUENCA				20								6	
BELALCAZAR				13								6	
CORDOBA "AEROPUERTO"			12									21	
HORNACHUELOS			19									21	
LUCENA				8								10	
MONTURO			23									12	
PANTANO DE JUAQUIMELLATO			28									17	
PANTANO DE IZNAJAR				2								15	
PANTANO PUENTE NUEVO				20								1	
PEDROCHE				1								14	
PENARRIJA-PUEBLO NUEVO			13									23	
POSADAS			10									23	
POZOBLANCO				5								8	
VILLARALTO				22						30			

## CUADRO Nº 11.—VARIABILIDAD CON QUE UN MES ES FRIO

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.
ALDEA DE CUENCA	10	9	9	8						1	9	10
BELALCAZAR	10	10	10	5							8	10
CDRUJBA *AEROPUERTO*	9	8	4								4	8
HORNACHUELOS	10	10	7	3		1					4	9
LUCENA	10	10	8	3							7	10
MONTORO	10	10	7	1							6	10
PANTANO DE GUADALMELLATO	9	9	8	2	1					1	5	8
PANTANO DE IZNAJAR	9	10	9								3	8
PANTANO PUENTE NUEVO	10	10	9	6	1					1	9	10
PEDROCHE	10	9	8	2							5	9
PERARROYA-PUEBLONUEVO	8	8	5								4	8
POSADAS	10	8	4								3	9
POZOBLANCO	10	9	9	3							7	9
VILLARALTO	10	10	10	6	1					3	9	10

## CUADRO Nº 12.—DURACION MEDIA DEL PERIODO CALIDO (T ≥ 30°C)

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	ARG
ALDEA DE CUENCA							*	*					2
BELALCAZAR						*	*	*	*				4
CORDOBA 'AEROPUERTO'						*	*	*	*				4
HORNACHUELOS						*	*	*	*				4
LUCENA						*	*	*	*				4
MONTEKO						*	*	*	*				4
PANTANO DE GUADALMELLATO						*	*	*	*				4
PANTANO DE IZNAJAK							*	*					2
PANTANO PUENTE NJEVO						*	*	*					3
PEDROCHE							*	*					2
PERARROYA-PUEBLONUEVO						*	*	*	*				4
POSADAS						*	*	*	*				4
POZOBLANCO							*	*					2
VILLARALTO							*	*	*				3

## CUADRO Nº 13.—VARIABILIDAD CON QUE UN MES ES CALIDO

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.
ALDEA DE CUENCA						3	10	9	6			
BELALCAZAR					2	7	10	10	5			
CGR DOBA *AEROPUERTO*					1	8	10	10	8			
HORNACHUELOS				1	4	9	10	10	9	2		
LUCENA					1	5	10	10	5			
MONTORO					1	6	10	10	6			
PANTANO DE GUADALMELLATO					1	6	10	10	8	1		
PANTANO DE IZNAJAR						4	10	10	5			
PANTANO PUENTE NUEVO					2	6	9	9	5			
PEDROCHE						1	9	9	3			
PERARRIJA-PUEBLONUEVO					2	9	10	10	7			
POSADAS						8	10	10	7			
POZOBLANCO						3	10	10	5			
VILLARALTO					1	5	10	10	6			

**CUADRO Nº 14.—PLUVIOMETRIA MEDIA Y COEFICIENTES  $\alpha$ ,  $\beta$ , Q y R MENSUALES**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA	ALFA	0,7	0,8	1,1	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,5	0,1	599,9
	BETA	41,1	38,9	30,9	32,1	30,7	32,7	10,4	5,1	127,0	49,9	42,6	64,4	
	MEDIA	69,7	70,9	66,8	50,5	40,4	35,7	1,6	3,4	57,2	62,5	64,4	70,1	
	Q	3,3	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	83,3	37,4	16,7	0,0	0,0	0,0	
BELALCAZAR	ALFA	1,0	0,1	0,9	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,1	0,6	1,1	0,6	432,8
	BETA	27,2	43,9	28,1	27,4	27,0	23,0	22,8	15,7	22,0	30,3	21,8	36,5	
	MEDIA	51,2	50,4	55,2	41,9	33,7	25,2	5,4	4,2	17,6	44,5	40,0	57,5	
	Q	7,1	3,7	0,0	4,0	3,9	10,7	59,3	57,7	28,0	11,1	3,7	3,7	
CORDOBA *AEROPUERTO*	ALFA	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,5	0,3	655,0
	BETA	70,8	65,0	60,0	52,4	38,7	16,2	10,6	5,9	34,4	90,1	50,6	60,7	
	MEDIA	88,5	74,6	91,8	61,6	42,7	16,9	3,3	3,1	25,3	78,0	79,3	89,9	
	Q	0,0	4,2	0,0	2,0	0,0	16,7	63,8	61,7	17,0	2,1	2,1	2,1	
HORNACHUELOS	ALFA	1,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	705,0
	BETA	49,0	104,1	45,7	58,2	52,6	34,7	1,7	32,0	37,7	80,3	70,7	75,0	
	MEDIA	89,0	90,5	89,5	55,4	47,7	21,7	0,2	0,1	23,7	77,9	100,4	95,0	
	Q	10,3	3,5	6,9	10,3	3,9	17,9	88,9	75,9	18,5	6,9	3,2	3,2	
LUCENA	ALFA	0,5	0,2	1,3	0,9	0,1	0,4	0,0	0,2	0,1	0,0	1,0	0,3	684,1
	BETA	54,0	67,4	37,6	32,8	43,9	18,9	21,3	16,3	45,4	74,7	43,1	75,3	
	MEDIA	82,7	79,0	87,6	62,7	48,7	24,7	3,8	5,3	33,6	70,4	86,9	98,8	
	Q	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	10,5	81,1	56,8	15,8	0,0	0,0	0,0	
MONTORO	ALFA	0,8	0,2	0,9	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,8	0,3	544,9
	BETA	38,7	54,7	35,9	37,1	37,3	15,0	13,1	12,1	25,2	71,7	33,2	50,2	
	MEDIA	65,7	71,4	70,1	40,9	40,4	18,7	2,4	4,4	24,7	59,7	60,4	76,1	
	Q	2,8	5,7	0,0	0,0	2,9	5,6	72,2	55,6	17,7	2,8	2,9	0,0	
PANTANO DE GUADALMELLAT	ALFA	0,3	0,2	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	706,7
	BETA	74,5	76,5	45,3	39,3	40,8	25,8	3,9	17,6	30,0	61,1	69,6	88,2	
	MEDIA	100,1	92,7	91,5	65,8	51,3	24,3	1,3	4,0	22,8	60,8	86,1	100,0	
	Q	3,2	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	68,8	62,5	22,6	0,0	3,2	3,2	
PANTANO DE IZNAJAR	ALFA	0,0	0,0	0,5	0,3	0,5	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	447,4
	BETA	49,3	53,9	32,2	35,5	118,9	20,5	7,2	7,8	34,1	53,3	44,2	54,4	
	MEDIA	51,4	49,8	49,4	45,1	56,5	15,2	1,4	3,2	21,0	42,6	51,9	60,1	
	Q	2,5	0,0	0,0	5,0	5,0	12,5	72,5	57,5	27,5	7,5	2,6	0,0	
PANTANO PUENTE NUEVO	ALFA	0,5	0,1	0,9	0,7	0,0	0,6	0,2	0,1	0,4	0,1	0,5	0,7	817,7
	BETA	84,8	105,3	47,1	49,1	41,4	22,2	10,6	11,3	61,8	79,9	63,5	67,3	
	MEDIA	121,6	118,5	92,5	79,6	45,6	36,8	4,0	0,8	31,1	67,1	100,2	113,9	
	Q	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	52,6	31,6	5,9	0,0	0,0	5,6	
PEDROCHE	ALFA	0,3	0,5	1,2	1,2	1,0	0,5	0,3	0,1	0,1	0,6	0,8	0,5	484,8
	BETA	40,2	38,1	24,2	20,5	21,0	22,1	11,6	16,5	24,4	36,0	28,6	34,7	
	MEDIA	55,7	57,9	54,3	46,8	43,6	30,9	5,5	9,1	18,9	54,5	52,3	55,3	
	Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	64,0	36,0	12,0	8,0	0,0	0,0	
PEÑARROYA-PUJEBLONUEVO	ALFA	0,3	0,0	0,8	0,4	0,2	0,0	0,5	0,5	0,3	0,1	0,4	0,3	517,9
	BETA	46,1	63,0	38,4	35,2	37,1	23,6	20,8	18,8	40,1	41,1	38,5	54,1	
	MEDIA	59,2	57,5	72,9	49,8	46,8	20,4	3,0	6,4	26,1	48,3	57,0	72,5	
	Q	2,6	2,0	0,0	5,4	0,0	10,8	69,4	29,7	13,5	0,0	0,0	0,0	
POSADAS	ALFA	0,9	0,1	1,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0	0,8	0,8	632,4
	BETA	48,7	71,6	38,5	69,2	42,6	29,3	15,0	15,8	42,9	79,4	40,4	48,4	
	MEDIA	87,5	79,6	78,7	59,8	45,6	20,1	2,2	5,1	21,8	73,0	72,7	86,3	
	Q	5,9	0,0	3,0	3,2	2,9	8,6	75,9	56,7	19,4	3,0	3,1	3,1	
POZOBLANCO	ALFA	0,1	0,0	1,4	1,2	0,9	0,4	0,2	0,1	0,0	0,2	0,6	0,4	492,4
	BETA	44,5	54,8	24,9	22,9	22,7	24,2	18,6	14,2	25,7	41,1	32,0	43,4	
	MEDIA	53,3	55,5	61,5	49,9	44,2	31,3	6,9	5,9	21,3	50,4	51,4	60,8	
	Q	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	7,9	47,4	50,0	13,2	2,6	0,0	2,6	
VILLARALTO	ALFA	0,7	1,2	1,0	1,6	0,9	1,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,7	0,3	503,6
	BETA	36,0	24,6	25,3	18,1	24,2	12,8	14,8	22,6	29,2	57,4	30,8	48,0	
	MEDIA	66,3	54,5	52,5	45,9	46,2	27,6	6,8	12,3	20,0	61,7	55,5	59,7	
	Q	4,2	0,0	0,0	4,0	0,0	12,0	44,0	32,0	20,0	4,0	0,0	4,4	
ADAMUZ	ALFA	0,7	0,4	0,6	0,3	0,3	0,2	1,1	0,5	0,2	0,1	0,4	0,8	582,3
	BETA	51,3	57,6	46,4	40,7	31,9	18,0	2,8	11,5	35,4	71,4	47,0	44,1	
	MEDIA	80,5	79,2	76,2	54,9	39,1	17,4	1,7	3,5	22,0	61,5	67,0	79,3	
	Q	8,6	5,9	0,0	2,9	8,8	20,6	71,4	80,7	21,9	3,1	2,9	2,9	

**CUADRO Nº 14.—PLUVIOMETRIA MEDIA Y COEFICIENTES  $\alpha$ ,  $\beta$ , Q y R MENSUALES (cont.)**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	UCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
AGUILAR DE LA FRONTERA	ALFA	0,5	0,4	1,1	0,8	0,4	0,3	12,8	0,1	0,4	0,2	0,7	0,5	547,3
	BETA	47,3	52,0	34,0	25,5	37,1	18,3	1,1	21,8	24,4	49,0	37,8	50,2	
	MEDIA	70,0	71,2	71,5	46,9	43,9	19,2	1,8	6,5	24,2	54,5	64,0	73,0	
	Q	2,9	2,8	2,7	2,8	16,7	19,4	88,6	73,0	32,4	13,5	2,7	3,4	
	R	97,1	97,2	97,3	97,2	83,3	80,6	11,4	27,0	67,6	86,5	97,3	94,6	
ALBENDIN 'C.H.G.'	ALFA	1,1	0,2	0,6	1,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	465,9
	BETA	27,3	45,7	35,9	21,3	38,4	16,8	18,4	11,3	38,8	49,0	36,1	41,6	
	MEDIA	54,6	54,5	58,9	45,0	39,8	18,1	5,0	4,3	24,5	50,9	50,4	59,9	
	Q	5,4	5,4	0,0	8,3	2,8	10,8	69,4	54,3	18,9	0,1	2,7	2,8	
	R	94,6	94,6	100,0	91,7	97,2	89,2	30,6	45,7	81,1	91,9	97,3	97,2	
ALCARACEJOS	ALFA	0,1	0,0	1,4	0,4	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	485,0
	BETA	48,0	63,0	22,7	32,1	19,5	20,4	18,6	12,4	27,6	49,2	35,4	65,8	
	MEDIA	56,6	58,4	53,7	40,6	39,4	28,9	6,8	6,7	17,4	57,7	45,7	67,1	
	Q	0,0	3,1	3,1	3,0	0,0	6,5	50,0	32,3	21,2	10,0	6,1	0,0	
	R	100,0	96,9	96,9	97,0	100,0	93,6	50,0	67,7	78,8	90,0	93,9	100,0	
ALCOLEA	ALFA	0,2	0,1	0,8	0,4	0,0	0,6	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	0,5	597,3
	BETA	67,6	65,6	39,8	34,4	50,9	13,4	2,9	10,0	53,8	61,7	48,6	52,0	
	MEDIA	85,9	72,8	69,8	50,4	46,0	18,8	0,7	3,6	29,3	64,9	74,1	81,0	
	Q	0,0	3,9	3,9	0,0	7,4	16,0	72,0	61,5	20,0	3,9	3,9	0,0	
	R	100,0	90,2	96,2	100,0	92,6	84,0	28,0	38,5	80,0	96,2	96,2	100,0	
ALMODOVAR DEL RIO	ALFA	0,4	0,0	2,2	0,3	0,1	0,5	1,3	0,0	0,3	0,7	0,7	0,4	497,9
	BETA	54,2	53,4	18,0	37,8	28,7	12,1	2,1	13,5	22,7	41,8	33,6	54,4	
	MEDIA	72,2	55,0	54,8	47,2	30,9	15,9	0,7	4,2	20,4	61,5	57,3	77,8	
	Q	6,1	2,8	5,7	5,9	2,9	15,2	84,9	70,6	33,3	14,3	2,8	2,8	
	R	93,9	97,2	94,3	94,1	97,1	84,9	15,2	29,4	66,7	85,7	97,2	97,2	
ARORA	ALFA	1,0	0,2	1,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	496,1
	BETA	29,5	40,6	24,1	32,2	29,3	22,1	19,3	12,6	26,3	43,4	44,4	35,0	
	MEDIA	58,3	53,9	66,7	49,8	42,1	28,3	4,7	5,7	20,6	50,0	55,0	61,0	
	Q	3,3	6,9	0,0	3,5	0,0	6,7	65,5	53,6	20,0	6,9	0,0	0,0	
	R	96,7	93,1	100,0	90,6	100,0	93,3	34,5	46,4	80,0	93,1	100,0	100,0	
BAENA 'C.H.G.'	ALFA	0,7	0,0	1,3	0,6	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,6	0,6	484,5
	BETA	35,3	59,8	29,4	27,1	30,7	15,5	14,8	6,1	29,2	39,9	35,3	35,8	
	MEDIA	59,0	62,2	68,6	44,8	37,3	18,3	4,2	3,1	22,6	48,6	55,4	59,8	
	Q	5,9	3,0	2,9	0,0	3,1	13,3	71,0	59,4	29,4	8,8	2,9	0,0	
	R	94,1	97,0	97,1	100,0	96,9	86,7	29,0	40,6	70,6	91,2	97,1	100,0	
BELMEZ	ALFA	0,3	0,5	0,9	1,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	514,2
	BETA	49,1	40,8	33,8	21,6	32,0	21,6	17,5	20,1	23,5	40,0	42,4	40,5	
	MEDIA	65,4	58,8	64,9	47,7	40,4	23,6	3,9	6,2	24,9	47,5	60,0	64,9	
	Q	3,2	6,3	0,0	3,2	0,0	16,7	63,0	50,0	22,6	3,2	3,2	0,0	
	R	96,8	93,8	100,0	96,8	100,0	83,3	37,0	50,0	77,4	96,8	96,8	100,0	
BELMEZ 'JAVALINA'	ALFA	0,2	0,1	0,9	0,7	0,8	0,2	2,8	1,1	0,1	0,2	0,6	0,3	594,8
	BETA	51,2	79,0	40,3	30,8	25,3	20,8	1,1	1,8	42,0	48,3	54,7	80,6	
	MEDIA	65,9	65,2	78,5	52,6	42,0	16,3	1,0	0,7	25,9	55,5	78,5	112,7	
	Q	0,0	4,8	0,0	5,0	10,0	36,8	77,8	82,4	25,0	5,3	10,5	0,0	
	R	100,0	95,2	100,0	95,0	90,0	63,2	22,2	17,7	75,0	94,7	89,5	100,0	
BENAMEJI 'ALCACHOFARES'	ALFA	1,3	0,3	1,2	0,8	0,4	0,8	2,7	0,8	0,2	0,4	1,2	0,3	549,6
	BETA	29,7	53,6	29,5	29,0	27,0	13,8	14,4	10,8	38,7	46,9	31,1	56,8	
	MEDIA	65,3	70,0	67,3	52,5	35,7	18,0	4,0	4,3	31,9	57,1	69,4	74,1	
	Q	5,7	2,9	0,0	3,0	6,1	29,6	92,6	78,6	33,3	17,9	3,0	2,9	
	R	94,3	97,1	100,0	97,0	93,9	70,4	7,4	21,4	66,7	82,1	97,0	97,1	
BUJALANCE	ALFA	0,8	0,0	0,8	0,7	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	579,4
	BETA	40,4	72,7	41,5	29,0	36,2	14,5	8,1	14,7	42,8	72,7	46,4	51,7	
	MEDIA	70,2	76,8	75,4	50,3	41,6	18,7	2,0	5,3	29,7	58,4	64,8	86,2	
	Q	5,7	2,9	0,0	2,9	2,9	11,8	74,3	58,8	14,3	2,9	2,9	0,0	
	R	94,3	97,1	100,0	97,1	97,1	88,2	25,7	41,2	85,7	97,1	97,1	100,0	
CABRA 'SALINERO'	ALFA	0,3	0,2	0,7	1,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	1,2	0,4	914,9
	BETA	87,4	101,1	68,6	36,0	53,2	19,0	15,8	6,6	39,7	102,6	54,2	97,3	
	MEDIA	119,3	124,0	115,1	75,7	63,0	23,5	1,9	3,8	37,3	91,1	118,5	141,7	
	Q	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	3,3	85,7	50,0	20,7	3,5	3,6	0,0	
	R	100,0	100,0	96,8	96,8	100,0	96,7	14,3	50,0	79,3	96,6	96,4	100,0	
CARCABUEY	ALFA	0,4	0,2	1,5	0,9	0,2	0,6	0,3	0,0	0,0	0,2	1,4	0,7	776,2
	BETA	74,0	93,8	41,2	35,0	42,8	14,9	15,0	8,9	39,5	56,3	35,9	66,5	
	MEDIA	106,3	110,7	103,9	68,1	51,3	23,4	4,1	4,6	32,1	70,1	86,9	114,7	
	Q	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	5,6	58,3	51,4	16,2	2,8	2,7	0,0	
	R	97,3	97,3	97,2	97,3	97,3	94,4	41,7	48,7	83,8	97,2	97,3	100,0	
CASTIL DEL CAMPO	ALFA	0,8	0,0	1,7	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,5	1,2	0,3	569,7
	BETA	39,9	70,5	27,3	33,5	40,0	18,1	10,6	10,4	33,9	38,4	30,1	56,0	
	MEDIA	71,7	70,4	73,4	54,8	44,5	20,7	2,7	5,6	28,4	55,1	64,9	77,5	
	Q	5,6	0,0	2,7	2,7	0,0	5,4	70,3	43,2	13,5	8,6	2,7	0,0	
	R	94,4	100,0	97,3	97,3	100,0	94,6	29,7	56,8	86,5	91,4	97,3	100,0	
CASTRO DEL RIO	ALFA	0,7	0,4	1,7	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,1	0,6	1,5	480,6
	BETA	35,2	46,7	24,3	28,0	39,0	12,0	11,3	17,3	25,1	50,3	36,6	27,5	
	MEDIA	58,7	62,1	63,8	43,5	34,6	14,8	1,8	4,2	21,8	53,0	56,9	65,4	
	Q	5,6	5,6	5,7	5,9	14,3	27,8	83,3	74,3	28,6	8,3	5,7	8,5	
	R	94,4	94,4	94,3	94,1	85,7	72,2	16,7	25,7	71,4	91,7	94,3	91,7	

**CUADRO Nº 14.—PLUVIOMETRIA MEDIA Y COEFICIENTES  $\alpha$ ,  $\beta$ , Q y R MENSUALES (cont.)**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AQU
DOÑA MENCIA	ALFA	0,9	0,1	0,9	1,0	0,2	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,8	0,4	
	BETA	56,6	84,5	52,6	37,7	46,5	27,0	21,6	14,3	42,2	76,2	47,5	76,8	
	MEDIA	107,0	98,1	100,0	73,2	50,0	27,4	4,6	5,8	56,8	71,7	86,3	112,4	775,3
	Q	5,4	0,0	2,7	2,4	0,0	2,7	47,1	37,8	16,2	0,0	2,8	0,0	
	R	94,6	100,0	97,3	94,6	100,0	97,3	52,9	62,2	83,8	100,0	97,2	100,0	
DOÑA RAMA	ALFA	0,2	0,1	1,5	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,6	0,5	0,3	
	BETA	58,4	71,0	27,6	51,9	36,8	27,3	28,3	18,1	31,7	40,0	50,0	60,6	
	MEDIA	73,1	80,7	68,1	58,8	49,8	26,3	4,9	6,9	27,5	57,3	69,7	73,8	604,9
	Q	0,0	2,8	3,0	2,4	2,9	11,4	73,5	65,6	25,0	13,9	8,6	2,8	
	R	100,0	97,2	97,0	97,1	97,1	80,6	26,5	34,4	75,0	86,1	91,4	97,2	
EL ESPARRAGAL	ALFA	0,8	0,0	1,2	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	
	BETA	51,1	101,0	43,4	38,8	36,3	17,7	6,5	16,5	37,8	62,6	45,7	77,3	
	MEDIA	90,6	97,0	94,2	57,5	43,1	22,4	1,4	7,1	30,0	57,6	79,6	104,7	685,2
	Q	5,6	5,4	2,7	6,3	5,7	11,8	79,3	59,4	27,3	6,6	0,0	0,0	
	R	94,4	94,6	97,3	91,7	94,3	88,2	20,7	40,6	72,7	91,4	100,0	100,0	
ENCINAS REALES	ALFA	1,3	0,3	1,3	1,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8	1,4	
	BETA	32,3	50,9	29,0	25,5	40,1	19,8	12,2	15,3	55,7	44,9	42,5	35,6	
	MEDIA	64,2	56,7	62,2	46,6	34,7	11,3	1,9	4,8	22,1	44,6	71,7	69,0	519,8
	Q	7,1	17,2	7,4	14,8	30,8	42,3	88,0	76,9	42,3	19,2	8,0	0,0	
	R	92,9	82,6	92,6	85,2	69,2	57,7	12,0	23,1	57,7	80,8	92,0	100,0	
ESPEJO	ALFA	0,9	0,1	1,0	1,3	0,5	0,1	0,8	0,0	0,4	0,0	0,5	0,8	
	BETA	37,6	57,5	34,0	24,1	29,0	23,2	5,7	14,4	24,7	67,2	37,8	39,6	
	MEDIA	64,7	60,3	66,8	51,2	39,1	13,4	1,5	2,8	24,3	52,7	58,6	71,3	506,7
	Q	11,1	6,1	5,9	3,8	14,7	48,4	85,7	81,8	31,4	17,1	2,9	2,9	
	R	88,9	93,9	94,1	91,2	85,3	51,6	14,3	18,2	68,0	82,9	97,1	97,1	
FERNAN NUREZ	ALFA	0,6	0,2	1,3	0,8	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,1	0,7	
	BETA	56,1	67,7	32,5	32,2	40,3	33,4	18,4	21,0	51,6	64,7	68,6	53,8	
	MEDIA	91,7	77,3	72,3	50,0	43,1	27,3	3,7	6,2	20,4	55,9	76,6	96,3	633,4
	Q	3,3	6,9	3,3	6,7	3,5	17,2	74,1	50,0	27,6	6,9	0,0	0,0	
	R	96,7	93,1	96,7	93,3	96,6	82,8	25,9	50,0	72,4	93,1	100,0	100,0	
FUENTE-UBEJUNA	ALFA	0,9	0,3	1,1	0,5	0,3	0,6	0,2	0,3	0,1	0,0	0,2	0,7	
	BETA	36,0	52,2	33,3	35,9	32,2	18,8	14,6	21,8	38,2	48,3	50,0	40,9	
	MEDIA	68,7	64,5	66,8	54,9	44,9	28,2	5,3	6,6	30,0	52,8	61,3	70,1	561,1
	Q	2,9	2,9	3,1	3,1	0,0	12,1	51,7	56,7	11,8	0,0	0,0	2,9	
	R	97,1	97,1	96,9	96,9	100,0	87,9	48,3	43,3	88,2	100,0	100,0	97,1	
HINOJOSA DEL DUQUE	ALFA	0,3	1,1	1,3	0,3	0,6	0,3	0,0	0,1	0,4	0,1	0,8	0,6	
	BETA	42,9	29,3	22,3	33,6	22,5	25,5	7,0	15,3	21,5	46,0	30,6	49,4	
	MEDIA	56,1	62,0	52,8	45,0	42,1	29,7	2,8	8,1	28,7	53,8	57,1	79,1	517,3
	Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	65,0	36,4	10,0	0,0	0,0	4,4	
	R	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	35,0	63,6	90,0	100,0	100,0	95,7	
HORNACHUELOS *LAS MESAS	ALFA	0,4	0,1	1,7	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,7	0,3	0,2	
	BETA	67,6	93,1	37,5	60,4	36,3	26,2	4,4	17,3	34,9	52,0	70,9	92,8	
	MEDIA	94,5	100,0	96,4	71,8	44,0	20,9	1,0	4,9	26,5	74,0	95,5	116,5	746,6
	Q	3,2	3,1	6,5	6,3	18,8	31,3	81,3	67,7	43,8	18,8	3,1	3,2	
	R	96,8	96,9	93,6	93,8	81,3	68,8	18,8	32,3	56,3	81,3	96,9	96,8	
LA CARLOTA	ALFA	0,4	0,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,7	1,0	
	BETA	51,1	61,1	30,8	46,6	38,4	26,2	4,3	13,7	35,7	77,4	36,7	39,2	
	MEDIA	71,4	70,0	63,9	51,2	39,7	23,0	1,5	5,9	24,6	61,2	63,5	76,4	552,3
	Q	5,4	2,8	2,8	2,7	3,3	8,3	68,8	66,7	12,1	5,6	2,8	2,9	
	R	94,6	97,2	97,2	97,3	96,7	91,7	31,3	33,3	87,9	94,4	97,2	97,1	
LUQUE	ALFA	0,2	0,1	0,9	0,8	0,3	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,4	0,5	
	BETA	80,0	83,3	43,4	31,2	37,6	17,8	8,0	10,1	28,8	66,4	53,7	62,3	
	MEDIA	89,8	93,7	82,0	54,9	45,1	20,9	2,2	3,5	26,0	64,0	73,9	91,9	647,9
	Q	8,6	3,2	3,1	6,3	9,7	25,8	70,0	59,4	24,2	8,6	2,9	5,9	
	R	91,4	96,8	96,9	93,8	90,3	74,2	30,0	40,6	75,8	91,4	97,1	94,1	
MONTILLA	ALFA	0,8	0,2	1,0	0,8	0,2	1,1	1,6	0,0	1,2	0,1	0,8	0,9	
	BETA	49,1	67,4	38,0	32,1	43,1	11,7	1,2	16,1	18,2	61,0	42,0	49,4	
	MEDIA	85,5	79,6	77,6	54,4	49,3	20,5	0,3	5,8	30,0	62,5	74,0	91,3	630,8
	Q	5,7	2,9	0,0	9,1	8,6	17,1	90,3	64,7	25,7	14,7	2,8	2,9	
	R	94,3	97,1	100,0	90,9	91,4	82,9	9,7	35,3	74,3	85,3	97,2	97,1	
MONTORO *VEGA DE ARMIJO	ALFA	0,7	0,2	0,7	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,6	0,3	
	BETA	38,7	57,1	39,4	33,4	33,2	13,7	24,0	9,7	36,9	57,4	37,3	59,7	
	MEDIA	63,2	69,4	65,7	43,4	39,9	17,6	4,5	3,2	23,5	58,1	60,0	79,5	528,0
	Q	5,4	5,4	2,9	0,0	2,9	8,8	73,5	55,9	17,1	8,6	2,8	0,0	
	R	94,6	94,6	97,1	100,0	97,1	91,2	26,5	44,1	82,9	91,4	97,2	100,0	
MORENTE	ALFA	0,8	0,3	1,2	0,6	0,1	0,3	1,2	0,1	0,0	0,1	0,5	0,4	
	BETA	39,1	60,0	29,8	33,3	42,2	13,3	2,2	8,8	43,6	71,7	49,7	56,0	
	MEDIA	67,7	75,4	66,3	52,3	45,7	17,5	1,2	3,0	30,7	60,8	72,0	81,5	574,1
	Q	5,7	5,6	2,9	2,8	5,7	3,1	75,8	60,6	22,6	5,6	5,7	0,0	
	R	94,3	94,4	97,1	97,2	94,3	96,9	24,2	40,0	77,4	94,4	94,3	100,0	
NUEVA CARTEYA	ALFA	0,2	0,0	1,4	0,9	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,6	
	BETA	68,1	88,4	35,6	31,7	40,5	19,7	10,6	7,4	30,2	63,5	45,3	62,0	
	MEDIA	83,0	88,0	87,6	59,1	46,1	22,4	2,8	3,7	29,5	56,5	73,0	99,3	651,0
	Q	2,9	2,8	0,0	2,8	0,0	22,6	71,9	54,3	20,0	5,7	0,0	2,9	
	R	97,1	97,2	100,0	97,2	100,0	77,4	28,1	45,7	80,0	94,3	100,0	97,1	

**CUADRO Nº 14.—PLUVIOMETRIA MEDIA Y COEFICIENTES  $\alpha$ ,  $\beta$ , Q y R MENSUALES (cont.)**

ESTACION	CLAVE ENERG	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	ARO
OBEJU	ALFA	0,2	0,3	0,7	1,1	0,5	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
	BETA	65,9	72,0	40,5	29,9	33,2	20,6	5,0	9,3	40,3	69,8	61,9	64,3
	MEDIA	77,2	94,4	72,7	61,5	48,8	22,1	2,0	4,1	22,0	63,1	63,1	78,0
	Q	6,5	0,0	0,0	3,3	6,3	12,9	72,4	58,1	27,3	0,0	5,9	6,1
	R	93,6	100,0	100,0	96,7	93,8	87,1	27,6	41,9	72,7	100,0	94,1	93,9
PALMA DEL RIO	ALFA	0,6	0,5	2,6	0,2	0,2	0,7	0,2	0,5	0,0	0,5	0,3	
	BETA	42,8	47,0	18,7	49,9	29,4	12,3	7,6	4,1	30,6	70,0	41,3	55,0
	MEDIA	65,0	68,7	63,6	53,7	30,8	15,6	1,7	2,0	21,7	64,4	65,5	73,9
	Q	3,5	3,6	6,9	10,7	14,3	27,6	82,1	67,0	31,0	3,5	0,0	3,5
	R	96,6	96,4	93,1	89,3	85,7	72,4	17,9	31,0	69,0	90,6	100,0	90,6
PRIEGO DE CORDOBA	ALFA	0,4	0,1	1,0	0,6	0,2	0,1	1,5	0,1	0,0	0,4	1,7	1,4
	BETA	67,9	88,7	42,8	35,8	35,5	20,9	2,9	11,3	38,2	42,5	32,0	40,0
	MEDIA	97,8	97,5	85,0	59,4	42,7	21,9	2,4	7,0	35,4	60,3	87,7	113,0
	Q	3,3	3,5	3,5	0,0	3,5	10,7	67,9	44,8	14,3	3,3	0,0	0,0
	R	96,7	90,6	96,6	100,0	96,6	89,3	32,1	55,2	65,7	96,7	100,0	100,0
PUENTE GENIL 'AFOROS'	ALFA	1,3	0,0	0,9	1,0	0,2	1,0	0,5	0,2	0,0	0,1	0,8	0,3
	BETA	25,9	60,9	36,7	19,2	34,8	9,1	34,0	21,1	47,5	45,8	36,4	49,7
	MEDIA	55,8	65,2	70,3	36,3	39,1	14,5	3,7	6,6	31,0	47,6	63,7	67,4
	Q	9,4	0,0	3,3	0,5	10,0	21,9	76,7	58,1	30,0	6,5	3,3	0,0
	R	90,6	100,0	96,7	93,6	90,0	78,1	23,3	41,9	70,0	93,6	96,7	100,0
RUTE	ALFA	0,8	0,2	1,1	0,5	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	1,4	1,3
	BETA	43,2	60,3	33,9	36,0	38,6	13,7	12,1	12,0	47,4	60,7	28,0	38,2
	MEDIA	78,1	82,6	72,1	54,4	41,1	17,5	2,7	4,3	30,3	60,2	67,3	90,1
	Q	2,8	0,0	0,0	2,8	2,8	13,8	61,8	53,1	22,9	2,9	2,9	0,0
	R	97,2	100,0	100,0	97,2	97,2	86,2	38,2	46,9	77,1	97,1	97,1	100,0
SAN CALIXTO	ALFA	0,3	0,6	1,0	1,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,7	0,7
	BETA	84,0	63,1	38,6	34,7	35,1	27,5	8,1	41,9	31,0	80,9	53,5	62,6
	MEDIA	108,7	99,5	76,0	67,2	44,5	23,0	0,9	11,9	28,0	69,3	91,7	104,6
	Q	6,3	2,9	2,9	12,1	3,1	30,0	83,9	71,9	21,9	5,6	0,0	2,9
	R	93,8	97,1	97,1	87,9	96,9	70,0	16,1	28,1	78,1	94,4	100,0	97,1
SANTAELLA	ALFA	0,0	0,1	1,3	0,8	0,0	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,8	0,2
	BETA	66,2	58,8	27,1	26,6	32,4	11,6	25,5	21,2	43,0	62,5	32,9	54,1
	MEDIA	70,6	63,0	61,1	46,7	30,0	19,5	4,4	6,3	24,0	50,2	59,8	67,5
	Q	0,0	2,9	2,9	5,7	5,9	7,1	64,5	51,6	21,2	5,7	2,8	0,0
	R	100,0	97,1	97,1	94,3	94,1	92,9	35,5	48,4	78,8	94,3	97,2	100,0
TORRECAMPO	ALFA	0,9	0,2	2,1	0,6	0,6	0,8	0,5	0,8	0,2	0,5	0,9	0,7
	BETA	34,2	49,6	23,1	32,9	27,9	20,3	11,2	7,8	21,0	40,3	33,2	42,8
	MEDIA	65,4	59,2	62,7	53,4	46,7	35,0	6,4	7,2	21,8	58,6	64,3	77,0
	Q	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	8,0	64,0	50,0	16,0	4,2	0,0	0,0
	R	100,0	96,4	100,0	100,0	100,0	92,0	36,0	50,0	84,0	95,8	100,0	100,0
TORRES CABREHA	ALFA	0,6	0,1	1,5	0,3	0,1	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,6
	BETA	42,0	55,1	25,4	35,8	33,4	13,3	11,6	8,9	39,3	59,7	48,8	44,7
	MEDIA	65,0	63,9	63,8	46,3	34,9	18,9	2,9	2,8	21,3	55,8	60,3	70,1
	Q	6,5	3,0	3,1	6,1	12,5	11,8	62,5	70,6	19,4	11,8	2,9	3,1
	R	93,6	97,0	96,9	93,9	87,5	88,2	37,5	29,4	80,7	88,2	97,1	96,9
VALENZUELA	ALFA	0,6	0,3	1,1	0,6	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9
	BETA	39,6	51,9	28,9	29,5	27,6	14,6	20,8	11,2	35,3	47,8	37,0	35,1
	MEDIA	64,1	63,8	59,8	47,9	39,0	17,2	4,3	3,7	28,0	53,3	56,8	65,7
	Q	2,9	5,7	2,9	2,9	5,7	31,4	73,5	67,7	22,9	14,7	2,9	3,0
	R	97,1	94,3	97,1	97,1	94,3	68,6	26,5	32,4	77,1	85,3	97,1	97,0
VENTA AZUEL	ALFA	0,6	0,1	1,2	0,3	0,6	0,3	0,6	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6
	BETA	58,6	78,3	34,3	51,8	32,1	22,0	2,9	15,0	37,3	78,3	41,9	58,7
	MEDIA	92,4	86,2	75,6	62,8	49,2	25,2	1,5	6,1	23,8	66,4	60,8	93,0
	Q	4,2	7,4	0,0	8,7	8,3	14,3	70,0	52,6	26,9	11,1	10,3	3,3
	R	95,8	92,6	100,0	91,3	91,7	85,7	30,0	47,4	73,1	88,9	89,7	96,7
VENTA DE CARJENA	ALFA	0,5	0,0	1,0	1,2	0,6	0,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3
	BETA	77,3	111,3	52,7	36,4	38,6	25,0	4,7	8,2	39,5	80,4	70,1	99,3
	MEDIA	116,9	107,0	102,0	78,1	63,6	29,8	3,4	4,3	34,8	80,8	83,4	138,6
	Q	0,0	3,3	3,3	6,7	0,0	6,9	59,3	55,6	15,6	6,3	3,1	0,0
	R	100,0	96,7	96,7	93,3	100,0	93,1	40,7	44,4	84,4	93,8	96,9	100,0
V. DE CARJENA 'V. DEL C	ALFA	0,2	0,1	0,0	1,4	0,6	1,3	0,1	0,0	0,7	0,0	0,2	0,3
	BETA	89,9	108,3	110,1	32,9	34,9	16,2	5,1	14,2	16,6	77,5	75,1	88,8
	MEDIA	112,0	123,7	118,7	75,9	55,9	32,9	1,8	6,9	22,0	78,8	89,1	119,4
	Q	3,1	0,0	0,0	6,7	3,3	15,8	71,4	52,0	25,8	6,3	3,1	3,1
	R	96,9	100,0	100,0	93,3	96,7	84,2	28,6	48,0	74,2	93,6	96,9	96,9
VILLA DEL RIO	ALFA	0,8	0,0	1,0	0,2	0,1	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,8
	BETA	36,8	73,2	34,5	35,7	37,8	17,8	11,8	13,0	38,4	63,5	56,9	35,5
	MEDIA	66,9	67,9	67,1	45,4	43,2	16,9	2,0	4,4	25,9	53,5	63,9	65,2
	Q	3,0	0,0	3,0	0,0	3,1	3,0	67,7	43,3	15,6	3,1	0,0	0,0
	R	97,0	100,0	97,0	100,0	96,9	97,0	32,3	56,7	84,4	96,9	100,0	100,0
VILLAFRANCA DE CORDOBA	ALFA	0,7	0,0	0,9	0,7	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,2	
	BETA	46,2	80,4	42,4	32,4	39,0	22,2	10,8	12,0	34,9	65,6	50,6	67,7
	MEDIA	77,1	81,1	80,8	57,6	47,2	21,5	3,2	4,6	27,1	67,5	71,4	88,0
	Q	5,4	0,0	2,7	0,0	2,8	8,1	56,8	59,5	16,2	2,8	2,7	0,0
	R	94,6	100,0	97,3	100,0	97,2	91,9	43,2	40,5	83,8	97,2	97,3	100,0

**CUADRO Nº 14.—PLUVIOMETRIA MEDIA Y COEFICIENTES  $\alpha$ ,  $\beta$ , Q y R MENSUALES (cont.)**

ESTACION	CLAVE	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGÜSTO	SETIE.	DCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
VILLAHARTA	ALFA	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,7	0,6	561,1
	BETA	48,6	78,6	51,3	41,7	46,3	18,9	14,7	7,1	41,6	58,5	40,8	45,7	
	MEDIA	62,0	73,6	70,5	53,0	58,2	20,0	3,2	4,0	22,3	58,0	66,0	70,9	
	Q	3,2	6,7	3,3	0,7	6,7	21,2	78,1	58,1	32,3	10,0	6,7	6,5	
	R	96,8	93,3	96,7	93,3	93,3	78,8	21,9	41,9	67,7	90,0	93,3	93,6	
VILLANUEVA DE CORDOBA	ALFA	0,4	0,0	1,0	1,3	0,3	0,3	0,1	0,4	0,0	0,1	0,7	0,5	627,2
	BETA	54,8	78,6	35,3	25,7	38,8	25,7	15,6	9,2	27,3	101,9	39,9	53,3	
	MEDIA	74,9	70,6	73,9	56,1	52,4	29,5	5,2	6,9	22,3	80,3	67,7	81,4	
	Q	2,9	0,0	0,0	5,7	0,0	17,1	61,1	50,0	25,0	5,9	2,8	2,8	
	R	97,1	100,0	100,0	94,3	100,0	82,9	38,9	50,0	75,0	94,1	97,2	97,2	
VILLANUEVA DEL REY	ALFA	0,6	0,1	0,9	0,1	0,3	0,9	0,1	0,5	0,0	0,2	0,3	0,3	652,7
	BETA	50,0	79,5	43,5	54,8	36,8	13,0	5,2	7,7	30,0	52,5	56,4	73,6	
	MEDIA	79,1	89,4	82,9	61,7	51,2	22,5	2,6	5,5	23,3	64,2	76,1	94,2	
	Q	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0	11,1	57,1	52,8	16,7	5,6	2,8	2,8	
	R	97,2	97,2	100,0	97,2	100,0	88,9	42,9	47,2	83,3	94,4	97,2	97,2	
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	ALFA	0,4	3,0	0,6	0,9	0,3	0,8	0,1	0,6	0,1	0,0	0,1	0,4	822,1
	BETA	85,7	107,5	62,0	39,2	56,5	15,0	13,1	9,3	50,1	79,5	79,3	83,4	
	MEDIA	116,6	111,6	104,7	73,4	68,4	21,4	3,2	5,8	30,7	78,9	93,1	114,3	
	Q	2,9	0,0	0,0	2,9	8,8	21,2	78,1	61,8	25,1	5,7	0,0	2,9	
	R	97,1	100,0	100,0	97,1	91,2	78,8	21,9	38,2	74,3	94,3	100,0	97,1	
ZAMBRA	ALFA	0,9	0,2	0,9	0,9	0,4	1,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,9	1,1	698,5
	BETA	46,6	75,8	48,1	33,1	34,3	15,6	7,2	5,5	40,3	69,3	43,3	45,9	
	MEDIA	86,4	94,9	91,9	60,4	46,1	26,3	2,9	3,1	30,9	72,2	84,6	98,8	
	Q	2,9	0,0	2,8	5,7	5,7	18,9	75,0	64,9	22,2	2,9	0,0	0,0	
	R	97,1	100,0	97,2	94,3	94,3	81,1	25,0	35,1	77,8	97,1	100,0	100,0	

## CUADRO Nº 15.—PLUVIOMETRIA MEDIA ESTACIONAL

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTONO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	216.7	157.7	41.1	184.4	599.9
DE LA CAZAR	159.1	130.8	34.8	108.1	432.8
CORDOBA *AEROPUERTO*	253.0	140.1	23.3	162.6	655.0
HORNACHUELOS	283.0	192.6	20.0	202.0	705.6
LUCENA	260.5	198.9	33.8	190.9	684.1
MONTORO	217.2	157.4	25.5	144.6	544.7
PANTANO DE GUADALMELLATO	292.8	208.0	29.6	175.7	706.1
PANTANO DE IZNAJA	161.3	150.8	19.8	115.5	447.4
PANTANO PUENTE NUEVO	354.6	217.7	47.6	198.4	817.7
PEDRUCHE	168.9	144.7	45.5	125.7	484.8
PEÑARRIYA-PUEBLONUEVO	169.2	169.5	29.8	129.4	517.9
POSADAS	253.4	184.1	27.4	167.5	632.4
POZOBLANCO	169.6	155.0	44.1	123.1	492.4
VILLARALTO	174.5	144.6	46.7	137.8	503.6
ADAMUZ	239.0	170.2	22.6	150.5	582.3
AGUILAR DE LA FRONTERA	214.8	162.3	27.5	142.7	547.3
ALBENDIN *C.H.G.*	165.0	143.7	27.4	125.8	465.9
ALCARRAGEJOS	182.1	139.7	42.4	120.8	485.0
ALCOLEA	239.7	166.2	23.1	168.3	597.3
ALMOJCAR DEL RIO	205.0	132.9	20.8	139.2	497.9
ARGRA	173.2	158.6	38.7	125.6	496.1
BAENA *C.H.G.*	181.6	150.7	25.6	126.6	484.5
BELMEZ	189.1	159.0	33.7	132.4	514.2
BELMEZ *JAVALINA*	243.8	173.1	18.0	159.9	594.8
BENAMEJI *ALCACHOFARES B.*	209.4	155.5	26.3	158.4	549.6
BUJALANCE	233.2	167.3	26.0	152.9	579.4
CABRA *SALINERO*	385.0	253.8	29.2	246.9	914.9
CARCABUEY	331.7	223.3	32.1	189.1	776.2
CASTIL DEL CAMPO	219.6	172.7	29.0	148.4	569.7
CASTRO DEL RIO	186.2	141.9	20.8	131.7	480.6
DONA MENCIA	317.5	231.2	37.8	188.8	775.3
DONA RAMA	233.6	176.7	40.1	154.5	604.9
EL ESPARRAGAL	292.3	194.8	30.9	167.2	685.2
ENCINAS REALES	214.9	143.5	18.0	143.4	519.8
ESPEJO	196.3	157.1	17.7	135.6	506.7
FERNAN NUÑEZ	265.3	172.0	37.2	158.9	633.4
FUENTE-UBEJUNA	208.3	168.6	40.1	144.1	561.1
HINOJOSA DEL DUQUE	197.2	139.9	40.6	139.6	517.3
HORNACHUELOS *LAS MESAS*	311.0	212.2	26.8	196.6	746.6
LA CARLOTA	217.8	154.8	30.4	149.3	552.3
LUQUE	275.4	182.0	26.6	163.9	647.9
MONTILLA	256.4	181.3	26.6	166.5	630.8
MONTORO *VEGA DE ARMIJO*	212.1	149.0	25.3	141.6	528.0
MORENTE	224.6	164.3	21.7	163.5	574.1
NUEVA CARTEYA	270.3	192.8	28.9	159.0	651.0

## CUADRO Nº 15.—PLUVIOMETRIA MEDIA ESTACIONAL (cont.)

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	ANUAL
OBEJO	249.0	183.0	28.2	148.2	609.0
PALMA DEL RIO	211.6	148.1	19.3	151.6	530.6
PRIEGO DE CORDOBA	308.3	187.7	31.3	183.4	710.7
PUENTE GENIL 'AFOROS'	188.4	145.7	24.8	142.5	501.2
RUTE	250.8	167.6	24.5	157.8	600.7
SAN CALIXTO	312.8	187.7	35.8	189.0	725.3
SANTAELLA	201.1	137.8	30.2	134.0	503.1
TOKRECAMPO	201.6	162.8	48.6	144.7	557.7
TORRES CABRERA	199.0	145.0	24.6	137.4	506.0
VALENZUELA	193.6	146.7	25.2	138.1	503.6
VENTA AZUEL	271.6	187.6	32.8	151.0	643.0
VENTA DE CARDEÑA	362.5	243.7	37.5	199.0	842.7
V. DE CARDEÑA 'V. DEL CHARCO'	355.1	250.5	41.6	189.9	837.1
VILLA DEL RIO	200.0	155.7	23.3	143.3	522.3
VILLAFRANCA DE CORDOBA	246.2	185.6	29.3	166.0	627.1
VILLAHARTA	205.9	181.7	27.2	146.3	561.1
VILLANUEVA DE CORDOBA	232.9	162.4	41.6	170.3	627.2
VILLANUEVA DEL REY	262.7	195.8	30.6	163.6	652.7
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	342.5	246.5	30.4	202.7	822.1
ZAMBRA	280.1	198.4	32.3	187.7	698.5

## CUADRO Nº 16.—EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL MEDIA MENSUAL

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA	14.8	17.9	28.3	45.9	79.8	120.2	165.2	153.2	108.9	61.0	25.0	14.3	835.3
BELALCAZAR	6.1	11.4	32.3	52.0	99.5	142.2	195.8	174.4	105.3	57.2	23.2	11.0	914.0
CORDOBA 'AEROPUERTO'	16.2	21.0	37.2	56.7	91.7	136.4	179.6	163.1	113.3	65.8	29.9	16.4	934.5
HORNACHUELOS	15.4	21.5	38.8	57.2	105.4	142.1	184.7	177.5	123.6	70.9	33.5	17.4	980.2
LUCENA	16.4	20.7	34.3	51.3	88.2	121.7	160.1	151.9	101.9	63.1	27.7	15.7	859.4
MONTORO	16.7	20.0	37.2	54.9	92.9	130.7	179.0	163.2	110.9	64.6	30.1	16.8	918.6
PANTANO DE GUADALMELLATO	17.1	19.8	32.9	52.9	84.7	124.8	174.4	163.2	111.9	60.1	32.3	18.0	897.4
PANTANO DE IZNAJAR	19.4	22.2	34.9	48.9	81.2	114.7	162.4	147.6	102.7	63.3	30.2	17.2	844.7
PANTANO PUENTE NUEVO	17.0	18.3	32.7	48.0	83.1	113.2	163.0	146.4	98.8	60.9	28.5	16.3	832.7
PEDROCHE	14.1	16.8	29.6	46.3	84.3	117.3	168.7	157.1	106.1	57.4	26.7	14.7	839.2
PENARROYA-PUEBLO NUEVO	14.8	17.9	33.2	54.4	100.9	143.7	194.2	177.5	118.0	64.6	26.1	14.5	954.0
POSADAS	13.1	18.1	37.2	59.3	91.8	137.8	184.7	168.1	114.2	63.9	31.0	15.2	934.4
PUZOSBLANCO	12.2	17.1	30.7	49.1	81.9	120.7	174.4	163.2	109.4	60.9	24.6	12.1	850.1
VILLARALTO	14.9	16.2	30.4	47.2	84.8	116.5	163.2	151.4	104.3	57.6	24.4	15.2	827.4
ADAMUZ	16.3	19.5	36.0	57.9	98.1	136.7	184.7	163.2	109.3	61.6	28.8	15.9	928.8
AGUILAR DE LA FRONTERA	15.2	18.3	34.5	54.0	94.7	131.5	179.6	163.2	107.8	61.4	27.3	14.6	902.3
ALBENDIN 'C.H.G.'	15.7	18.8	35.3	55.8	96.5	133.1	184.7	163.2	106.2	61.4	28.0	15.3	916.0
ALCARACEJOS	13.7	16.4	30.0	48.8	88.8	123.0	174.4	157.9	105.5	61.2	25.4	12.8	838.4
ALCOLEA	17.1	20.7	39.3	61.4	101.8	142.4	189.0	168.1	111.0	61.9	29.9	17.0	960.2
ALMODÓVAR DEL RÍO	16.9	20.5	39.0	61.0	102.1	141.3	189.6	168.1	111.2	61.5	29.6	16.8	957.7
ANDRA	13.5	16.2	30.3	48.4	86.2	122.2	174.4	157.9	105.6	61.4	25.1	12.0	855.9
BAENA 'C.H.G.'	14.7	17.7	33.1	52.1	92.5	128.3	179.6	163.2	106.8	61.2	26.0	14.0	889.9
BELMEZ	14.3	17.4	32.6	51.3	75.6	126.4	179.6	163.2	106.8	61.4	26.0	13.7	868.9
BELMEZ 'JAVALINA'	14.5	17.5	32.8	51.7	91.8	127.4	179.6	163.2	106.9	61.4	26.4	13.8	887.2
BENAMEJÍ 'ALCACHOFARES B.'	14.8	17.7	33.1	52.1	91.7	127.2	179.6	163.2	105.7	61.9	26.9	14.0	888.2
BUJALANCE	14.3	17.4	32.0	51.3	75.6	126.4	179.6	163.2	106.8	61.4	26.6	13.7	868.9
CABRA 'SALINERO'	15.1	18.0	34.0	53.3	92.7	128.7	179.6	163.2	106.2	61.9	27.0	14.5	894.7
CARCABUEY	13.4	15.9	29.9	48.5	87.6	121.3	174.4	157.9	104.7	62.1	25.5	12.3	853.5
CASTIL DEL CAMPO	13.3	15.8	29.8	47.8	87.3	119.8	174.4	150.6	104.2	61.9	25.0	12.3	848.1
CASTRO DEL RÍO	16.3	19.4	37.3	57.8	98.0	136.6	184.7	163.2	109.3	61.6	28.7	15.9	928.9
DONA MENCIA	13.8	16.5	31.2	49.0	89.2	123.7	174.4	157.9	106.1	61.5	25.5	12.9	862.3
DONA RAMA	13.8	16.5	31.2	49.6	89.2	123.7	174.4	157.9	106.1	61.5	25.5	12.9	862.3
EL ESPARKAGAL	13.6	16.3	31.0	49.3	89.5	122.9	174.4	157.9	105.4	61.1	25.3	12.7	859.4
ENCINAS REALES	15.0	17.9	33.3	53.0	92.2	128.0	179.6	163.2	106.4	62.2	27.1	14.1	891.9
ESPEJO	14.9	18.0	34.0	53.3	93.5	129.8	179.6	163.2	107.2	61.3	26.9	14.3	896.1
FERNAN NUREZ	15.8	19.0	36.1	56.1	96.2	133.9	184.7	163.2	108.9	61.7	28.1	15.5	919.2
FUENTE-OB EJUNA	13.5	16.2	30.3	48.4	88.2	122.2	174.4	157.9	105.6	61.4	25.1	12.6	855.9
HINOJOSA DEL DUQUE	14.1	16.8	31.7	50.7	90.3	125.2	175.8	164.6	106.6	61.6	25.9	13.0	875.7
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	15.8	19.0	36.1	56.1	96.2	133.9	184.7	163.2	108.9	61.7	28.1	15.5	919.2
LA CARLOTA	16.4	19.9	37.5	58.2	98.6	137.5	184.7	163.2	110.0	61.9	28.9	16.0	933.0
LUQUE	13.1	15.8	29.8	47.7	87.9	121.7	174.4	156.6	105.2	61.2	24.7	12.3	850.4
MONTILLA	15.2	18.3	34.4	53.8	94.2	130.7	179.6	163.2	108.0	58.7	27.2	14.5	897.9
MONTORO 'VEGA DE ARMIJO'	16.7	19.9	38.1	59.7	100.0	139.5	184.7	168.1	109.7	61.5	29.4	16.3	943.7
MORENTE	16.5	19.7	37.1	58.3	98.7	137.6	184.7	163.2	109.2	61.4	29.0	16.1	931.5
NUEVA CARTEYA	14.5	17.5	32.8	51.7	91.8	127.4	179.6	163.2	106.9	61.4	26.4	13.8	887.2

## CUADRO Nº 16.—EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL MEDIA MENSUAL (cont.)

ESTACION	ENERJ	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTOB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
OBEJO	12.8	15.5	20.9	47.1	80.9	120.2	174.4	156.6	104.7	61.1	24.7	11.7	844.6
PALMA DEL RIO	17.6	21.3	46.2	62.7	104.0	145.5	189.0	168.1	111.6	61.9	30.6	17.5	970.6
PRIEGO DE CORDOBA	13.5	16.1	30.2	48.2	87.1	120.6	174.4	156.6	104.1	61.8	25.3	12.2	849.9
PUNTE GENIL 'AFJROS'	16.9	20.2	38.0	59.6	99.1	138.3	184.7	168.1	109.5	62.0	29.6	16.6	942.8
RUTE	13.4	15.9	30.0	47.9	87.6	121.3	174.4	157.9	104.7	62.2	25.5	12.3	853.1
SAN CALIXTO	14.5	17.5	32.8	51.7	91.8	127.4	179.0	163.2	106.9	61.4	26.4	13.8	887.2
SANTAELLA	16.0	19.5	36.9	57.9	98.1	136.7	184.7	163.2	109.3	61.6	28.8	15.9	928.7
TORRECAMPO	13.7	16.7	31.1	50.0	89.8	124.5	174.4	163.2	106.0	61.3	25.7	13.0	869.4
TUKRES CABREKA	16.0	19.8	37.9	58.7	99.4	138.5	184.7	163.2	109.9	61.8	29.2	16.2	935.9
VALENZUELA	15.5	18.7	35.1	55.4	95.0	132.2	184.7	163.2	108.3	61.6	27.6	14.9	912.4
VENTA AZUEL	13.1	15.8	29.0	47.7	87.9	121.6	174.4	156.6	105.1	61.2	25.1	12.2	850.6
VENTA DE CARJENA	12.6	15.2	28.5	46.0	86.0	118.0	168.7	155.7	104.3	61.1	24.0	11.4	831.7
V. DE CARJENA 'V. DEL CHARCO	12.7	15.3	28.6	46.8	86.4	119.5	168.7	156.6	104.8	61.3	24.5	11.6	837.0
VILLA DEL RIO	16.0	19.8	37.9	58.8	99.8	139.4	184.7	168.1	109.6	61.3	33.2	16.2	945.4
VILLAFRANCA DE CORDOBA	16.7	20.3	38.7	59.8	103.4	143.7	189.0	168.1	110.4	61.7	29.4	16.7	955.6
VILLAHARTA	13.7	16.7	31.2	49.5	90.0	123.6	174.4	157.9	106.1	61.4	25.8	12.8	863.2
VILLANUEVA DE CORDOBA	12.9	15.5	29.0	46.6	87.0	119.4	174.4	156.6	104.0	61.2	24.4	11.7	843.4
VILLANUEVA DEL REY	13.0	16.3	31.0	49.3	89.5	122.9	174.4	157.9	105.4	61.1	25.3	12.7	859.4
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	13.1	15.7	29.2	47.0	86.0	120.1	174.4	156.6	105.4	61.0	24.6	11.9	845.8
ZAMBRA	13.6	16.1	30.2	48.9	88.2	122.1	174.4	157.9	104.6	61.9	25.7	12.5	856.1

## CUADRO Nº 17.—EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL MEDIA ESTACIONAL

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	47.0	153.9	438.6	195.8	835.3
BELALCAZAR	31.2	184.6	512.4	185.8	914.0
CORDOBA 'AEROPUERTO'	53.6	185.7	484.2	211.0	934.5
HORNACHUELOS	54.3	201.4	504.4	228.1	988.2
LUCENA	52.8	174.3	439.7	192.7	859.4
MONTORO	54.1	185.1	473.6	205.9	918.6
PANTANO DE GUAJALMELLATO	54.8	169.9	462.4	210.3	897.4
PANTANO DE IZNAJAR	58.8	165.0	424.7	196.2	844.7
PANTANO PUENTE NUEVO	51.8	164.4	428.3	188.2	832.7
PEÑEROCHE	45.6	160.2	443.2	190.2	839.2
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	47.2	188.5	515.4	208.7	959.8
POSADAS	46.4	188.3	490.6	209.1	934.4
POZOBLANCO	41.3	161.6	458.3	194.9	856.1
VILLAFALTO	46.2	162.4	433.1	185.7	827.4
ADAMUZ	51.7	192.8	484.6	199.7	928.8
AGUILAR DE LA FRONTERA	48.1	183.3	474.4	196.5	902.3
ALBENDIN 'C.H.G.'	49.9	187.6	481.0	197.5	916.0
ALCARACEJOS	42.8	168.2	453.3	192.1	858.4
ALCOLEA	54.8	202.6	500.1	202.8	960.2
ALMODOVAR DEL RIO	54.3	202.1	499.1	202.3	957.7
ARORA	42.2	166.9	454.5	192.2	855.9
BAENA 'C.H.G.'	46.4	177.7	471.1	194.6	889.9
BELMEZ	45.4	159.5	469.3	194.8	868.9
BELMEZ 'JAVALINA'	45.9	176.4	470.3	194.7	887.2
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	46.6	177.0	470.1	194.5	888.2
BUJALANCE	45.4	159.5	469.3	194.8	868.9
CABRA 'SALINERO'	47.6	179.9	471.6	195.7	894.7
CARCABUEY	41.6	166.0	453.6	192.3	853.5
CASTIL DEL CAMPO	41.4	164.9	450.7	191.1	848.1
CASTRO DEL RIO	51.6	193.2	484.6	199.6	928.9
DONA MENCIA	43.1	170.1	456.0	193.1	862.3
DORA RAMA	43.1	170.1	456.0	193.1	862.3
EL ESPARRAGAL	42.6	169.7	455.2	191.8	859.4
ENCINAS REALES	46.9	178.5	470.8	195.6	891.9
ESPEJO	47.2	180.8	472.7	195.4	896.1
FERNAN NUÑEZ	50.3	188.4	481.9	198.7	919.2
FUENTE-DEJUNA	42.2	166.9	454.5	192.2	855.9
HINOJOSA DEL DUQUE	43.9	172.8	465.6	193.5	875.7
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	50.3	188.4	481.9	198.7	919.2
LA CARLOTA	52.3	194.4	485.5	200.8	933.0
LUQUE	41.2	165.5	452.6	191.1	850.4
MONTILLA	47.9	182.5	473.6	193.9	897.9
MONTORO 'VEGA DE ARMIJO'	53.0	197.8	492.3	200.6	943.7
MORENTE	52.2	194.2	485.6	199.6	931.5
NUEVA CARTEYA	45.9	176.4	470.3	194.7	887.2

**CUADRO Nº 17.—EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL MEDIA ESTACIONAL  
(cont.)**

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTORO	ANUAL
OBEJO	40.6	162.9	451.2	190.5	844.6
PALMA DEL RIO	56.4	207.0	503.2	204.0	970.6
PRIEGO DE CORDOBA	41.8	165.5	451.5	191.1	849.9
PUENTE GENIL *AFOROS*	53.7	196.7	491.2	201.2	942.8
RUTE	41.0	165.5	453.6	192.4	853.1
SAN CALIXTO	45.9	176.4	470.3	194.7	887.2
SANTAELLA	51.4	192.9	484.6	199.7	928.7
TORRECAMPO	43.4	170.9	462.1	193.0	869.4
TURRES CABRERA	52.6	195.9	486.5	200.8	935.9
VALENZUELA	49.1	185.5	480.2	197.7	912.4
VENTA AZUÉL	41.2	165.4	452.6	191.4	850.6
VENTA DE CARDEÑA	39.2	160.6	442.5	189.4	831.7
V. DE CARDEÑA *V. DEL CHARCO*	39.7	161.7	444.9	190.6	837.0
VILLA DEL RIO	52.6	196.5	492.2	204.1	945.4
VILLAFRANCA DE CORDOBA	53.7	199.0	501.4	201.5	955.6
VILLAHARTA	43.3	170.7	455.9	193.3	863.2
VILLANUEVA DE CORDOBA	40.1	162.6	450.4	190.3	843.4
VILLANUEVA DEL REY	42.6	165.7	455.2	191.8	854.4
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	40.7	163.0	451.1	191.0	845.8
ZAMBRA	42.2	167.3	454.4	192.2	856.1

## CUADRO Nº 18.—DURACION MEDIA DEL PERIODO SECO (R=100)

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALDEA DE CUENCA						0.5	*	*	0.5				3.0MES
BELALCAZAR						*	*	*	*	0.5			4.5MES
CORUDBA "AEROPUERTO"						*	*	*	*				4.0MES
HORNACHUELOS						*	*	*	*				4.0MES
LUCENA						0.5	*	*	*				3.5MES
MONTORO						*	*	*	*	0.5			4.5MES
PANTANO DE GUADALMELLATO						0.5	*	*	*				3.5MES
PANTANO DE IZNAJAR						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
PANTANO PUENTE NUEVO						0.5	*	*	*				3.5MES
PEDROCHE						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
PERARROYA-PUEBLUNUEVO						*	*	*	*	0.5			4.5MES
POSADAS						0.5	*	*	*				3.5MES
POZOBLANCO						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
VILLARALTO						0.5	*	*	*				3.5MES
ADAMUZ						*	*	*	*	0.5			4.5MES
AGUILAR DE LA FRONTERA						*	*	*	*	0.5			4.5MES
ALBENDIN "C.H.G."						*	*	*	*	0.5			4.5MES
ALCARACEJOS						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
ALCOLEA						*	*	*	*				4.0MES
ALMODOVAR DEL RIO						*	*	*	*				4.0MES
ARORA						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
BAENA "C.H.G."						*	*	*	*	0.5			4.5MES
BELMEZ						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
BELMEZ "JAVALINA"						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
BENAMEJI "ALCACHOFARES B."						*	*	*	*	0.5			4.5MES
BUJALANCE						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
CABRA "SALINERO"						0.5	*	*	*				3.5MES
CARCABUEY						0.5	*	*	*				3.5MES
CASTIL DEL CAMPO						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
CASTRO DEL RIO						*	*	*	*	0.5			4.5MES
DORA MENCIA						0.5	*	*	*				3.5MES
DORA RAMA						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
EL ESPARRAGAL						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
ENCINAS REALES						*	*	*	*	0.5			4.5MES
ESPEJO						*	*	*	*	0.5			4.5MES
FERNAN NUREZ						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
FUENTE-OBEJUNA						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
HINOJOSA DEL DUQUE						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
HORNACHUELOS "LAS MESAS"						0.5	*	*	*				3.5MES
LA CARLOTA						*	*	*	*	0.5			4.5MES
LUQUE						0.5	*	*	*				3.5MES
MONTILLA						0.5	*	*	*				3.5MES
MONTORO "VEGA DE ARMIJO"						*	*	*	*	0.5			4.5MES
MORENTE						*	*	*	*	0.5			4.5MES
NUEVA CARTEYA						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES

## CUADRO Nº 18.—DURACION MEDIA DEL PERIODO SECO (R=100) (cont.)

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	UCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
OBEJO						0.5	*	*	*				3.5MES
PALMA DEL RIO						*	*	*	*				4.0MES
PRIEGO DE CORDOBA						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
PUENTE GENIL *AFOROS*						*	*	*	*	0.5			4.5MES
RUTE						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
SAN CALIXTO						0.5	*	*	*				3.5MES
SANTAELLA						*	*	*	*	0.5			4.5MES
TORRECAMPO						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
TORRES CABRERA						*	*	*	*	0.5			4.5MES
VALENZUELA						*	*	*	*	0.5			4.5MES
VENTA AZUEL						0.5	*	*	*				3.5MES
VENTA DE CARJERA						0.5	*	*	*				3.5MES
V. DE CARDENA *V. DEL CHARCO						0.5	*	*	*				3.5MES
VILLA DEL RIO						*	*	*	*	0.5			4.5MES
VILLAFRANCA DE CORDOBA						*	*	*	*				4.0MES
VILLAHARTA						0.5	*	*	*	0.5			4.0MES
VILLANUEVA DE CORDOBA						0.5	*	*	*				3.5MES
VILLANUEVA DEL REY						0.5	*	*	*				3.5MES
VILLAVICIOSA DE CORDOBA						0.5	*	*	*				3.5MES
ZAMBKA						0.5	*	*	*				3.5MES

## CUADRO Nº 19.—VARIABILIDAD DEL DEFICIT (D) MENSUAL

ESTACION		E NE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ALDEA DE CUENCA	D MENOR DE 50					3	17			13	17		
	D ENTRE 50 Y 100						34	3		34	13		
	D MAYOR DE 100						6	96	100	37			
BELALLAZAR	D MENOR DE 50					3	11			3	19		
	D ENTRE 50 Y 100					11	34			61	11		
	D MAYOR DE 100						50	100	100	30			
CORCOBA "AEROPUERTO"	D MENOR DE 50					8	14			2	25	2	
	D ENTRE 50 Y 100					4	37			41	20		
	D MAYOR DE 100						43	100	100	50			
HUANACHUELOS	D MENOR DE 50					6	17				20	3	
	D ENTRE 50 Y 100					13	27		3	17	20		
	D MAYOR DE 100						51	100	96	75			
LUCENA	D MENOR DE 50					2	25			13	19		
	D ENTRE 50 Y 100						33	2	2	55	22		
	D MAYOR DE 100						13	97	97	16			
MUNTURO	D MENOR DE 50					8	14			20	28	5	
	D ENTRE 50 Y 100					2	28			40	22		
	D MAYOR DE 100						48	100	100	40			
PANTANO DE GUADALMELLATO	D MENOR DE 50					3	6			3	19	6	
	D ENTRE 50 Y 100						45			29	22		
	D MAYOR DE 100						16	100	100	61			
PANTANO DE IZNAJAR	D MENOR DE 50			2	10	17	12			7	25	10	
	D ENTRE 50 Y 100					17	33			53	35		
	D MAYOR DE 100						41	100	100	33			
PANTANO PUENTE NUEVO	D MENOR DE 50						27			5	16		
	D ENTRE 50 Y 100					5	33	5	5	83	22		
	D MAYOR DE 100						5	94	94				
PEDROCHE	D MENOR DE 50					4	20			8	8		
	D ENTRE 50 Y 100						45	4	4	50	16		
	D MAYOR DE 100						4	95	95	41			
PENARROYA-PUEBLO NUEVO	D MENOR DE 50					7	10			10	23		
	D ENTRE 50 Y 100					2	28			31	21		
	D MAYOR DE 100						55	100	100	55			
POSADAS	D MENOR DE 50					3	12			9	18	3	
	D ENTRE 50 Y 100						6	33		33	15		
	D MAYOR DE 100						39	100	100	54			
PUZOBLANCO	D MENOR DE 50				2	2	21			8	18		
	D ENTRE 50 Y 100					5	48	2	2	43	21		
	D MAYOR DE 100						2	97	97	43			
VILLARALTO	D MENOR DE 50					4	20			16	8		
	D ENTRE 50 Y 100						45	4	8	37	16		
	D MAYOR DE 100						8	95	91	45			
ADAMUZ	D MENOR DE 50					11	11			8	17	2	
	D ENTRE 50 Y 100					5	32			50	17		
	D MAYOR DE 100						52	100	100	41			

**CUADRO Nº 19.—VARIABILIDAD DEL DEFICIT (D) MENSUAL (cont.)**

ESTACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AGUILAR DE LA FRONTERA	D MENOR DE 50					13	11			11	22	5	
	D ENTRE 50 Y 100						41		5	41	25		
	D MAYOR DE 100						41	100	94	41			
ALBENDIN 'C.H.G.'	D MENOR DE 50					11	5			13	22	5	
	D ENTRE 50 Y 100					13	33			30	25		
	D MAYOR DE 100						52	100	100	50			
ALLARACEJUS	D MENOR DE 50				2	5	5			5	14	2	
	D ENTRE 50 Y 100					5	64		2	47	20		
	D MAYOR DE 100						8	100	97	44			
ALCOLEA	D MENOR DE 50					30	3			7	26	3	
	D ENTRE 50 Y 100					3	19			23	15		
	D MAYOR DE 100						69	100	100	57			
ALMODOVAR DEL RIO	D MENOR DE 50					18	6			9	24	6	
	D ENTRE 50 Y 100					21	12			42	18		
	D MAYOR DE 100						81	100	100	45			
ANGRA	D MENOR DE 50					3	10			10	10		
	D ENTRE 50 Y 100					3	51	3		48	20		
	D MAYOR DE 100						10	96	100	37			
BAENA 'C.H.G.'	D MENOR DE 50					9	12			6	30	3	
	D ENTRE 50 Y 100					6	30			48	18		
	D MAYOR DE 100						48	100	100	39			
BELMEZ	D MENOR DE 50				3		22			3	22	3	
	D ENTRE 50 Y 100					3	58			61	19		
	D MAYOR DE 100						6	100	100	29			
BELMEZ 'JAVALINA'	D MENOR DE 50					15	10			5	25	5	
	D ENTRE 50 Y 100						60			45	20		
	D MAYOR DE 100						25	100	100	35			
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	D MENOR DE 50					12	12			9	15	3	
	D ENTRE 50 Y 100						42	3		39	21		
	D MAYOR DE 100						36	96	100	36			
BUJALANCE	D MENOR DE 50					2	14			11	32	5	
	D ENTRE 50 Y 100						50			38	20		
	D MAYOR DE 100						23	100	100	38			
CABRA 'SALINERO'	D MENOR DE 50						22			16	16		
	D ENTRE 50 Y 100					3	45			41	16		
	D MAYOR DE 100						12	100	100	29			
CARCABJEY	D MENOR DE 50					2	8			11	19		
	D ENTRE 50 Y 100						41			52	19		
	D MAYOR DE 100						16	100	100	27			
CASTIL DEL CAMPO	D MENOR DE 50					2	16			8	25	2	
	D ENTRE 50 Y 100					2	38			47	19		
	D MAYOR DE 100						25	100	100	30			
CASTRO DEL RIO	D MENOR DE 50					17	5			14	28	11	
	D ENTRE 50 Y 100					5	22			45	17		
	D MAYOR DE 100						68	100	100	40			

## CUADRO Nº 19.—VARIABILIDAD DEL DEFICIT (D) MENSUAL (cont.)

ESTACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DOSA MENCIA	D MENOR DE 50						5			13	16		
	D ENTRE 50 Y 100						41			36	16		
	D MAYOR DE 100						13	100	100	38			
DOSA RAMA	D MENOR DE 50					2	14			8	35	8	
	D ENTRE 50 Y 100						44		2	61	14		
	D MAYOR DE 100						14	100	97	20			
EL ESPARFAGAL	D MENOR DE 50					8	11			5	14		
	D ENTRE 50 Y 100					2	42		2	48	20		
	D MAYOR DE 100						22	100	97	34			
ENCINAS REALES	D MENOR DE 50					18	11				29	3	
	D ENTRE 50 Y 100					3	33			33	25		
	D MAYOR DE 100						44	100	100	55			
ESPEJO	D MENOR DE 50					8	5			17	22	2	
	D ENTRE 50 Y 100					2	34			42	34		
	D MAYOR DE 100						45	100	100	34			
FERNAN NUÑEZ	D MENOR DE 50					6	10			6	13	6	
	D ENTRE 50 Y 100					6	31			34	31		
	D MAYOR DE 100						44	100	100	48			
FUENTE-OBEJUNA	D MENOR DE 50					5	11			11	29		
	D ENTRE 50 Y 100						47			50	17		
	D MAYOR DE 100						11	100	100	29			
HINOJOSA DEL DUQUE	D MENOR DE 50					4	18				18		
	D ENTRE 50 Y 100					4	59		4	86	13		
	D MAYOR DE 100						9	100	95	9			
HORNACHUELOS *LAS MESAS*	D MENOR DE 50						19			6	19		
	D ENTRE 50 Y 100					6	35			29	19		
	D MAYOR DE 100						38	100	100	54			
LA CARLOTA	D MENOR DE 50					14	8			8	25	2	
	D ENTRE 50 Y 100					5	34			42	25		
	D MAYOR DE 100						51	100	100	42			
LUQUE	D MENOR DE 50					6	9			12	9		
	D ENTRE 50 Y 100					3	21			43	18		
	D MAYOR DE 100						37	100	100	37			
MONTILLA	D MENOR DE 50					8	11			11	17		
	D ENTRE 50 Y 100						51		2	51	22		
	D MAYOR DE 100						28	100	97	28			
MONTORO *VEGA DE ARMIJO*	D MENOR DE 50				2	13	5			13	22	2	
	D ENTRE 50 Y 100					13	30			36	22		
	D MAYOR DE 100						61	100	100	44			
MURENTE	D MENOR DE 50					11	5			14	20	5	
	D ENTRE 50 Y 100					5	34			37	22		
	D MAYOR DE 100						48	100	100	40			
NUEVA CARTEYA	D MENOR DE 50					2	14			17	20		
	D ENTRE 50 Y 100						41			41	23		
	D MAYOR DE 100						29	100	100	35			

## CUADRO Nº 19.—VARIABILIDAD DEL DEFICIT (D) MENSUAL (cont.)

ESTACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBEJÚ	D MENOR DE 50					9	12			6	21		
	D ENTRE 50 Y 100						40			46	18		
	D MAYOR DE 100						12	100	100	43			
PALMA DEL RÍO	D MENOR DE 50					28				10	17	3	
	D ENTRE 50 Y 100					3	21			28	25		
	D MAYOR DE 100					3	75	100	100	57			
PRIEGO DE CORDOBA	D MENOR DE 50					3	10			10	24		
	D ENTRE 50 Y 100						55			51	10		
	D MAYOR DE 100						13	100	100	24			
PUENTE VIEJO 'AFOROS'	D MENOR DE 50					23	10			6	36	6	
	D ENTRE 50 Y 100					13	30		3	33	13		
	D MAYOR DE 100						60	100	96	50			
RUTE	D MENOR DE 50					2	2			11	17		
	D ENTRE 50 Y 100						51			40	20		
	D MAYOR DE 100						22	100	100	37			
SAN CALIXTO	D MENOR DE 50					6	12			6	15		
	D ENTRE 50 Y 100					3	39			54	27		
	D MAYOR DE 100						27	100	100	30			
SANTAELLA	D MENOR DE 50					14	2			5	17	5	
	D ENTRE 50 Y 100					8	35		2	47	23		
	D MAYOR DE 100						58	100	97	41			
TORRECAMPU	D MENOR DE 50						11			3	7		
	D ENTRE 50 Y 100						44			55	18		
	D MAYOR DE 100						11	100	100	37			
TORRES CABRERA	D MENOR DE 50					23	6			3	13	3	
	D ENTRE 50 Y 100					3	36			26	30		
	D MAYOR DE 100						53	100	100	60			
VALENZUELA	D MENOR DE 50					5	14			11	20	2	
	D ENTRE 50 Y 100					8	29			32	23		
	D MAYOR DE 100						52	100	100	44			
VENTA AZUEL	D MENOR DE 50					3	24			6	13	6	
	D ENTRE 50 Y 100						51		3	55	24		
	D MAYOR DE 100							100	96	31			
VENTA DE CARDENA	D MENOR DE 50						6			0	19		
	D ENTRE 50 Y 100						38			54	16		
	D MAYOR DE 100							100	100	22			
V. DE CARDENA 'V. DEL CHARCO'	D MENOR DE 50						11			8	14		
	D ENTRE 50 Y 100						35			64	14		
	D MAYOR DE 100							100	100	23			
VILLA DEL RÍO	D MENOR DE 50					28	6			18	31	6	
	D ENTRE 50 Y 100					3	34			34	18		
	D MAYOR DE 100						53	100	100	43			
VILLAFRANCA DE CORDOBA	D MENOR DE 50					11	8			2	28	5	
	D ENTRE 50 Y 100					2	25			40	14		
	D MAYOR DE 100						57	100	100	42			

## CUADRO Nº 19.—VARIABILIDAD DEL DEFICIT (D) MENSUAL (cont.)

ESTACION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VILLAHSTA	0 MENOR DE 50				3		9			3	25		
	0 ENTRE 50 Y 100					6	31			37	18		
	0 MAYOR DE 100						28	100	100	50			
VILLAJEVA DE CORDOBA	0 MENOR DE 50						14			14	8		
	0 ENTRE 50 Y 100					2	37			45	22		
	0 MAYOR DE 100						5	100	100	37			
VILLAJEVA DEL REY	0 MENOR DE 50					2	13			5	16	5	
	0 ENTRE 50 Y 100					2	47			52	17		
	0 MAYOR DE 100						11	100	100	33			
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	0 MENOR DE 50					6	21			6	12		
	0 ENTRE 50 Y 100					3	36			42	15		
	0 MAYOR DE 100						9	100	100	42			
ZAMBRA	0 MENOR DE 50					2	11			11	20		
	0 ENTRE 50 Y 100					2	45			45	14		
	0 MAYOR DE 100						14	100	100	31			

## CUADRO Nº 20.—CLASIFICACION AGROCLIMATICA DE J. PAPADAKIS

ESTACION	TIPO DE INVIERNO	TIPO DE VERANO	REGIMEN TERMICO	REGIMEN DE HUMEDAD	LLUVIA LAVADO	IND. ANUAL DE HUMEDAD	TIPO CLIMATICO
Aldea de Cuenca	Ci/Av	G	SU	Me	286,4	0,65	Mediterráneo subtropical
Belalcázar	Av	G	SU	Me	184,8	0,46	Mediterráneo subtropical
Córdoba «Aeropuerto»	Ci	G	SU	Me	340,8	0,68	Mediterráneo subtropical
Hornachuelos	Ci	G	SU	Me	373,5	0,66	Mediterráneo subtropical
Lucena	Av	G	SU	Me	341,2	0,72	Mediterráneo subtropical
Montoro	Ci/Av	G	SU	Me	225,8	0,54	Mediterráneo subtropical
Pantano Guadalquivir	Ci	G	SU	Me	375,1	0,74	Mediterráneo subtropical
Pantano Iznajar	Ci/Av	G	SU	Me	131,5	0,42	Mediterráneo subtropical
Pantano Puente Nuevo	Av	G	SU	ME	523,6	0,92	Mediterráneo subtropical
Pedroche	Ci/Av	O	CO/TE	Me	195,7	0,51	Mediterráneo cont. templ.
Peñarroya-Pueblonuevo	Ci	G	SU	Me	220,5	0,50	Mediterráneo subtropical
Posadas	Ci/Av	G	SU	Me	294,1	0,63	Mediterráneo subtropical
Pozoblanco	Av	G	SU	Me	184,7	0,51	Mediterráneo subtropical
Villalalto	Av	G	SU	Me	204,5	0,54	Mediterráneo subtropical

## CUADRO Nº 21.—INDICE DE TURC MENSUAL PARA EL SECANO

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGUSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	ARG
ALDEA DE CUENCA	0.6	1.5	2.4	4.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.4	15.6
BELALCAZAR	0.0	0.1	3.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	9.4
CORDOBA *AEROPUERTO*	1.2	2.6	3.8	5.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	19.9
HORNACHUELOS	1.0	2.0	3.9	5.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.0	19.8
LUCENA	0.8	1.8	3.5	4.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.7	18.1
MONTORO	0.9	2.1	3.7	5.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	16.7
PANTANO DE GUADALMELLATO	1.1	2.0	3.4	4.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.0	19.7
PANTANO DE IZNAJAK	1.3	2.5	3.5	2.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	12.4
PANTANO PUENTE NUEVO	0.5	1.1	2.7	4.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.2	16.9
PEDROCHE	0.7	1.6	3.1	4.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	12.9
PENARROYA-PUEBLONUEVO	1.4	2.5	3.0	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	16.6
POSADAS	0.8	2.1	3.7	5.2	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	18.9
POZOBLANCO	0.4	1.4	3.2	4.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	13.0
VILLARALTO	0.4	0.8	2.3	4.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	11.6
ADAMUZ	1.0	1.8	3.7	5.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.7	17.4
AGUILAR DE LA FRONTERA	0.6	1.7	3.6	4.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	16.1
ALBENDIN *C.H.G.*	0.7	1.7	3.6	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	11.6
ALCACEJOS	0.3	1.1	3.2	4.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	11.7
ALCOLEA	1.3	2.6	3.9	5.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.0	18.7
ALMODOVAR DEL RIO	1.0	2.4	3.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.0	15.2
ARORA	0.3	1.1	3.2	4.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	12.9
BAENA *C.H.G.*	0.6	1.6	3.4	4.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	13.3
BELMEZ	1.0	1.9	3.4	4.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	16.2
BELMEZ *JAVALINA*	1.1	2.0	3.4	4.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	17.2
BENAMEJI *ALCACHOFARES B.*	1.1	2.1	3.5	4.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	16.0
BUJALANCE	0.9	1.6	3.4	4.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	16.5
CABRA *SALINERO*	0.7	1.6	3.5	4.9	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	0.7	20.2
CARCABUEY	0.6	1.5	3.2	4.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	17.8
CASTIL DEL CAMPO	0.6	1.5	3.2	4.6	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	15.9
CASTRO DEL RIO	1.0	2.2	3.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	14.1
DONA MENCIA	0.6	1.5	3.3	4.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	18.8
DONA RAMA	1.0	1.9	3.3	4.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	18.0
EL ESPARRAGAL	0.6	1.5	3.3	4.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.5	16.3
ENCINAS REALES	1.1	2.1	3.5	4.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	15.0
ESPEJO	0.9	2.0	3.5	4.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	15.9
FERNAN NUÑEZ	1.0	2.1	3.7	5.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	17.8
FUENTE-OBEJUNA	1.0	1.8	3.2	4.6	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	17.1
HINOJOSA DEL DUQUE	0.0	0.2	3.1	4.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	12.3
HORNACHUELOS *LAS MESAS*	1.2	2.1	3.7	5.1	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	19.9
LA CARLOTA	1.1	2.5	3.8	5.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.0	17.4
LUQUE	0.6	1.4	3.2	4.6	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	16.3
MONTILLA	0.6	1.6	3.5	4.9	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6	17.3
MONTORO *VEGA DE ARMIJO*	1.0	1.9	3.8	5.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	15.7
MORENTE	1.0	1.8	3.7	5.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.7	17.1
NUEVA CARTEYA	0.6	1.0	3.4	4.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	17.0

## CUADRO Nº 21.—INDICE DE TURC MENSUAL PARA EL SECANO (cont.)

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
OBEDO	0.7	1.2	3.1	4.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	16.5
PALMA DEL RIO	1.6	2.7	3.9	5.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.1	17.3
PRIEGO DE CORDOBA	0.8	1.7	3.2	4.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	16.5
PUENTE GENIL 'AFUROS'	0.8	1.6	3.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	12.9
RUFE	1.0	1.9	3.2	4.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	16.4
SAN CALIXTO	1.0	2.3	3.4	4.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	19.1
SANTAELLA	1.0	2.2	3.7	5.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.8	14.3
TORRECAMPO	0.7	1.5	3.3	4.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	16.1
TORRES CABRERA	1.3	2.5	3.0	5.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	15.0
VALENZUELA	1.4	2.4	3.5	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	15.6
VENTA AZUEL	0.7	1.4	3.2	4.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	17.3
VENTA DE CADERA	0.6	1.3	3.0	4.4	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	0.4	18.2
V. DE CADERA 'V. DEL CHARCO	0.6	1.3	3.1	4.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	18.2
VILLA DEL RIO	1.0	1.9	3.8	5.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	15.3
VILLAFRANCA DE CORDOBA	1.0	1.9	3.8	5.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8	18.6
VILLAHARTA	0.8	1.2	3.3	4.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	16.7
VILLANUEVA DE CORDOBA	0.7	1.4	3.1	4.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	17.2
VILLANUEVA DEL REY	1.0	1.9	3.3	4.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	18.4
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	0.7	1.2	3.1	4.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	17.8
ZAMBRA	0.7	1.5	3.2	4.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	17.0

## CUADRO Nº 22.—INDICE DE TURC ESTACIONAL PARA EL SECANO

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTONO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	2.4	11.3	0.0	2.3	15.6
BELALCAZAR	0.3	8.0	0.0	1.0	9.4
CERROBA *MERCADO*	4.8	13.0	0.0	2.2	19.9
HORNACHUELOS	4.0	12.9	0.0	2.3	19.8
LUCEÑA	3.3	12.9	0.0	1.9	18.1
MONTEORO	3.7	11.4	0.0	1.6	16.7
PANTANO DE GUADALMELLATO	4.1	13.7	0.0	1.9	19.7
PANTANO DE TANAJAR	4.6	0.6	0.0	1.1	12.4
PANTANO PUENTE NUEVO	1.7	13.5	0.0	1.6	16.9
PEDRACHE	2.9	8.5	0.0	1.4	12.9
PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO	4.9	10.4	0.0	1.2	16.6
PISADAS	3.8	13.0	0.0	2.0	18.9
POZOBLANCO	2.2	9.6	0.0	1.2	13.0
VILLAPALTO	1.6	8.6	0.0	1.3	11.6
ADAMUZ	3.0	12.1	0.0	1.7	17.4
AGUILAR DE LA FRONTERA	2.9	11.8	0.0	1.4	16.1
ALBENDIN *C.H.G.*	3.0	7.3	0.0	1.3	11.6
ALCARACEJOS	1.7	8.6	0.0	1.4	11.7
ALCUBERA	5.0	11.9	0.0	1.8	18.7
ALMODOVAR DEL RIO	4.3	9.1	0.0	1.7	15.2
ANDORA	1.7	10.0	0.0	1.2	12.9
BAENA *C.H.G.*	2.8	9.3	0.0	1.2	13.3
BELMEZ	3.7	11.3	0.0	1.2	16.2
BELMEZ *JAVALINA*	3.8	12.0	0.0	1.4	17.2
BENAMEJI *ALLACHUFARÉS B.*	3.7	10.8	0.0	1.5	16.0
BUJALANCÉ	3.1	11.9	0.0	1.5	16.5
CABRA *SALINERO*	3.1	14.4	0.0	2.4	20.2
CARCABUEY	2.7	13.2	0.0	1.9	17.8
CASTIL DEL CAMPO	2.7	11.8	0.0	1.4	15.9
CASTRO DEL RIO	4.0	8.8	0.0	1.4	14.1
DORA MENCIA	2.6	14.4	0.0	1.8	18.8
DORA RAMA	3.6	13.0	0.0	1.4	18.0
EL ESPARRAGAL	2.6	12.3	0.0	1.4	16.3
ENCINAS REALES	3.7	9.9	0.0	1.3	15.0
ESPEJO	3.7	10.8	0.0	1.4	15.9
FERNAN NUÑEZ	3.9	12.5	0.0	1.5	17.8
FUENTE-QUEJUNA	3.5	12.3	0.0	1.3	17.1
HINOJOSA DEL DUQUE	0.4	10.6	0.0	1.3	12.3
HORNACHUELOS *LAS MESAS*	4.1	13.7	0.0	2.0	19.9
LA CARLOTA	4.6	11.1	0.0	1.7	17.4
LUQUE	2.5	12.3	0.0	1.6	16.3
MONTILLA	2.9	12.8	0.0	1.7	17.3
MONTEORO *VEGA DE ARMIJO*	3.7	10.4	0.0	1.6	15.7
MORENTE	3.6	11.8	0.0	1.7	17.1
NUEVA CARTEYA	2.8	12.8	0.0	1.4	17.0

## CUADRO Nº 22.—INDICE DE TURC ESTACIONAL PARA EL SECANO (cont.)

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTORG	ANUAL
OBEJO	2.0	12.9	0.0	1.5	16.5
PALMA DEL RIO	5.4	10.1	0.0	1.8	17.3
PRIEGO DE CORDOBA	3.0	12.0	0.0	1.6	16.5
PUNTE GENIL *AFOROS*	3.4	8.2	0.0	1.3	12.9
RUTE	3.5	11.5	0.0	1.6	16.4
SAN CALIXTO	4.0	13.3	0.0	1.8	19.1
SANTAELLA	4.0	9.0	0.0	1.3	14.3
TORRECAMPU	2.7	12.0	0.0	1.5	16.1
TORRES CABRERA	4.8	9.2	0.0	1.5	15.6
VALENZUELA	4.8	9.4	0.0	1.4	15.6
VENTA AZUEL	2.5	13.1	0.0	1.6	17.3
VENTA DE CARDENA	2.4	13.8	0.0	2.0	18.2
V. DE CARDENA *V. DEL CHARGO*	2.5	13.9	0.0	1.9	18.2
VILLA DEL RIC	3.7	10.2	0.0	1.5	15.3
VILLAFRANCA DE CORDOBA	3.7	13.0	0.0	1.9	18.6
VILLAHARTA	2.1	13.1	0.0	1.5	16.7
VILLANUEVA DE CORDOBA	2.5	12.8	0.0	1.9	17.2
VILLANUEVA DEL REY	3.5	13.3	0.0	1.6	18.4
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	2.0	14.0	0.0	1.9	17.8
ZAMBRA	2.7	12.3	0.0	1.9	17.0

## CUADRO Nº 23.—INDICE DE TURC MENSUAL PARA EL REGADIO

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	AÑO
ALUEA DE CUENCA	0.6	1.5	2.9	4.4	6.1	7.5	7.6	6.8	5.6	3.7	1.9	0.4	48.5
DEL ALCAZAR	0.0	0.1	3.1	4.9	6.6	7.8	7.6	6.9	5.5	3.7	1.7	0.2	48.3
CURDUBA 'AEROPUERTO'	1.2	2.0	3.8	5.1	6.6	7.7	7.7	6.9	5.7	3.9	2.2	1.0	54.3
HORNACHUELOS	1.0	2.6	3.9	5.2	6.9	7.8	7.7	6.9	5.8	4.0	2.4	1.0	55.3
LUCENA	0.6	1.3	3.5	4.8	6.4	7.5	7.7	6.8	5.5	3.9	2.2	0.7	51.6
MONTORO	0.9	2.1	3.7	5.0	6.6	7.7	7.7	6.6	5.6	3.9	2.2	0.7	52.9
PANTANO DE JUADALMELLATO	1.1	2.0	3.4	4.9	6.4	7.6	7.7	6.6	5.6	3.9	2.2	1.0	52.7
PANTANO DE IZNAJAR	1.3	2.5	3.5	4.7	6.2	7.4	7.6	6.5	5.5	3.9	2.3	0.9	52.6
PANTANO PUENTE NUEVO	0.5	1.1	2.7	4.0	5.2	7.4	7.6	6.5	5.5	3.7	1.8	0.2	48.0
PEDROCHE	0.7	1.6	3.1	4.5	6.3	7.4	7.6	6.8	5.6	3.6	1.9	0.6	49.8
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO	1.4	2.5	3.6	5.1	6.8	7.6	7.7	6.9	5.7	3.9	2.1	1.6	54.5
POSADAS	0.8	2.1	3.7	5.2	6.6	7.8	7.7	6.9	5.7	3.9	2.2	0.9	53.4
POZOBLANCO	0.4	1.4	3.2	4.6	6.2	7.5	7.6	6.8	5.6	3.7	1.9	0.3	49.3
VILLARALTO	0.4	0.8	2.3	4.5	6.2	7.4	7.6	6.6	5.5	3.6	1.6	0.4	47.2
ADAMUZ	1.0	1.8	3.7	5.1	6.7	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	0.7	53.1
AGUILAR DE LA FRONTERA	0.6	1.7	3.6	4.9	6.6	7.7	7.7	6.8	5.6	3.8	2.1	0.6	51.7
ALBENDIN 'C.H.G.'	0.7	1.7	3.6	5.0	6.7	7.7	7.7	6.9	5.6	3.8	2.1	0.6	52.1
ALCARAJOS	0.3	1.1	3.2	4.6	6.4	7.5	7.6	6.8	5.6	3.7	1.9	0.2	49.2
ALCOLEA	1.3	2.6	3.9	5.3	6.8	7.8	7.7	6.9	5.7	3.9	2.2	1.0	55.1
ALMODOVAR DEL RIO	1.0	2.4	3.9	5.3	6.8	7.8	7.7	6.9	5.7	3.9	2.2	1.6	54.4
ARORA	0.3	1.1	3.2	4.6	6.4	7.5	7.6	6.8	5.6	3.7	1.9	0.2	49.1
BAENA 'C.H.G.'	0.6	1.6	3.4	4.8	6.5	7.6	7.7	6.6	5.6	3.8	2.0	0.6	51.1
BELMEZ	1.0	1.9	3.4	4.7	6.1	7.6	7.7	6.8	5.6	3.7	2.0	0.7	51.3
BELMEZ 'JAVALINA'	1.1	2.0	3.4	4.8	6.5	7.6	7.7	6.8	5.6	3.8	2.0	0.7	52.1
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	1.1	2.1	3.5	4.9	6.5	7.6	7.7	6.9	5.5	3.9	2.3	0.5	52.4
BUJALANCE	0.9	1.6	3.4	4.7	6.1	7.6	7.7	6.6	5.6	3.7	2.0	0.6	50.7
CABRA 'SALINERO'	0.7	1.6	3.5	4.9	6.5	7.6	7.7	6.9	5.6	4.0	2.3	0.7	52.1
CARCABUEY	0.6	1.5	3.2	4.6	6.3	7.5	7.7	6.9	5.5	3.9	2.1	0.6	50.5
CASTIL DEL CAMPO	0.6	1.5	3.2	4.6	6.3	7.4	7.7	6.9	5.5	3.9	2.1	0.6	50.3
CASTRO DEL RIO	1.0	2.2	3.7	5.1	6.7	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	0.8	53.5
DORA MENCIA	0.6	1.5	3.3	4.7	6.4	7.6	7.7	6.8	5.6	3.7	1.9	0.5	50.3
DORA RAMA	1.0	1.9	3.3	4.7	6.4	7.6	7.7	6.8	5.6	3.7	1.9	0.7	51.3
EL ESPARRAGAL	0.6	1.5	3.3	4.7	6.4	7.5	7.7	6.8	5.6	3.7	1.9	0.5	50.2
ENCINAS REALES	1.1	2.1	3.5	4.9	6.5	7.6	7.7	6.9	5.6	4.0	2.3	0.5	52.6
ESPEJO	0.9	2.0	3.5	4.9	6.6	7.7	7.7	6.8	5.6	3.8	2.1	0.7	52.3
FERNAN NUÑEZ	1.0	2.1	3.7	5.1	6.7	7.7	8.1	6.9	5.6	3.8	2.1	0.8	53.4
FUENTE-OLBEJUNA	1.0	1.8	3.2	4.6	6.4	7.5	7.6	6.8	5.6	3.7	1.9	0.7	50.9
HINOJOSA DEL DUQUE	0.0	0.2	3.1	4.7	6.4	7.5	7.6	6.8	5.5	3.7	1.7	0.3	47.6
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	1.2	2.1	3.7	5.1	6.7	7.7	7.7	6.9	5.6	3.8	2.1	0.8	53.3
LA CARLOTA	1.1	2.5	3.8	5.2	6.7	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	1.0	54.2
LUQUE	0.6	1.4	3.2	4.6	6.4	7.5	7.6	6.8	5.5	3.7	1.9	0.5	49.7
MONTILLA	0.6	1.6	3.5	4.9	6.6	7.7	7.7	6.8	5.6	3.7	2.1	0.6	51.5
MONTORO 'VEGA DE ARMIJO'	1.0	1.9	3.8	5.2	6.8	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	0.8	53.5
MORENTE	1.0	1.8	3.7	5.2	6.7	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	0.7	53.2
NUEVA CARTEYA	0.6	1.6	3.4	4.8	6.5	7.6	7.7	6.8	5.6	3.8	2.0	0.6	51.0

## CUADRO Nº 23.—INDICE DE TURC MENSUAL PARA EL REGADIO (cont.)

ESTACION	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIE.	OCTUB.	NOVIE.	DICIE.	ANO
UBÉJÚ	0.7	1.2	3.1	4.5	6.3	7.5	7.6	6.3	5.5	3.7	1.9	0.1	49.0
PALMA DEL RIO	1.0	2.7	3.7	5.4	6.9	7.3	7.7	6.9	5.7	3.9	2.3	1.1	55.8
PRIEGO DE CORDOBA	0.8	1.7	3.2	4.5	6.3	7.5	7.7	6.9	5.5	3.9	2.1	0.5	50.7
PUENTE GENIL 'AFRÓS'	0.8	1.6	3.6	5.3	6.7	7.7	7.7	6.9	5.6	4.0	2.5	0.8	53.7
RUTE	1.0	1.9	3.2	4.6	6.3	7.5	7.7	6.9	5.5	3.9	2.1	0.4	51.1
SAN CALIXTO	1.0	2.3	3.4	4.3	6.5	7.6	7.7	6.3	5.6	3.8	2.0	0.7	52.3
SANTAELLA	1.0	2.2	3.7	5.1	6.7	7.6	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	0.3	53.5
TORRECAMPO	0.7	1.5	3.3	4.7	6.4	7.6	7.7	6.8	5.6	3.7	2.0	0.5	50.4
TURRES CABRERA	1.3	2.5	3.5	5.2	6.8	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.2	1.0	54.5
VALENZUELA	1.4	2.4	3.6	5.0	6.6	7.7	7.7	6.9	5.6	3.8	2.1	1.0	53.8
VENTA AZÚEL	0.7	1.4	3.2	4.6	6.4	7.5	7.6	6.3	5.5	3.7	1.4	0.5	49.8
VENTA DE CARDEÑA	0.6	1.3	3.1	4.4	6.3	7.4	7.6	6.8	5.5	3.7	1.8	0.4	47.1
V. DE CARDEÑA 'V. DEL CHARCO	0.6	1.3	3.1	4.5	6.3	7.5	7.6	6.8	5.5	3.7	1.9	0.5	49.3
VILLA DEL RIO	1.0	1.9	3.8	5.2	6.3	7.8	7.7	6.9	5.6	3.8	2.3	0.6	53.0
VILLAFRANCA DE CORDOBA	1.0	1.9	3.3	5.2	6.3	7.8	7.7	6.9	5.7	3.9	2.2	0.6	53.7
VILLAHARTA	0.3	1.2	3.3	4.7	6.4	7.6	7.7	6.8	5.6	3.7	2.0	0.1	45.8
VILLANUEVA DE CORDOBA	0.7	1.4	3.1	4.5	6.3	7.5	7.6	6.8	5.5	3.7	1.9	0.5	49.4
VILLANUEVA DEL REY	1.0	1.9	3.5	4.7	6.4	7.5	7.7	6.3	5.6	3.7	1.9	0.7	51.1
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	0.7	1.2	3.1	4.5	6.3	7.5	7.6	6.8	5.5	3.7	1.9	0.1	49.0
ZAMBRA	0.7	1.5	3.2	4.7	6.4	7.5	7.7	6.9	5.5	3.9	2.2	0.6	50.6

## CUADRO Nº 24.—INDICE DE TURC ESTACIONAL PARA EL REGADIO

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	OTRO	ANUAL
ALDEA DE CUENCA	2.4	13.0	21.9	11.2	48.5
BELALCAZAR	0.3	14.7	22.5	10.9	48.3
CORDOBA 'AEROPUERTO'	4.8	15.5	22.3	11.8	54.3
HORNACHUELOS	4.6	16.0	22.4	12.2	55.3
LUCEÑA	3.3	14.7	22.0	11.7	51.6
MONTORO	3.7	15.3	22.2	11.7	52.9
PANTANO DE GUADALMELLATO	4.1	14.7	22.1	11.8	52.7
PANTANO DE IZNAJAR	4.6	14.4	21.8	11.8	52.6
PANTANO PUENTE NUEVO	1.7	13.5	21.8	11.0	48.0
PEDROCHE	2.9	13.9	21.9	11.1	49.8
PERARRKOYA-PUEBLONUEVO	4.9	15.5	22.4	11.7	54.5
POSADAS	3.8	15.5	22.3	11.8	53.4
POZOBLANCO	2.2	14.0	22.0	11.2	49.3
VILLARALTO	1.6	13.1	21.8	10.7	47.2
ADAMUZ	3.6	15.6	22.3	11.6	53.1
AGUILAR DE LA FRONTERA	2.9	15.1	22.2	11.5	51.7
ALBENDIN 'C.H.G.'	3.0	15.3	22.2	11.5	52.1
ALCARACEJOS	1.7	14.3	22.0	11.2	49.2
ALCOLEA	5.0	16.0	22.4	11.8	55.1
ALMODDVAR DEL RIO	4.3	16.0	22.4	11.7	54.4
ARORA	1.7	14.2	22.0	11.2	49.1
BAENA 'C.H.G.'	2.8	14.8	22.1	11.4	51.1
BELMEZ	3.7	14.2	22.1	11.3	51.3
BELMEZ 'JAVALINA'	3.8	14.8	22.1	11.4	52.1
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	3.7	14.8	22.2	11.8	52.4
BUJALANCE	3.1	14.2	22.1	11.3	50.7
CABRA 'SALINERO'	3.1	15.0	22.2	11.8	52.1
CARCABUEY	2.7	14.2	22.0	11.6	50.5
CASTIL DEL CAMPO	2.7	14.1	22.0	11.5	50.3
CASTRO DEL RIO	4.0	15.6	22.3	11.6	53.5
DORA MENCIA	2.6	14.4	22.0	11.3	50.3
DORA RAMA	3.6	14.4	22.0	11.3	51.3
EL ESPARRAGAL	2.6	14.3	22.0	11.2	50.2
ENCINAS REALES	3.7	14.9	22.2	11.8	52.6
ESPEJO	3.7	15.0	22.2	11.4	52.3
FERNAN NUREZ	3.9	15.4	22.6	11.6	53.4
FUENTE-OBEJUNA	3.5	14.2	22.0	11.2	50.9
HINOJOSA DEL DUQUE	0.4	14.2	22.0	11.0	47.6
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	4.1	15.4	22.3	11.6	53.3
LA CARLOTA	4.6	15.7	22.3	11.7	54.2
LUQUE	2.5	14.1	22.0	11.2	49.7
MONTILLA	2.9	15.1	22.2	11.4	51.5
MONTORO 'VEGA DE ARMIJO'	3.7	15.8	22.4	11.7	53.5
MORENTE	3.6	15.6	22.3	11.6	53.2
NUEVA CARTEYA	2.8	14.8	22.1	11.4	51.0

## CUADRO Nº 24.—INDICE DE TURC ESTACIONAL PARA EL REGADIO (cont.)

ESTACION	INVIERNO	PRIMAVERA	VERANO	TOTAL	ANUAL
OBEJO	2.0	13.9	21.9	11.1	49.0
PALMA DEL RIO	5.4	16.2	22.4	11.6	55.8
PRIEGO DE CORDOBA	3.0	14.2	22.0	11.5	50.7
PUNTE GENIL 'AFUROS'	3.4	15.8	22.4	12.1	53.7
RUTE	3.3	14.2	22.0	11.0	51.1
SAN CALIXTO	4.0	14.8	22.1	11.4	52.3
SANTAELLA	4.0	15.6	22.3	11.6	53.5
TORRECAMPO	2.7	14.4	22.1	11.3	50.4
TORRES CABRERA	4.8	15.7	22.3	11.7	54.5
VALENZUELA	4.8	15.2	22.2	11.5	53.6
VENTA AZUEL	2.5	14.1	22.0	11.2	49.8
VENTA DE CARDENA	2.4	13.8	21.9	11.0	49.1
V. DE CARDENA 'V. DEL CHARCO'	2.5	13.9	21.9	11.1	49.3
VILLA DEL RIO	3.7	15.8	22.4	11.8	53.0
VILLAFRANCA DE CORDOBA	3.7	15.9	22.4	11.7	53.7
VILLAHARTA	2.1	14.4	22.0	11.3	49.8
VILLANUEVA DE CORDOBA	2.5	13.9	21.9	11.1	49.4
VILLANUEVA DEL REY	3.5	14.3	22.0	11.2	51.1
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	2.0	14.0	21.9	11.1	49.0
ZAMBRA	2.7	14.3	22.1	11.6	50.6

## CUADRO Nº 25.—FORMACIONES FISIOGNOMICAS

ESTACION	P(MM)	TM(OC)	ALTIM	IA	IH	FCRM.FISIOG.
ALDEA DE CUENCA	599.9	15.7	571	23.35	43	36 DURILIGNOSA
BELLALCAZAR	452.8	16.5	490	16.36	48	34 "
CORDOBA 'AEROPUERTO'	655.0	17.7	107	23.68	9	17 "
HORNACHUELOS	705.6	18.6	194	24.68	14	37 "
LUCENA	684.1	16.4	483	25.90	35	14 "
MONTORO	544.9	17.4	195	15.51	19	42 "
PANTANO DE GUADALMELLATO	706.7	17.1	217	26.11	17	5 "
PANTANO DE IZNAJAR	447.4	16.5	538	17.01	50	16 "
PANTANO PUENTE NUEVO	817.7	15.8	410	31.64	26	38 "
PEUROCHE	484.8	15.7	621	18.85	52	2 "
PERAKROYA-PUEBLONUEVO	517.9	17.8	588	18.64	46	39 "
POSADAS	652.4	17.5	88	23.03	7	56 "
POZOBLANCO	452.4	15.8	649	19.10	52	50 "
VILLARALTO	503.6	15.5	583	19.75	49	12 "
ADAMUZ	582.3	17.5	238	21.16	22	14 "
AGUILAR DE LA FRONTERA	547.3	16.9	380	20.31	34	47 "
ALBENDIN 'C.H.G.'	465.9	17.2	290	17.14	31	55 "
ALLARCEJOS	485.0	16.0	608	18.67	51	26 "
ALCOLEA	597.3	18.1	110	21.28	10	26 "
ALMODOVAR DEL RIO	497.9	18.0	123	17.79	13	53 "
ANORA	496.1	15.9	630	19.15	51	48 "
BAENA 'C.H.G.'	484.5	16.6	463	18.22	43	43 "
BELMEZ	514.2	16.1	599	19.67	49	23 "
BELMEZ 'JAVALINA'	544.8	16.5	480	22.42	38	55 "
BENAMEJI 'ALCACHOFARES B.'	549.6	16.6	460	20.67	39	57 "
BUJALANCE	579.4	16.1	348	22.16	31	0 "
CABRA 'SALINERO'	914.9	16.8	410	34.14	24	5 "
CARCABUEY	776.2	15.9	639	30.00	39	29 "
CASTIL DEL CAMPO	569.7	15.7	666	22.12	49	29 "
CASTRO DEL RIO	480.6	17.5	236	17.46	26	10 "
DONA MENCIA	775.3	16.1	585	29.72	37	3 "
DONA RAMA	604.9	16.1	584	23.19	44	1 "
EL ESPARRAGAL	685.2	16.0	600	26.35	41	13 "
ENCINAS REALES	519.8	16.7	439	19.47	40	12 "
ESPEJO	506.7	16.8	418	18.92	39	32 "
FERNAN NUREZ	633.4	17.3	300	23.22	25	21 "
FUENTE-UBEJUNA	561.1	15.9	629	21.66	48	17 "
HINOJOSA DEL DUQUE	517.3	16.2	550	19.71	46	46 "
HORNACHUELOS 'LAS MESAS'	746.6	17.3	300	27.37	21	54 "
LA CARLOTA	552.3	17.6	214	19.99	21	11 "
LUQUE	647.9	15.8	663	25.15	45	41 "
MONTILLA	630.8	16.8	402	23.52	32	31 "
MONTORO 'VEGA DE ARMIJU'	528.0	17.8	180	19.01	18	50 "
MORENTE	574.1	17.6	222	20.84	21	9 "
NUEVA CARTEYA	651.6	16.5	480	24.54	36	25 "
OBEJO	609.0	15.6	702	23.80	49	5 "

## CUADRO Nº 25.—FORMACIONES FISIOGNOMICAS (cont.)

ESTACION	P(MM)	T(M°C)	ALT(M)	IA	II	III	FORM.FISIOG.
PALMA DEL RIO	530.6	18.3	55	18.75	5	55	DURILIGNOSA
PRIEGO DE CUARAJA	710.7	15.6	650	27.55	42	28	"
PUENTE UNIL 'AFOROS'	501.2	17.8	231	18.03	24	46	"
RUTE	600.7	15.9	639	23.22	46	47	"
SAN CALIXTO	725.5	15.5	484	27.34	33	44	"
SANTAELLA	535.1	17.5	186	18.25	20	18	"
TORRECAMPO	597.7	16.1	572	21.33	45	44	"
TORRES CABRERA	506.0	17.7	200	18.28	21	35	"
VALENZUELA	503.6	17.1	344	18.58	34	21	"
VENTA AZUL	643.0	15.6	750	24.95	49	25	"
VENTA DE CARJENA	642.7	15.4	730	33.10	40	35	"
V. DE CARDENA 'V. DEL CHARCO'	637.1	15.5	662	32.80	38	21	"
VILLA DEL RIO	522.5	17.8	183	18.76	19	19	"
VILLAFRANCA DE CORDOBA	627.1	17.9	150	22.46	13	28	"
VILLAHARTA	561.1	16.1	579	21.45	45	55	"
VILLANUEVA DE CORDOBA	627.2	15.6	710	24.53	48	34	"
VILLANUEVA DEL REY	652.7	16.0	600	25.10	42	37	"
VILLAVICIOSA DE CORDOBA	822.1	15.6	693	32.07	40	9	"
ZAMBRA	698.5	15.9	620	26.93	41	37	"

**CARTOGRAFIA**



## **INDICE DE CARTOGRAFIA**

---

- Mapa nº 1.—Isoterma anual.
- Mapa nº 2.—Isoterma del mes más frío.
- Mapa nº 3.—Isoterma del mes más cálido.
- Mapa nº 4.—Fecha de primera helada.
- Mapa nº 4. bis.—Fecha de última helada.
- Mapa nº 5.—Duración media del período frío.
- Mapa nº 6.—Variabilidad, en años de cada 10, con que el mes de NOVIEMBRE forma parte del período frío.
- Mapa nº 7.—Variabilidad, en años de cada 10, con que el mes de ABRIL forma parte del período frío.
- Mapa nº 8.—Duración media del período cálido.
- Mapa nº 9.—Variabilidad, en años de cada 10, con que el mes de JUNIO, forma parte del período cálido.
- Mapa nº 10.—Variabilidad, en años de cada 10, con que el mes de SEPTIEMBRE, forma parte del período cálido.
- Mapa nº 11.—Isoyeta anual.
- Mapa nº 12.—Isoyeta de otoño.
- Mapa nº 13.—Isoyeta de invierno.
- Mapa nº 14.—Isoyeta de primavera.
- Mapa nº 15.—Isoyeta de verano.
- Mapa nº 16.—Evapotranspiración potencial media anual.
- Mapa nº 17.—Duración media del período seco.
- Mapa nº 18.—Variabilidad, en porcentaje, con que el déficit es  $>50$  mm. en el mes de JUNIO.
- Mapa nº 19.—Variabilidad, en porcentaje, con que el déficit es  $>50$  mm. en el mes de SEPTIEMBRE.
- Mapa nº 20.—Tipos de invierno, según J. Papadakis.
- Mapa nº 21.—Tipos de verano, según J. Papadakis.
- Mapa nº 22.—Regímenes de humedad, según J. Papadakis.
- Mapa nº 23.—Zonas agroclimáticas provinciales.
- Mapa nº 24.—Índice de L. Turc anual para el secano.
- Mapa nº 25.—Índice de L. Turc anual para el regadío.




**MAPA Nº 1**  
**ISOTERMA ANUAL**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 1  
ISOTERMA ANUAL**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**




**MAPA N° 2**  
**ISOTERMA DEL MES MAS FRIO**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 2  
ISOTERMA DEL MES MAS FRIO**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



**MAPA N° 3**  
**ISOTERMA DEL MES MAS CALIDO**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 3  
ISOTERMA DEL MES  
MAS CALIDO**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



**MAPA Nº 4**  
**FECHA DE PRIMERA HELADA**


**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**

**MAPA Nº 4**

**FECHA DE PRIMERA HELADA**




**MAPA Nº 4 BIS**  
**FECHA DE ULTIMA HELADA**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA




**MAPA Nº 5**  
**DURACION MEDIA DEL PERIODO FRIO**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



**MAPA Nº 6**  
**VARIABILIDAD, EN AÑOS DE CADA 10,**  
**CON QUE EL MES DE NOVIEMBRE**  
**FORMA PARTE DEL PERIODO FRIO**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



**MAPA Nº 7**  
**VARIABILIDAD, EN AÑOS DE CADA 10,**  
**CON QUE EL MES DE ABRIL**  
**FORMA PARTE DEL PERIODO FRIO**


**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**


**MAPA Nº 7**

**VARIABILIDAD, EN AÑOS  
DE CADA 10, CON QUE EL  
MES DE ABRIL FORMA PARTE  
DEL PERIODO FRIO**



**MAPA N° 8**  
**DURACION MEDIA DEL PERIODO**  
**CALIDO**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



**MAPA N° 9**  
**VARIABILIDAD, EN AÑOS DE CADA 10,**  
**CON QUE EL MES DE JUNIO**  
**FORMA PARTE DEL PERIODO CALIDO**


**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL


**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**

**MAPA Nº 9**

**VARIABILIDAD, EN AÑOS  
DE CADA 10, CON QUE EL  
MES DE JUNIO FORMA PARTE  
DEL PERIODO CALIDO**




**MAPA Nº 10**  
**VARIABILIDAD, EN AÑOS DE CADA 10,**  
**CON QUE EL MES DE SEPTIEMBRE**  
**FORMA PARTE DEL PERIODO CALIDO**




**MAPA N° 11**  
**ISOYETA ANUAL**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



**MAPA N° 12**  
**ISOYETA DE OTOÑO**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA




**MAPA Nº 13**  
**ISOYETA DE INVIERNO**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 13  
ISOYETA DE INVIERNO**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**




**MAPA N° 14**  
**ISOYETA DE PRIMAVERA**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL


**MAPA Nº 14  
ISOYETA DE PRIMAVERA**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



**MAPA. Nº 15**  
**ISOYETA DE VERANO**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA




**MAPA Nº 16**  
**EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL**  
**MEDIA ANUAL**



**MAPA Nº 17**  
**DURACION MEDIA DEL PERIODO SECO**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



**MAPA N° 18**  
**VARIABILIDAD, EN PORCENTAJE, CON**  
**QUE EL DEFICIT ES > 50 MM.**  
**EN EL MES DE JUNIO**



**MAPA Nº 19**  
**VARIABILIDAD, EN PORCENTAJE, CON**  
**QUE EL DEFICIT ES > 50 MM.**  
**EN EL MES DE SEPTIEMBRE**


**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**


**MAPA Nº 19**

**VARIABILIDAD,  
EN PORCENTAJE, CON QUE  
EL DEFICIT ES > 50 MM EN EL  
MES DE SEPTIEMBRE**



**MAPA Nº 20**  
**TIPOS DE INVIERNO, SEGUN**  
**J. PAPADAKIS**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



**Legenda:** av Avena fresco  
Av Avena cálido  
Ci Citrus


**MAPA Nº 21**  
**TIPOS DE VERANO, SEGUN**  
**J. PAPADAKIS**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 21  
TIPOS DE VERANO,  
SEGUN J. PAPADAKIS**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



- Legenda:**
- O Arroz
  - g Algodón menos cálido
  - G Algodón más cálido

**MAPA N° 22**  
**REGIMENES DE HUMEDAD, SEGUN**  
**J. PAPADAKIS**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



Legenda: Me Mediterráneo seco


**MAPA Nº 23**  
**ZONAS AGROCLIMATICAS**  
**PROVINCIALES**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 23  
ZONAS AGROCLIMATICAS  
PROVINCIALES**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



- Legenda:**
- av Avena fresco
  - Av Avena cálido
  - Ci Citrus
  - O Arroz
  - g Algodón menos cálido
  - G Algodón más cálido
  - Me Mediterráneo seco



M A L A G A

G R A N A D A

**MAPA N° 24**  
**INDICE DE L. TURC ANUAL**  
**PARA EL SECANO**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PESCA Y ALIMENTACION**

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION VEGETAL

**MAPA Nº 24  
INDICE DE L. TURC ANUAL  
PARA EL SECANO**

**CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**



**MAPA N° 25**  
**INDICE DE L. TURC ANUAL**  
**PARA EL REGADIO**

CARACTERIZACION AGROCLIMATICA  
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA




**GRAFICOS**



FORMACIONES FISIONOMICAS

---







GRAFICOS DE WALTER Y LIETH




## GRAFICOS DE WALTER Y LIETH


$T'$ =	Temperatura media anual de máximas absolutas anuales
$T_c$ =	Temperatura media de las máximas del mes más cálido
Osc =	Oscilación ( $T_c - t_f$ )
$t_f$ =	Temperatura media de las mínimas del mes más frío
$t'$ =	Temperatura media anual de mínimas absolutas anuales
$n_T$ =	Número de años de la serie de temperaturas
$n_p$ =	Número de años de la serie de pluviometría
$h$ =	Altitud en metros
$\bar{t}_m$ =	Temperatura media anual de las medias en °C.
$P$ =	Pluviometría media anual en milímetros
$H_s$ =	Período en que la helada es segura
$H_p$ =	Período en que la helada es probable
$d$ =	Período libre de heladas
Rayado =	Período húmedo
Punteado =	Período seco
En negro =	Parte del período húmedo en que las precipitaciones sobrepasan los 100 mm. (la escala de precipitaciones se reduce a 1/10)




## N ALDEA DE CUENCA




## N BELALCAZAR




## N CORDOBA "AEROPUERTO"




## N HORNACHUELOS




# N LUCENA




# N MONTORO




## N PANTANO DE GUADALMELLATO




## N PANTANO DE IZNAJAR




## N PEDROCHE




## N PANTANO PUENTE NUEVO




## N PEÑARROYA-PUEBLONUEVO




## N POSADAS



## N POZOBLANCO



## N VILLARALTO






TABLAS DE

- Distribución Normal
- Distribución Gamma



# DISTRIBUCION NORMAL



$$D(z) = \Phi(z) - \Phi(-z)$$

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z). \quad \Phi(0) = 0.5$$

Tablas más extensas: National Bureau of Standards (1953), Hald (1962). Índice para otra tablas: Greenwood and Hartley (1961)

z	Φ(-z)	Φ(z)	D(z)	z	Φ(-z)	Φ(z)	D(z)	z	Φ(-z)	Φ(z)	D(z)
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8098
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0.43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664

## DISTRIBUCION NORMAL (cont.)

z	$\Phi(-z)$	$\Phi(z)$	D(z)	z	$\Phi(-z)$	$\Phi(z)$	D(z)	z	$\Phi(-z)$	$\Phi(z)$	D(z)
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
1.51	0655	9345	8690	2.01	0222	9778	9556	2.51	0060	9940	9879
1.52	0643	9357	8715	2.02	0217	9783	9566	2.52	0059	9941	9883
1.53	0630	9370	8740	2.03	0212	9788	9576	2.53	0057	9943	9886
1.54	0618	9382	8764	2.04	0207	9793	9586	2.54	0055	9945	9889
1.55	0606	9394	8789	2.05	0202	9798	9596	2.55	0054	9946	9890
1.56	0594	9406	8812	2.06	0197	9803	9606	2.56	0052	9948	9895
1.57	0582	9418	8836	2.07	0192	9808	9615	2.57	0051	9949	9898
1.58	0571	9429	8859	2.08	0188	9812	9625	2.58	0049	9951	9901
1.59	0559	9441	8882	2.09	0183	9817	9634	2.59	0048	9952	9904
1.60	0548	9452	8904	2.10	0179	9821	9643	2.60	0047	9953	9907
1.61	0537	9463	8926	2.11	0174	9826	9651	2.61	0045	9955	9909
1.62	0526	9474	8948	2.12	0170	9830	9660	2.62	0044	9956	9912
1.63	0516	9484	8969	2.13	0166	9834	9668	2.63	0043	9957	9915
1.64	0505	9495	8990	2.14	0162	9838	9676	2.64	0041	9959	9917
1.65	0495	9505	9011	2.15	0158	9842	9684	2.65	0040	9960	9920
1.66	0485	9515	9031	2.16	0154	9846	9692	2.66	0039	9961	9922
1.67	0475	9525	9051	2.17	0150	9850	9700	2.67	0038	9962	9924
1.68	0465	9535	9070	2.18	0146	9854	9707	2.68	0037	9963	9926
1.69	0455	9545	9090	2.19	0143	9857	9715	2.69	0036	9964	9929
1.70	0446	9554	9109	2.20	0139	9861	9722	2.70	0035	9965	9931
1.71	0436	9564	9127	2.21	0136	9864	9729	2.71	0034	9966	9933
1.72	0427	9573	9146	2.22	0132	9868	9736	2.72	0033	9967	9935
1.73	0418	9582	9164	2.23	0129	9871	9743	2.73	0032	9968	9937
1.74	0409	9591	9181	2.24	0125	9875	9749	2.74	0031	9969	9939
1.75	0401	9599	9199	2.25	0122	9878	9756	2.75	0030	9970	9940
1.76	0392	9608	9216	2.26	0119	9881	9762	2.76	0029	9971	9942
1.77	0384	9616	9233	2.27	0116	9884	9768	2.77	0028	9972	9944
1.78	0375	9625	9249	2.28	0113	9887	9774	2.78	0027	9973	9946
1.79	0367	9633	9265	2.29	0110	9890	9780	2.79	0026	9974	9947
1.80	0359	9641	9281	2.30	0107	9893	9786	2.80	0026	9974	9949
1.81	0351	9649	9297	2.31	0104	9896	9791	2.81	0025	9975	9950
1.82	0344	9656	9312	2.32	0102	9898	9797	2.82	0024	9976	9952
1.83	0336	9664	9328	2.33	0099	9901	9802	2.83	0023	9977	9953
1.84	0329	9671	9342	2.34	0096	9904	9807	2.84	0023	9977	9955
1.85	0322	9678	9357	2.35	0094	9906	9812	2.85	0022	9978	9956
1.86	0314	9686	9371	2.36	0091	9909	9817	2.86	0021	9979	9958
1.87	0307	9693	9385	2.37	0089	9911	9822	2.87	0021	9979	9959
1.88	0301	9699	9399	2.38	0087	9913	9827	2.88	0020	9980	9960
1.89	0294	9706	9412	2.39	0084	9916	9832	2.89	0019	9981	9961
1.90	0287	9713	9426	2.40	0082	9918	9836	2.90	0019	9981	9963
1.91	0281	9719	9439	2.41	0080	9920	9840	2.91	0018	9982	9964
1.92	0274	9726	9451	2.42	0078	9922	9845	2.92	0018	9982	9965
1.93	0268	9732	9464	2.43	0075	9925	9849	2.93	0017	9983	9966
1.94	0262	9738	9476	2.44	0073	9927	9853	2.94	0016	9984	9967
1.95	0256	9744	9488	2.45	0071	9929	9857	2.95	0016	9984	9968
1.96	0250	9750	9500	2.46	0069	9931	9861	2.96	0015	9985	9969
1.97	0244	9756	9512	2.47	0068	9932	9865	2.97	0015	9985	9970
1.98	0239	9761	9523	2.48	0066	9934	9869	2.98	0014	9986	9971
1.99	0233	9767	9534	2.49	0064	9936	9872	2.99	0014	9986	9972
2.00	0228	9772	9545	2.50	0062	9938	9876	3.00	0013	9987	9973

## COMO USAR ESTA TABLA

En los cuadros núms. 2, 3, 5 y 6 figuran, para cada estación y cada mes, la temperatura media y su desviación típica.

Con estos valores y la tabla que se adjunta, se pueden obtener las frecuencias con que son esperables unas determinadas temperaturas, o bien partiendo de una frecuencia o probabilidad, averiguar qué temperaturas son esperables. También se pueden obtener intervalos de valores, para una probabilidad dada.

### Ejemplo 1<sup>a</sup>

Supongamos una estación con una media mensual de mínimas de 3°C y una desviación típica de 1,5°C en el mes de enero.

¿Con qué frecuencia la media de mínimas será de 1°C o menos?

a)  $1^\circ = \text{MEDIA} + Z \times \text{DESVIACION}$

$$1^\circ = 3^\circ + 1,5 Z; Z = \frac{-2}{1,5} = -1,34$$

b) Buscamos el valor de  $Z=1,34$  en la columna Z, y en  $\Phi (-Z)$  encontramos **0901**, es decir el 9,01% de los años se darán, para el mes de enero, una media de mínimas de 1°C o menos.

c) Evidentemente el 90,99% de los años, será de 1°C o más (columna  $\Phi (Z)$  de la tabla). La columna D (Z) nos da la frecuencia con que se da el intervalo de temperatura  $\text{MEDIA} \pm Z \times \text{DESVIACION}$ , es decir:

$$3 \pm 1,34 \cdot 1,5 = 5^\circ \text{ y } 1^\circ$$

El 81,98% de los años la temperatura media de las mínimas del mes de enero de esa estación estará comprendida entre 5° y 1°C.

### Ejemplo 2º

Supongamos una estación con una media de máximas absolutas de 36°C y una desviación de 3,5°C.

¿Qué riesgo corremos de que se den temperaturas superiores a 38°C, umbral superior para el cultivo concreto que queremos poner?

a)  $38 = \text{MEDIA} + Z \times \text{DESVIACION}$

$$38 = 36 + Z \cdot 3,5 ; Z = \frac{38-36}{3,5} = 0,57$$

- b) Buscamos el valor de  $Z = 0,57$  en la columna Z y en la columna  $\Phi(Z)$  encontramos **7157**, es decir, el 71,57% se dan temperaturas iguales o inferiores a 38°C y el complemento a 100 (columna  $\Phi(-Z)$ ) 28,43% es el riesgo de que se den temperaturas superiores.

### Ejemplo 3º

Supongamos que deseamos saber con qué frecuencia la media de las máximas de un mes determinado, de una estación dada, está comprendida entre 14 y 28°C, sabiendo que su media de las medias es de 20°C y su desviación es de 3,5°C.

a)  $14 = 20 + 3,5 Z ; Z = \frac{6}{3,5} 1,71$

$$28 = 20 + 3,5 Z ; Z = \frac{8}{3,5} 2,2857$$

- b)  $Z = 1,71 ; \Phi(-Z) = 4,36\% ; \Phi(Z) = 95,64\%$ . Para el siguiente valor hay que interpolar así:

$$Z \ 2,28 \quad ; \ \Phi(-Z) = 1,13\% ; \ \Phi(Z) = 98,87\%$$

$$Z \ 2,29 \quad ; \ \Phi(-Z) = 1,10\% ; \ \Phi(Z) = 98,90\%$$

$$Z \ 2,2857 ; \ \Phi(-Z) \approx 1,11\% ; \ \Phi(Z) \approx 98,88\%$$

- c) Por diferencia entre  $\text{MEDIA} + 2,2857 \sigma$  y  $\text{MEDIA} - 1,71 \sigma$ :  
 $98,88 - 4,36 = 94,52\%$  de los años la media de máximas esté entre 14 y 28°C.

# TABLAS DISTRIBUCION GAMMA

PUNTOS QUE REPRESENTAN PORCENTAJES SELECCIONADOS DE LA DISTRIBUCION GAMMA  
VALORES DE  $X/\beta$  CORRESPONDIENTES A VALORES DETERMINADOS DE  $F(X)^*$

$\alpha \backslash F$	0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.50
-0'95	-	0'00131	0'00263	0'00527	0'00659	0'0132
-0'50	0'0000785	0'00197	0'00790	0'0482	0'0508	0'227
0'00	0'01005	0'0513	0'105	0'240	0'288	0'693
0'50	0'0574	0'176	0'292	0'503	0'606	1'183
1'00	0'149	0'355	0'532	0'824	0'961	1'678
1'50	0'277	0'573	0'805	1'170	1'337	2'170
2'00	0'436	0'818	1'102	1'534	1'727	2'674
2'50	0'620	1'084	1'417	1'910	2'127	3'173
3'00	0'823	1'366	1'745	2'295	2'535	3'672
3'50	1'044	1'663	2'084	2'668	2'949	4'171
4'00	1'279	1'970	2'433	3'068	3'369	4'671
4'50	1'527	2'287	2'789	3'443	3'792	5'170
5'00	1'785	2'613	3'152	3'903	4'219	5'670
5'50	2'053	2'946	3'521	4'320	4'650	6'170
6'00	2'330	3'285	3'895	4'732	5'083	6'670
6'50	2'615	3'630	4'273	5'156	5'518	7'169
7'00	2'906	3'981	4'656	5'574	5'956	7'669
7'50	3'204	4'336	5'043	6'000	6'396	8'169
8'00	3'507	4'695	5'432	6'426	6'838	8'669
8'50	3'816	5'058	5'825	6'858	7'281	9'169
9'00	4'130	5'425	6'221	7'289	7'726	9'669
9'50	4'449	5'796	6'620	7'722	8'172	10'169
10'00	4'771	6'169	7'021	8'154	8'620	10'668
11'00	5'426	6'924	7'829	9'030	9'519	11'668
12'00	6'099	7'690	8'646	9'907	10'422	12'668
13'00	6'782	8'464	9'470	10'792	11'329	13'668
14'00	7'477	9'246	10'300	11'680	12'239	14'668
15'00	8'180	10'035	11'135	12'570	13'152	15'668
20'00	11'825	14'072	15'382	17'075	17'755	20'668
25'00	15'623	18'218	19'717	21'636	22'404	25'667
30'00	19'532	22'444	24'113	26'241	27'085	30'667
35'00	23'403	26'717	28'547	30'872	31'792	35'668
40'00	27'580	31'051	33'027	35'531	36'518	40'668
45'00	31'686	35'429	37'540	40'211	41'259	45'668
50'00	35'852	39'838	42'086	44'910	46'013	50'667

## TABLAS DISTRIBUCION GAMMA (cont.)

$\alpha \backslash F$	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
-0'95	0'0198	0'0211	0'0771	0'266	1'088
-0'50	0'662	0'822	1'353	1'921	3'317
0'00	1'386	1'610	2'303	2'996	4'605
0'50	2'054	2'321	3'126	3'907	5'672
1'00	2'693	2'995	3'890	4'744	6'638
1'50	3'313	3'645	4'618	5'535	7'543
2'00	3'920	4'281	5'322	6'296	8'406
2'50	4'519	4'903	6'008	7'034	9'238
3'00	5'109	5'517	6'681	7'754	10'045
3'50	5'694	6'122	7'342	8'460	10'833
4'00	6'274	6'721	7'994	9'154	11'605
4'50	6'850	7'264	8'638	9'838	12'362
5'00	7'423	7'908	9'275	10'513	13'108
5'50	7'992	8'088	9'906	11'181	13'844
6'00	8'558	9'076	10'532	11'842	14'571
6'50	9'123	9'656	11'154	12'498	15'289
7'00	9'684	10'234	11'771	13'148	16'000
7'50	10'244	10'808	12'384	13'794	16'704
8'00	10'802	11'381	12'995	14'435	17'407
8'50	11'359	11'952	13'602	15'072	18'095
9'00	11'914	12'522	14'206	15'705	18'783
9'50	12'467	13'088	14'808	16'335	19'466
10'00	13'020	13'653	15'407	16'962	20'145
11'00	14'121	14'780	16'598	18'208	21'490
12'00	15'217	15'899	17'782	19'443	22'821
13'00	16'310	17'017	18'958	20'669	24'139
14'00	17'400	18'128	20'128	21'886	25'446
15'00	18'487	19'234	21'293	23'098	26'744
20'00	23'883	24'729	27'045	29'062	33'104
25'00	29'234	30'169	32'711	34'916	39'308
30'00	34'552	35'565	38'315	40'691	45'401
35'00	39'851	40'933	43'875	46'414	51'420
40'00	45'124	46'275	49'395	52'080	57'363
45'00	50'380	51'591	54'881	57'698	63'243
50'00	55'621	56'899	60'350	63'299	69'081

Adaptada de : CATHERINE M. THOMPSON: "Tables of Percentage Points of the Chi-square Distribution," *Biometrika*, vol. 32, parte II, octubre de 1941 y de "Tables of the Incomplete  $\Gamma$ -Función," edited by KARL PEARSON F.R.S., 1951.

## COMO USAR ESTA TABLA

En el cuadro nº 14 figura, para cada estación y cada mes, los coeficientes  $\alpha$  y  $\beta$ , de la distribución gamma, la pluviometría media del mes  $x$  y los coeficientes  $Q$  y  $R$ , que son el porcentaje de años en que la pluviometría es cero ( $Q$ ) y mayor que cero ( $R$ ).

Con estos valores y la tabla que se adjunta, podrá el lector interesado contestarse a varias de las cuestiones que se le pueden plantear a la hora de decidir si en una zona concreta es factible llevar a cabo determinada labor cultural, determinado cultivo, qué riesgo corre si el cultivo es en seco, etc...

La tabla consta de unos valores de  $x/\beta$  correspondientes a unos valores de frecuencia o probabilidad ( $F(x)$ ) y unos valores de  $\alpha$ , dados. La frecuencia varía entre 0,01 (1%) y 0,99 (99%) y la  $\alpha$  entre  $-0,95$  y 50. (Para valores de  $\alpha$  superiores a 50 véase «TABLES OF THE INCOMPLETE  $\Gamma$ -FUNCTION» edited by Karl Pearson, F.R.S. and printed by the Cambridge University Press. Re-issue, 1951).

A continuación se dan ejemplos de cuestiones que se pueden resolver con los coeficientes dados y la tabla adjunta:

### Ejemplo 1º

Supongamos que en el mes de abril de una estación cualquiera tenemos los siguientes valores:

Pluviometría media del mes  $x = 100$  mm.  
 $\alpha = 3,00$   
 $\beta = 25,00$   
 $Q = \text{cero}$   
 $R = 100\%$

y queremos saber la frecuencia o probabilidad de que se nos dé esa pluviometría, o menos:

a) Calculamos el cociente  $\frac{x}{\beta} = \frac{100}{25} = 4,000$

b) Buscamos en la tabla el valor más próximo a 4,000 en la fila de  $\alpha = 3,00$ , y vemos que está comprendido entre 3,672 ( $F(x) = 0,50$ ) y 5,109 ( $F(x) = 0,75$ ), entonces por interpolación.

$$\begin{array}{l} \text{Si a } (0,75 - 0,50) \text{ ----- } (5,109 - 3,672) \\ \text{a Z} \text{ ----- } (4,000 - 3,672) \end{array}$$

$$Z = (0,25 \times 0,328) / 1,437 = 0,057$$

luego

$$F(x) = 0,50 + 0,057 \approx 0,56 = 56\%$$

Es decir el 56% de los años lloverá en el mes de abril *100 mm o menos*. Si lo que nos interesa es saber con qué frecuencia se dará una pluviometría de 100 mm o más, es evidente que será el complemento a 100% de la calculada, es decir el 44% de los años.

Luego si para un cultivo determinado, necesitamos una pluviometría en el mes de abril del 100 mm como mínimo, vemos que sólo el 44% de los años contaremos con ella y que corremos un riesgo del 56% de no alcanzarla.

### Ejemplo 2º

El mismo supuesto anterior pero con  $Q = 20\%$ ,  $R = 80\%$ .

Recurrimos al artificio de

$$H(x) = Q + R \cdot F(x)$$

$$H(x) = 0,2 + 0,8 \cdot 0,56 = 0,648$$

La frecuencia con que lloverán 100 mm o menos será ahora del 64,8% y de 100 mm o más de 35,2%. (A este artificio recurriremos siempre que  $Q \neq 0$ ).

### Ejemplo 3º

El mismo supuesto del ejemplo 1º, pero queremos saber ahora qué intervalo de pluviometría es esperable el 80% de los años.

a) Buscamos en la tabla los valores  $x/\beta$  correspondientes a  $\alpha = 3,00$ ,  $F(x) = 0,90$  y  $\alpha = 3,00$  y  $F(x) = 0,10$ .

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 3,00 \\ F(x) = 0,10 \end{array} \right\} x/\beta = 1,745 \qquad \left. \begin{array}{l} \alpha = 3,00 \\ F(x) = 0,90 \end{array} \right\} x/\beta = 6,681$$

b) Luego:

$$x_{0,90} = 6,681 \times \beta = 6,681 \times 25 = 167,025 \text{ mm.}$$

$$x_{0,10} = 1,745 \times \beta = 1,745 \times 25 = 43,625 \text{ mm.}$$

c) Entonces el 80% de los años es esperable que la pluviometría en el mes de abril, de la estación dada, esté comprendida entre 43,6 mm y 167,0 mm.

En los casos en que el  $\alpha$  no coincida con algún valor de la tabla, habrá que interpolar entre los más aproximados que figuren en ella.









PUBLICACIONES DEL



**SECRETARIA GENERAL TECNICA**

CENTRO DE PUBLICACIONES

Paseo de la Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid