


GRAFICOS

FORMACIONES FISIONOMICAS

INDICE ARIDEZ

FORMACIONES FISIONOMICAS




GRAFICOS DE WALTER Y LIETH


T'	=	Temperatura media anual de máximas absolutas anuales
T_c	=	Temperatura media de las máximas del mes más cálido
Osc	=	Oscilación ($T_c - t_f$)
t_f	=	Temperatura media de las mínimas del mes más frío
t'	=	Temperatura media anual de mínimas absolutas anuales
n_T	=	Número de años de la serie de temperaturas
n_P	=	Número de años de la serie de pluviometría
h	=	Altitud en metros
\bar{t}_m	=	Temperatura media anual de las medias en °C.
P	=	Pluviometría media anual en milímetros
H_s	=	Período en que la helada es segura
H_p	=	Período en que la helada es probable
d	=	Período libre de heladas
Rayado	=	Período húmedo
Punteado	=	Período seco
En negro	=	Parte del período húmedo en que las precipitaciones sobrepasan los 100 mm. (la escala de precipitaciones se reduce a 1/10)




N ATAQUINES




N BERRUECES DE CAMPOS




N CASTROMONTE




N CASTROMONTE "STA. ESPINA"




N MEDINA DEL CAMPO




N MEDINA DE RIOSECO




N SARDON DE DUERO "GRANJA"




N SIMANCAS




N TORDESILLAS



N TUDELA DE DUERO



N VALLADOLID "OBSERVATORIO"



N VALLADOLID "VILLANUBLA"

