

ARROZ

Ha habido una disminución sensible en la producción de arroz. Para 1963 se estima una cosecha de tres mil cuatrocientos ochenta y siete miles de quintales métricos; la cifra definitiva de 1962 es de tres mil novecientos veinticuatro miles de Qm.; hay, por tanto, un once y pico por ciento de disminución en 1963.

Resumen de la Producción de Cereales

	1962 000 de Qm.	Avance 1963 000 de Qm.	Avance 1963 (producción 1962 = 100)
Trigo	48.116	48.595(definit.)	100,9
Cebada	21.619	20.700	95,8
Centeno	4.527	4.300	95,0
Avena	5.129	4.600	89,7
Maiz	9.204	11.010	119,6
Arroz.....	3.924	3.487	88,9

LEGUMINOSAS

Las lluvias de octubre de 1962 favorecieron las condiciones del terreno para las siembras, por lo que fue buena la nascencia. En noviembre, el estado general de las siembras de leguminosas era bueno. A finales de diciembre continuaba el buen estado de dichas siembras, si bien el tiempo frío dificultó la nascencia de las tardías en ambas Castillas y en parte de Extremadura; las heladas de los últimos días del año causaron perjuicio en los cultivos de habas y guisantes de las provincias mediterráneas. Mas tarde, las inundaciones a diversas zonas de Andalucía Occidental, Albacete, Cuenca, Málaga y Granada.

Las siembras, en general, muestran retraso en su desarrollo vegetativo.

La recolección de habas y guisantes para verdeo en las provincias mediterráneas se realizó con alguna dificultad. Las heladas de fin de año no tuvieron consecuencia en la producción, ya que solamente sufrió daños la primera flor.

En el mes de marzo de 1963 las lluvias dificultaron en muchos casos la siembra de primavera, lo que vino a perjudicar más con el descenso de temperaturas, de los últimos días del mes, que causó daños a las leguminosas en flor. En el mes de abril se continuó la siembra de leguminosas de primavera con normalidad y se recolectaron habas, guisantes, judías verdes, con buenos rendimientos.

Durante el mes de mayo se aceleró la granazón de leguminosas.

La nascencia de las judías en las zonas del norte era en general buena.

Las leguminosas de primavera con relación al pasado año presentaron mejor aspecto en -- Andalucía Occidental y Cataluña y peor en Extremadura.

En cuando a las leguminosas de otoño, y con respecto al año anterior, hubo mejores perspectivas en Andalucía Occidental, región Leonesa, Cataluña-Baleares y Logroño-Navarra, e inferiores en Levante, Andalucía Oriental, Extremadura y Aragón. La recolección de dichas leguminosas se efectuó con normalidad.

SUPERFICIES

Los avances de superficies para la campaña 1963-64 señalan disminuciones notables en almortas, alholvas y yeros. Hay descehosos en vega y altramuces (casi un ocho por ciento) y en lentejas y habas para grano (un seis y medio por ciento). En garbanzos y algarrobas las disminuciones son ligeras (menores del dos por ciento). En cuanto a las judías y guisantes para grano, hay incrementos de superficies sembradas, de un siete por ciento, para las primeras y un trece por ciento para los segundos.

SUPERFICIES DE LEGUMINOSAS

(000 de Ha.)

	<u>1962</u>	<u>Avance 1963</u>	<u>1963 (Superficie 1962 = - 100)</u>
Lentejas	47	44	93,6
Garbanzos	248	245	98,8
Judías	100	107	107,0
Habas grano	153	143	93,5
Guisantes grano	31	35	112,9
Algarrobas	154	151	98,1
Yeros	31	35	89,1
Veza	79	73	92,4
Alberjones	10	10	100,0
Alholvas	13	12	92,3
Almortas	28	20	75,0
Altramuces	8	6	71,4

PRODUCCIONES

Garbanzos

El avance de producción de garbanzos es de mil cuatrocientos veinte miles de Qm., cifra que representa un incremento de un 4,2 por ciento, respecto a la producción de 1962.

En la mayoría de las regiones se han observado incrementos de producción, de los que -- son particularmente destacados los de Castilla la Vieja, la región Leonesa y Andalucía Occidental. Se estimaron disminuciones importantes para Levante y Extremadura y un nivel de producción similar al de la última campaña para las restantes regiones.

Judías

El avance de la producción de judías para grano es de mil cuatrocientos veinte miles - de quintales métricos, un 12,8 por ciento superior al del año pasado. Las cosechas fueron inferiores en Castilla la Nueva, Extremadura, Levante, Cataluña-Baleares y Logroño-Navarra; en el resto de la Península las producciones se han estimado superiores; en la región leonesa, se ha calculado una producción superior en un 53,2 por ciento a la del pasado año.

Lentejas

La producción de 1963 se ha estimado en trescientos treinta y cinco miles de Qm., cifra análoga a la del año 1962.

Leguminosas para pienso

La producción de habas se ha estimado para 1963 en mil trescientos setenta y cinco miles de Qm., lo que representa un 4,8 por ciento menos que en 1962. En Andalucía Occidental, que es una de las regiones más productoras, la cosecha fue inferior a la del pasado año en un siete por ciento, mientras que en Andalucía Oriental, por el contrario, ha sido superior en idéntico porcentaje.

Las algarrobas y los yeros han disminuído en producción con cifras para 1963 de ciento noventa y cinco y seiscientos setenta y cinco miles de Qm., respectivamente. Los porcentajes de disminución respecto a 1962 son de un quince por ciento para las algarrobas y un 3,4 por ciento para los yeros.

La producción de guisantes se han estimado en doscientos sesenta y cinco miles de Qm., con un seis por ciento de aumento, respecto a 1962. La producción de almortas para 1963 es de doscientos veinticinco miles de Qm., (un 6,6 por ciento más que en 1962) y la de veza es de cuatrocientos setenta y cinco miles de Qm., (21,2 por ciento menos que en el año anterior).

Resumen de la Producción de leguminosas

	1962 000 de Qm.	Avance 1963 000 de Qm.	Avance 1963 (Producción 1962 = 100)
Garbanzos	1.363	1.420	104,2
Judías	1.259	1.420	112,8
Lentejas	335	335	100,0
Habas	1.444	1.375	92,5
Guisantes	250	265	106,0
Algarrobas	1.171	995	85,0
Yeros	699	675	96,6
Almortas	211	225	106,6
Veza	602	475	78,9