



Respecto a la producción de 1962, el aumento ha sido de un veinticinco por ciento. En general, todas las regiones dan aumentos, de los que son más significativos los de Galicia y Castilla la Nueva.

REMOLACHA AZUCARERA

Se observó falta de humedad para este cultivo en Castilla la Vieja y, en general, el desarrollo de la vegetación fué normal en todas las regiones. Los rendimientos fueron mejores que los del año pasado, si bien la cosecha por la disminución de superficie sembrada ha resultado bastante inferior.

SUPERFICIES

El avance de la campaña 1963-64 señala ciento catorce mil hectáreas, lo que representa una disminución respecto a la campaña anterior, de un 31,3%.

| | 1962 | 1963 | 1963 (Superficie 1962 = 100) |
|---|------|------|------------------------------------|
| Superficie de remolacha (000 Ha.) | 166 | 144 | 58,7 |

PRODUCCIONES

La cosecha de remolacha azucarera se ha calculado en 24,7 millones de Qm. Con relación a las cifras definitivas del año anterior, el avance arroja una disminución del 30,8 por ciento. La distribución por regiones de dicha producción es la siguiente :

| | 1962 | 1963 | Avance 1963 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Cifras definitivas 000 Qm.- | Avance 2 Noviemb. - 000 Qm.- | Definitivas- 1962=100 |
| Castilla la Vieja | 10.050,2 | 8.149,2 | 81,1 |
| Aragón | 7.745,2 | 4.130,0 | 53,4 |
| Leonesa | 5.188,1 | 3.900,0 | 75,2 |
| Logroño-Navarra | 3.750,0 | 2.075,6 | 45,3 |
| Andalucía Oriental | 3.235,0 | 2.357,5 | 72,8 |
| Andalucía Occidental | 3.068,9 | 1.017,7 | 76,4 |
| Castilla la Nueva | 1.817,1 | 588,0 | 56,1 |
| Vascongadas | 597,0 | 102,7 | 98,5 |
| Cataluña-Baleares | 260,0 | 105,4 | 39,5 |
| Levante | 130,9 | 2.076,6 | 80,5 |
| Totales | 35.842,4 | 24.792,1 | 69,2 |

