

Destacan los incrementos de Andalucía Occidental y Castilla la Nueva, donde los aumentos son de un treinta y de un veinte por ciento, respectivamente; siguen en importancia la región Levantina y la de Logroño-Navarra, con incrementos del catorce por ciento. Ha disminuido únicamente la producción en Castilla la Vieja; en las restantes regiones las producciones permanecen prácticamente estables, con incrementos o disminuciones de muy poca importancia.

OLIVAR


En el mes de abril brotó con vigor el olivar en las zonas más productoras de Andalucía, mostrando también buen aspecto en Extremadura y Cataluña. La floración fué buena y en junio se mantenían las buenas impresiones sobre la futura cosecha. La recolección de aceituna de verdeo se realizó con normalidad y con buenos rendimientos.

A pesar del fuerte ataque de repilo la abundancia de fruto ha hecho estimar la producción como muy buena.

A continuación se indican las producciones de aceite y aceituna de verdeo:

	Producción 1963-64 (000 de Qm.)
Aceituna de verdeo	568,0
Aceite	5.600,0

En la aceituna de verdeo, se han dado producciones superiores en todas las regiones, a excepción de Castilla la Nueva, con una producción del veintitrés por ciento inferior, y de levante, del ocho y medio por ciento también menor. La región donde se ha calculado mayor aumento es Andalucía Occidental, con una cosecha de 96,7 por ciento mayor que del pasado año.



La estimación de la producción de aceite representa, respecto a la del pasado año, un incremento del sesenta y cuatro por ciento. A excepción de Castilla la Nueva, que ha producido un veinte por ciento menos que el año anterior, el resto de las regiones han aumentado. Se indican a continuación los incrementos más importantes.

	Incremento (%)
Andalucía Oriental (Jaén duplicó su producción)	84,4
Andalucía Occidental (Córdoba aumentó en el 15 %)	90,4
Aragón	136,4

FRUTALES

En el mes de febrero las bajas temperaturas dañaron la flor de los almendros en las -- provincias mediterráneas. Con el aumento de temperatura se produjo en el mes de marzo un intenso desprendimiento de naranjas en los huertos afectados por las heladas. En las zonas -- más tempranas la floración de los frutales de hueso y pepita fué muy abundante.

En el mes de abril la floración de los agrios en Valencia era satisfactoria, pero las -- pérdidas por heladas representaban una parte importante de albaricoques, en Albacete y Aragón, y de melocotón en Murcia. La buena floración del manzano en Asturias hizo prever una -- buena cosecha.

Durante el mes de junio se intensificó la recolección de los frutos de hueso y se -- inició la de patata.

En los últimos meses del año se completó la recolección de frutas, en general, con -- buenos rendimientos.

PRODUCCIONES

En el cuadro siguiente, se han señalado las producciones de 1963 (cifras provisiona- -- les) y se comparan con las correspondientes al año anterior. Se observan aumentos en todas las frutas frescas, salvo en el albaricoque que presenta un ligero retroceso de un 3,6 por -- ciento y la pera que disminuye en un 17,6 por ciento. La manzana para sidra alcanza una -- producción notablemente superior a la de la campaña precedente; más de cuatro veces la cifra -- de 1962.