

SUPERFICIES

Las superficies sembradas en la campaña 1963-64 y en la precedente señalan variaciones no muy acusadas en general. Los aumentos han correspondido a las judías y guisantes grano, un 10 por ciento. En el resto de las leguminosas se ha producido disminuciones, especialmente en Almortas, 27,6 por ciento; alverjones, 16,7 por ciento, y alholvas, 12,5 por ciento.

A continuación se indican las superficies sembradas de leguminosas para las campañas 1963-64 y 1962-63 así como las variaciones porcentuales de una a otra.

SUPERFICIES DE LEGUMINOSAS

(000 de Ha.)

	1962-63	Avance 1963-64	1963-64 (Superficie 1963=100)
Lentejas	49	45	92
Garbanzos	245	232	95
Judías	98	108	110
Habas grano	148	140	95
Guisantes grano	31	34	110
Algarrobas	151	146	97
Yeros	89	84	94
Veza	82	76	93
Alverjones	12	10	83
Alholvas	8	7	87
Almortas	29	21	72
Altramuces	13	12	92

PRODUCCIONES

GARBANZOS

El avance de producción de garbanzos para 1964 ha sido de 1.252,4 miles de Qm., lo que significa un 14,4 por ciento menos que en el año anterior. Entre las regiones más productoras, únicamente la región leonesa ha tenido incrementos. En Castilla la Vieja la producción ha sido análoga a la de 1963 y en el resto de las regiones se han registrado disminuciones entre las cuales destaca la de Extremadura, región en la que la cosecha de 1964 se ha estimado en un 49 por ciento de la de la campaña precedente.