

OLIVAR

Las producciones de aceite y aceituna de verdeo se han estimado para la campaña 1964-65 en las siguientes cifras:

Aceituna de verdeo	350,5 miles de Qm.
Aceite	1.500,0 " " "

En la aceituna de verdeo la producción de la campaña 1964-65 ha sido un 54 por ciento inferior a la de la campaña precedente. En la región de mayor producción -Andalucía Occidental- la cosecha será un 60 por ciento inferior a la de 1963. En general todas las regiones han señalado disminuciones en la producción con la excepción de Logroño-Navarra, donde el incremento ha sido de un 13 por ciento.

Se ha estimado la producción de aceite en un 76,5 por ciento menos de la del año precedente, -- que fue muy superior a la media. Con relación a un año de producción normal supone la estimación de 1964-65 una disminución del 62 por ciento.


Las regiones más productoras han dado todas producciones inferiores a las del año precedente, observándose las bajas más notables en Andalucía Oriental, en la que la cosecha de la actual campaña se ha estimado sea el 9,9 por ciento de la del año anterior y en Andalucía Occidental donde sólo llegará al 31,1 por ciento.

Por regiones la producción de aceite se distribuye de la siguiente forma:

PRODUCCION DE ACEITE

Miles de Qm.

	1963-64	1964-65 (Avance)	1964-65 1963-64 = 100
Andalucía Occidental	1.757,2	547,0	31,1
Andalucía Oriental	2.995,1	298,3	9,9
Castilla la Vieja	8,6	1,4	16,3
Castilla la Nueva y Albacete	569,6	176,5	31,0
Aragón	190,3	65,3	34,3
Levante	200,9	52,4	26,1
Leonesa	9,9	8,9	89,8
Cataluña-Baleares	357,1	184,6	51,6
Extremadura	260,7	145,0	55,6
Logroño-Navarra	29,7	19,0	63,9
Galicia	-	-	-
Vascongadas	0,3	1,6	533,3
Asturias-Santander	-	-	-
Total	6.379,5	1.500,0	23,5



FRUTALES

La floración del almendro se desarrolló con normalidad durante los primeros meses de 1964 en las principales zonas productoras. En marzo los fríos causaron daños a la flor en Levante, Cataluña y -- Aragón .

En mayo los frutales de hueso sufrieron los efectos de las bajas temperaturas en algunas comarcas de Cataluña, Castilla la Nueva, Galicia y Extremadura. No obstante, la brotación y floración -- del arbolado fué abundante.

En Abril la floración de todos los frutales fué favorable, presentándose con mejores perspectivas que en el año anterior.

En los meses de mayo y junio hubo desprendimiento de flor y fruto en los agrios por lo que las magníficas perspectivas se redujeron en parte.

La producción de plátanos en Canarias presentaba una producción notable.

En los meses de verano se intensificó la recolección de frutas, sobre todo almendra, frutales de hueso y de peoita.

Las perspectivas de cosecha de agrios en septiembre eran ligeramente superiores a las de la campaña precedente en naranjas y mucho mayores en limón.

AGRIOS

La cosecha de naranja para la campaña 1964-65 se ha estimado en 18.500 miles de Qm. El aumento en relación a la campaña anterior ha sido de un 1,9 por ciento, es decir, una variación poco sensible. Sin embargo el avance de producción de limón, cifrado en 1.600 miles de Qm. es notablemente superior a la cosecha anterior, superando a este en un 51,6 por ciento.

PRODUCCIONES DE AGRIOS

(000 Qm.)

	1963	1964 (avance)	1964 1963=100
Naranja	18.146	18.500	101,9
Mandarina	1.607	1.610	100,1
Limón	1.055	1.600	151,6
Pomelo	53	60	113,2
Lima	2	2	100,0