

Enfermedades	Años	Granjas	Aves analizadas	Positivos
Pullorosis	1963	520	662.231	6.603
	1964	512	660.231	5.815
Totales		1.032	1.322.462	12.418

	Años	Animales tratados	Barros obtenidos	Beneficio obtenido Millones Pts.
Hipodermosis	1963	35.745	708.500	6,05
	1964	234.516	3.947.621	46,90
Totales		270.261	4.656.121	52,95

Fuente: Dirección General de Ganadería

SITUACION SANITARIA DE LA GANADERIA

El estado sanitario de la ganadería española durante el año 1964 puede considerarse como bueno a excepción de las pestes del cerdo e incidentalmente de la fiebre aftosa.

Después de contar con la completa erradicación, iniciada en años anteriores, de enfermedades tan importantes como el muermo y la durina, que afectaban a la especie equina, existe un grupo de enfermedades del ganado, ya en franca vía de erradicación. Tales son, el carbunco bacteridiano con un índice de mortalidad del 0,2 por ciento; el carbunco sintomático con un índice de mortalidad del 0,1 por ciento; la viruela ovina con un índice de mortalidad del 0,002 por ciento; la basquilla con un índice de mortalidad del 0,1 por ciento; el mal rojo del cerdo con un índice de mortalidad del 0,2 por ciento; la peste aviar con un índice de mortalidad del 0,1 por ciento, la rabia con solo 16 casos de muerte en total en las especies canina y felina, y la perineumonía contagiosa de los bóvidos, con un índice de presentación y mortalidad inapreciable.

Respecto al ganado porcino, la peste africana sigue ocasionando grandes daños, a pesar de haber sido bastante inferior en número de cerdos muertos y sacrificados en 1964 al de 1963. Su importancia se recoge en el cuadro siguiente:

BAJAS PRODUCIDAS POR LA PESTE PORCINA

Años	Muertos	Sacrificados	Pagos por sacrificios Millones Pts.
1960	14.772	104.771	57,8
1961	4.656	41.311	46,7
1962	10.425	51.649	39,1
1963 (Hasta 1-XII)	88.756	299.898	255,8
1964 (Hasta 1-XII)	41.955	199.591	309,0