

SUPERFICIE DE LEGUMINOSAS

	<u>Campaña</u> <u>1964-65</u> <u>000 Ha.</u>	<u>Avance cam-</u> <u>paña 1965-66</u> <u>000 Ha.</u>	<u>1965-66</u> <u>1964-65=100</u>
Habas	140	140	100
Algarrobas	148	148	100
Guisantes	26	33	127
Yeros	94	93	99
Veza	80	79	99
Alholvas	10	7	70
Almortas	27	24	89
Altramuces	13	11	85

PRODUCCION DE LEGUMINOSAS

	<u>1964</u> <u>000 Qm.</u>	<u>1965</u> <u>000 Qm.</u>	<u>1965</u> <u>1965=100</u>
Habas	1.220	1.150	94
Algarrobas	719	565	79
Guisantes	188	185	96

PATATA

En enero de 1965 el desarrollo vegetativo de la patata extratemprana era bueno, beneficiándose notablemente de las abundantes precipitaciones de aquella época. En este mismo mes se inició con dificultad la plantación de patata temprana en Levante, Andalucía, Cataluña, Logroño-Navarra, Galicia y litoral Cantábrico y en zonas limitadas de Castilla la Nueva.

Al iniciarse febrero, las impresiones en relación con la patata extratemprana eran menos optimistas, debido tanto a la disminución de la superficie sembrada como a los perjuicios causados en algunas zonas por los vendavales. La exportación se realizaba a ritmo lento. Posteriormente mejoró la evolución de la patata en vegetación y se intensificó la recolección. Se continuó la plantación de patata temprana en distintas zonas. También se inició la plantación de patata de época media.

Durante el mes de marzo fue muy activa la recolección y exportación de patata extratemprana en Canarias, obteniéndose rendimientos satisfactorios; el desarrollo de esta patata era deficiente en Galicia. El desarrollo de la patata temprana ya plantada era en general normal, apreciándose en algunos lugares retraso debido a las anteriores heladas.

En abril se continuaron las plantaciones de patata de media estación y se iniciaron las de tardía, presentando dificultades la nascencia por la sequía y bajas temperaturas. La evolución de la temprana también se vió afectada por estas adversas condiciones climatológicas.

La recolección de patata extratemprana en Canarias finalizó en el mes de mayo. En la mayoría de las regiones las perspectivas en esta fecha eran mejores que las del año precedente.

En junio finalizó la recolección de temprana y se inició la de media estación con elevados rendimientos.

El arranque de patata de media estación estaba avanzado en agosto en varias regiones, con rendimiento en general satisfactorio. El desarrollo de la tardía empeoró a causa de la sequía.

En septiembre finalizó prácticamente la recogida de patata de media estación. La evolución de la patata tardía siguió empeorando, excepto en las zonas más atrasadas, en donde las lluvias de finales de mes mejoraron la situación.

Se generalizó el arranque de patata tardía en octubre, obteniéndose rendimientos variables, entorpeciendo esta operación las lluvias de este mes. Las plantaciones más retrasadas experimentaron considerable mejora en su desarrollo final.

El avance de superficie plantada de patata en 1965 es de 384 miles de Ha., lo que representa un 4 por ciento más que en el año anterior.

Por el contrario, la cosecha estimada de este tubérculo para 1965, que se cifra en 39.792 miles de Qm., es inferior en un 6 por ciento a la de 1964.

	1964	1965 (avance)	1965 1964=100
Superficie sembrada (000 Ha.)	368	384	104
Producción (000 Qm.) ..	42.542	39.972	94

Regionalmente, las variaciones de producción más importantes se refieren a la disminución de producción en un 13 por ciento en Galicia y 16 por ciento en Castilla la Vieja, y el aumento en un 26 por ciento de Castilla la Nueva.

