

LEGUMINOSAS DE ALIMENTACION HUMANA

La nascencia fue en las leguminosas algo retrasada, pero las suaves temperaturas de marzo produjeron un adelanto en su vegetación. A partir de este momento evolucionaron en sentido favorable, en términos generales hasta el momento de su recolección.

Las superficies sembradas de leguminosas para alimentación humana disminuyeron ligeramente respecto al año anterior, si se exceptúan las judías para grano, cuya superficie aumenta en un 40 por ciento.

SUPERFICIE DE LEGUMINOSAS

	1965 000 Ha.	Avance 1966 000 Ha.	1966 1965 = 100
Lentejas	50,2	49,4	98,4
Garbanzos	230,3	221,8	96,3
Judías	98,2	138,1	140,5

La PRODUCCION DE LENTEJAS en 1966 se estima en 380.000 Qm., superior a la de la campaña pasada en un 71 por ciento. La de garbanzos es de 1.380.000 de Qm., que supone un incremento del 68 por ciento, y en la PRODUCCION DE JUDIAS PARA GRANO 1.379.000 Qm., superior a la anterior en un 16,5 por ciento.

Se observa pues, un notable incremento de las producciones, en este tipo de leguminosas, ya que se han obtenido producciones mucho mayores que el pasado año, pese a haber disminuído la superficie, excepto en las judías para grano.

PRODUCCION DE LEGUMINOSAS

	1965 000 Qm.	Avance 1966 000 Qm.	1966 1965 = 100
Lentejas	222	380	171,1
Garbanzos	820	1.380	168,3
Judías	1.183	1.379	116,5

LEGUMINOSAS PARA PIENSO

La PRODUCCION DE ALGARROBAS en 1966 se calcula en 984.000 Qm., superior a la del año anterior en un 97,6 por ciento.

En GUISANTES se aprecian 177.000 Qm., que resulta superior a la de 1965 en un 1 por ciento.

La PRODUCCION DE HABAS es de 1.167.000 Qm., superior en un 2,4 por ciento a la de la campaña anterior.

La VEZA también experimenta un aumento del 17,5 por ciento, con una cifra de producción total de 638.000 Qm.

Los YEROS, con 784.000 Qm., experimentan un aumento del 59 por ciento.

Si se tiene en cuenta que las superficies de siembra de estos cultivos, aunque ligeramente inferiores a las del pasado año mantienen cifras semejantes, estas producciones pueden considerarse bastante buenas.

SUPERFICIE DE LEGUMINOSAS

	<u>1965</u> 000 Ha.	<u>Avance 1966</u> 000 Ha.	<u>1966</u> 1965 = 100
Algarrobas	145,0	138,2	95,3
Guisantes	29,2	25,8	88,4
Habas	136,9	108,7	79,4
Veza	78,5	77,7	98,9
Yeros	97,5	97,0	99,5

PRODUCCION DE LEGUMINOSAS

	<u>1965</u> 000 Qm.	<u>Avance 1966</u> 000 Qm.	<u>1966</u> 1965 = 100
Algarrobas	498	984	197,6
Guisantes	175	177	101,1
Habas	1.140	1.167	102,4
Veza	543	638	117,5
Yeros	493	784	159,0

PATATA

La patata extratemprana sufrió una merma de rendimiento en la zona de Canarias debido a la sequía.

Se presentaron dificultades para la siembra de la patata temprana.

Posteriormente evolucionó favorablemente la vegetación, que se observaba, en general adelantada, pese al retraso en la nascencia. Las labores de escarda se realizaron sin dificultades, si se exceptúa Levante por la sequía, y Rioja-Navarra por exceso de humedad.

En general, la patata de las diversas estaciones fue con el cuaje y maduración adelantada. La escarda manual se vió dificultada en algunas regiones -Castilla la Vieja y Levante- por escasez de mano de obra.

A continuación se expresan los avances de superficie y producción de patata que, como puede apreciarse, experimentan incrementos de un 1 por ciento, por lo que son prácticamente equivalentes a las del pasado año.

SUPERFICIE SEMBRADA DE PATATA

	<u>1965</u> 000 Ha.	<u>Avance 1966</u> 000 Ha.	<u>1966</u> 1965 = 100
Patata extra temprana	6,3	13,7	217,4
Patata temprana	55,5	49,1	88,5
Patata media estación	143,9	144,9	100,7
Patata tardía	165,0	167,9	101,7
Total patata	370,7	375,6	101,3