

SUPERFICIE DE LEGUMINOSAS

	<u>1965</u> 000 Ha.	<u>Avance 1966</u> 000 Ha.	<u>1966</u> 1965 = 100
Algarrobas	145,0	138,2	95,3
Guisantes	29,2	25,8	88,4
Habas	136,9	108,7	79,4
Veza	78,5	77,7	98,9
Yeros	97,5	97,0	99,5

PRODUCCION DE LEGUMINOSAS

	<u>1965</u> 000 Qm.	<u>Avance 1966</u> 000 Qm.	<u>1966</u> 1965 = 100
Algarrobas	498	984	197,6
Guisantes	175	177	101,1
Habas	1.140	1.167	102,4
Veza	543	638	117,5
Yeros	493	784	159,0

PATATA

La patata extratemprana sufrió una merma de rendimiento en la zona de Canarias debido a la sequía.

Se presentaron dificultades para la siembra de la patata temprana.

Posteriormente evolucionó favorablemente la vegetación, que se observaba, en general adelantada, pese al retraso en la nascencia. Las labores de escarda se realizaron sin dificultades, si se exceptúa Levante por la sequía, y Rioja-Navarra por exceso de humedad.

En general, la patata de las diversas estaciones fue con el cuaje y maduración adelantada. La escarda manual se vió dificultada en algunas regiones -Castilla la Vieja y Levante- por escasez de mano de obra.

A continuación se expresan los avances de superficie y producción de patata que, como puede apreciarse, experimentan incrementos de un 1 por ciento, por lo que son prácticamente equivalentes a las del pasado año.

SUPERFICIE SEMBRADA DE PATATA

	<u>1965</u> 000 Ha.	<u>Avance 1966</u> 000 Ha.	<u>1966</u> 1965 = 100
Patata extra temprana	6,3	13,7	217,4
Patata temprana	55,5	49,1	88,5
Patata media estación	143,9	144,9	100,7
Patata tardía	165,0	167,9	101,7
Total patata	370,7	375,6	101,3

PRODUCCION DE PATATA

	1965 000 Qm.	Avance 1966 000 Qm.	1966 1965 = 100
Patata extra temprana	504	1.326	263,1
Patata temprana	7.395	6.012	81,3
Patata media estación	16.899	18.059	106,8
Patata tardía	16.100	16.271	101,0
Total patata	40.898	41.668	101,8

